

العِظَام فِي الْدِرَاسَاتِ الْأَنْثْرُوبُولُوجِيَّةِ وَالطَّبِيَّةِ وَالْجِنَائِيَّةِ



ترجمة
الدكتور
محمد يوسف البخاري

تأليف
د. محمد يوسف البخاري
د. ريتشارد ماكوليماز

بۆدابەزاندنی جۆرمە کتىب: سەرداش: (منتدى إقرأ الثقافى)

لەھىل انواع الكتب راجع: (منتدى إقرأ الثقافى)

پەرایي دانلود كتابیهای مختلف مراجعة: (منتدى إقرأ الثقافى)

www.Iqra.ahlamontada.com



www.Iqra.ahlamontada.com

للكتب (كوردي . عربي . فارسي)

العِظَام في الْدِرَاسَاتِ الْأَنْثْرُوبُولُوجِيَّةِ وَالطَّبِيَّةِ وَالْجِنِّيَّةِ

تألِيفٌ

د. محمد يوسف النجار

د. ريتشارد ماكوليامز

تَرْجِمَةٌ

الدكتور

محمد يوسف النجار



ذات السلاسل

طائفة الشتر والفرنديبي

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

م ١٤٠٩ - ١٩٨٩

الناشر

زات التراث

للمبادرة والنشر والتوزيع

المحوية




الإدارة المعاشرة

مجمع الأوقاف - سبرج ١٥

شنة ١٥ الددد السادس

م. ب: ١٥-٦١، الشابة، المحويت، تلفون: ٢٤٦٦٢٦٦ / ٢٤٦٦٢٥٥



المحتويات

٩	مقدمة المترجم
١٣	الباب الأول
١٥	الفصل الأول: استخراج العظام وصيانتها
١٥	الموقع الأثري
١٧	في المختبر
١٧	الترميم
١٨	الدراسات الجنائية
٢١	الفصل الثاني: الهيكل العظمي
٢٧	عظام الجمجمة
٣٦	العمود الفقري ؟
٤١	عظام الصدر
٤٣	عظام الطرف العلوي
٤٨	عظام الطرف السفلي
٥٣	الفصل الثالث: الأسنان
٥٤	الوصف التشريحى للأسنان الدائمة
٦٣	الوصف المورفولوجي للنتائج في السن
٦٩	أمراض الأسنان
٧٥	الفصل الرابع: تقدير الأعمار
٧٦	حديث الولادة

الطفولة/مرحلة الصبا المبكر	77
مرحلة الصبا المتأخر	79
فترة المراهقة	81
الشباب البالغ	83
كبار السن البالغين	92
التعرف على العنصر البشري	94
الفصل الخامس: التعرف على الجنس	99
عظام الحوض	100
تحديد نوع الجنس بناء على العظام أخرى غير الجمجمة أو الحوض	109
الفصل السادس: تقدير القامة	115
الفصل السابع: القياسات المترية	122
معاملات الرأس	127
معاملات الأطراف	129
الفصل الثامن: التشوهات الخلقية والشذوذ في تكوين العظام	133
تعظم التداريز المبكر	133
الرأس المنحرف أو الوارب	139
انعدام الرأس	139
النقب وإزالة عظيمات من الجمجمة	139
العمود الفقري	141
الباب الثاني	145
الفصل التاسع: مرض العظام الأيضي	147
داء الأسقربوط	147
ترقق العظام	163
التمعدن العظمي غير الكافي	165
لين العظام	176

الفصل العاشر : أمراض الدم - الأنميما	١٨٣
الثلاسيميا العظمى والبسيطة	١٩٣
أنميما الخلية المنجلية	١٩٦
أنميما نقص الحديد	١٩٩
المalariay والأنيما الوراثية	٢٠٣
فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بين الهنود الأميركيين	٢٠٤
مرض العظام الإسفنجي في العيون	٢٠٦
الفصل الحادى عشر : الذرة والمalariay وأنميما في سكان العالم الجديد	٢١٩
مalariay العالم الجديد	٢٢٢
أنميما العالم الجديد	٢٢٤
الذرة	٢٢٦
الفصل الثاني عشر : طبيعة التغيرات العظمية الناتجة عن مرض السل ومميزات هذا المرض عن غيره من الأمراض	٢٣٥
الفصل الثالث عشر : داء الزهرى والسل (الدرن) - شواهد من العالم الجديد	٢٦٥
الزهرى	٢٦٧
الدرن أو السل	٢٨٢
سرد بالمصطلحات	٣٠١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدَّمَةٌ

منذ أن نشأت الأنثروبولوجيا العضوية كفرع مستقل من العلوم البيولوجية ، ودراسة الهياكل العظمية البشرية تشق طريقها كأحد أهم مجالات الدراسة في هذا التخصص . وهذا أمر طبيعي ، فعلماء الأنثروبولوجيا العضوية يجدون أنفسهم معتمدين اعتماداً كلياً على المعلومات التي توفرها الهياكل العظمية القديمة ومورفولوجيا الأسنان عن العلاقات البيولوجية القديمة والتكيف والسلوك وتبع الأحداث التي طرأت على الجماعات الإنسانية خلال مسيرتها التطورية .

ومع نشأة هذا الفرع من الدراسات الأنثروبولوجية ، ركز الرواد الأوائل على التصنيف والوصف لهذه المقايا حيث أن طرق البحث العلمية المنظمة وأدوات البحث الأنثروبولوجى لم تكن قد ظهرت بعد . بالإضافة إلى ذلك ، فإن العلوم البيولوجية والحيوانية كانت في بداية تطورها وهذا ما أعاد مسيرة البحث العلمي في هذا التخصص من التقدم بالسرعة المتوقعة . ولكن مع تطور هذه العلوم وتحسين طرق وأدوات البحث العلمي بدأت دراسة العظام تحول من الدراسات الوصفية إلى الدراسات العلمية المنظمة التحليلية من منظور بيولوجي إيكولوجي - ثقافي في محاولة لإعادة بناء تطور التاريخ الإنساني البيولوجي والثقافي .

وبالنسبة لدراسة العظام الإنسانية القديمة والمعاصرة ، فإن الهيكل العظمي يوفر المواد الخام ليس في الدراسات الأنثروبولوجية فقط ولكن

للمهتمين من فروع العلوم البيولوجية والطبية الأخرى كعلم التشريح والجراحة والنسيج والكيمياء الحيوية والطب الشرعي بالإضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية كالجغرافيا البشرية وعلم السلالات والجيولوجيا والتاريخ.

ويعود تاريخ الاهتمام بدراسة الهياكل العظمية إلى «هيرودوت» العالم الإغريقي الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، والذي أورد في ما كتبه وصفاً مقارناً دقيقاً لجماجم المصريين وسكان بلاد فارس القدماء. أما أبو قرات (٤٦٠ - ٣٧٧ ق. م) فقد كان أول من بين أهمية تأثير المناخ على المورفولوجيا الإنسانية وأن الاختلافات بين الجماعات الإنسانية ترجع إلى عوامل المناخ في البيئات الطبيعية المختلفة. أما أيرازبستراتس Easistratus (٣٧٥ - ٣٢٠ ق. م) وهو رفيلاوس Horphilus يقضي بموجبه أن يتدرّب جميع تلامذة الطب على التشريح وأن يعمل الطالب على تشريح جثة واحدة على الأقل خلال فترة تدريسه في الكليات الطبية؛ وعلى هذا فقد طرد فرديريك الثاني من الكنيسة الكاثولوكية بأمر من البابا. وفي عام ١٥٤٣ نشر أمدرياس فيساليوس Andreas Vesalius كتابات في التشريح، وعلى يديه ظهر علم التشريح الإنساني كعلم متخصص في العلوم البيولوجية.

في الولايات المتحدة ظهر علم تشريح العظام على يد صامويل مورتن Samuel Morton بنشر كتابه «الجمجمة الأمريكية» عام ١٨٣٩ والذي اعتمد فيه على دراسة مقارنة في التشريح وال العلاقات البيولوجية لآلاف من الهياكل العظمية لسكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر. وكان جل اهتمامه ينحصر في التعرف على تاريخ سلالة الهنود الحمر من خلال دراسة بقاياهم العظمية. وقد أكمل علماء التشريح والأثربولوجيا العضوية دراسات مورتن. ونذكر منهم جوزيف ليدي Joseph Leidy وأيسكن ميجز J. Aitken Meigs.

كتاباتهما عن مميزات وأهمية الجمامجم البشرية في دراسة السلالات الإنسانية. وأكثر علماء التشريح والأثربولوجيا العضوية شهرة العالم الأمريكي التشيكوسلوفاكي الأصلي أليس هردىشكا Ales Hrdicka الذي نشر ما يزيد على ثلاثة مائة مقالة وبحث علمي عالى فيها مشكلات أثربولوجية وتشريحية مختلفة في السلالات وعلم القياس والأمراض والتطور الإنساني.

والهدف من ترجمة هذا الكتاب هو توفير المعلومات الضرورية لطالب الأثربولوجيا والعلوم الطبية والبيولوجية والطب الشرعي في تشريح الهياكل العظمية البشرية وهذا يشمل استخراج العظام وصيانتها وتعریف الطالب بمورفولوجيا الأجزاء المختلفة التي تكون الهياكل العظمي والأسنان وتقدير العمر وتقدير الجنس ومعرفة السلالة التي يتبعها الشخص المتوفى والأمراض التي تصيب العظام الإنسانية القديمة أو المعاصرة. وأأمل أن يكون هذا الكتاب أداة قيمة في يد الباحثين في هذه المجالات حيث تتضمن هذه الترجمة بالإضافة إلى الكتاب الأصلي المعنون Forensic Anthropology ثلاثة Richard Mac Williams الذي قمت بتأليفه مع الدكتور بحوث نشرت في مجلات علمية مختلفة في أمراض السل والسرطان والزهري والمalaria وفقر الدم (الأنيميا) وهي من تأليف المترجم.

والمقالات الثلاث نشرت باللغة الإنجليزية كالتالي :

1 - Maize, Malaria and the Anemias in the Pre - Columbian New World. Reprinted from Yearbook of Physical Anthropology, Volume 20, 1976 (Published by the American Association of Physical Anthropologists, 1977), PP. 329 - 337.

2 - Human Treponematosis and Tuberculosis Evidence from the New Worlds. Reprinted from American Journal of Physical Anthropology, Vol. 51, No. 4, November 1979, PP. 599 - 618.

3 - Natural Variation and Differential Diagnosis of Skeletal

Changes in Tuberculosis. American Journal of Physical Anthropology
52, PP. 153 - 167.

وهناك فصل في فقر الدم (الأنيميا) وفصل آخر في مرض العظام الأبيض وهو
من تأليف الدكتور Ted Steinbock من كتابه المعنون *Paleo Pathological Diagnosis and Interpretation*.

وقد تم نشر هذا الكتاب من قبل مطبعة شارلز توماس بمدينة شيكاغو الأمريكية عام ١٩٧٦ . وأود أن أتقدم بالشكر إلى كل من الدكتور عدنان الغربلي الذي ساعد في ترجمة الفصل التاسع والستيضة نادية محمود نافع التي قامت بطبعه الترجمة والأنسنة سعدية صفرح التي قامت بمراجعة الكتاب لغويًا.

الْبَابُ الْأُولُ

عِلْمُ تَشْرِيفِ الْعِظَامِ

الفصل الأول

استخراج العظام وصيانتها

Recovery and Treatment of Bone

إن استخراج العظام يكون في العادة مسؤولة عالم الآثار أو رجل الشرطة . ومع أن هناك طرقاً عديدة لاستخراجها ، إلا أنه من الأفضل أن تتم بواسطة الباحث الأثري الأثربولوجي حيث إن المعرفة بالتقنيات المطلوبة في العمليات الحفرية متوفرة لديه . والطريقة المثلثى تسم أيضاً باستدعاء المتخصص في علم البشريات العضوي للإشراف على استخراج البقايا العظمية التي يتم الكشف عنها من قبل عالم الحفريات أو رجل الشرطة .

ونقدم هنا وصفاً دقيقاً لأفضل طرق البحث الحديثة في عمليات الحفر ، واستخراج العظام وصيانتها ودراستها كأداة قيمة في الأبحاث الطبية والأثرية والشرعية .

١ - الموقع الأثري : The Site

من أهم قواعد الحفر أن لا يسمح بأي عطب أن يحدث للعظام بجانب ذلك الذي حدث منذ الدفن ، فيجب استخراج العظام كاملة بقدر الإمكان لأن العظم المفقود في بعض الأحيان يكون هو الجزء الذي ربما يحتاج إليه الباحث ويعتمد عليه في الإجابة على أسئلة دقيقة في التعرف على الجنس والعمر والسلالة وسبب الوفاة . وإذا لاحظ الباحث أن هناك بعض العظام ، وخاصة الصغيرة منها ، مفقودة ، فيتوجب عليه العودة والبحث من جديد في الموقع عن هذه البقايا التي غالباً ما تكون كسرات عظمية صغيرة ، كعظام الأصابع والقدم أو الأسنان .

وإذا كانت عملية الحفر هي مسؤوليتك فعليك أن تقوم بعمل خارطة تبين مكان الموقع في الزيارة الأولى وهذا يسهل عليك العمل في الزيارات اللاحقة ولغيرك في مراحل دراسة مستقبلية . ويجب أن تحتوي الخارطة على ملامح الموقع التي غالباً ما تكون هي الملامح الدائمة بالإضافة إلى توضيح أهم مكان معروف وقريب من الموقع الأثري . وهذا أيضاً ينطبق على التصوير، فالصور تساعد كثيراً في إعادة رؤية أكثر واقعية للمكان ، كما يتوجب على الباحث أن يقوم بعمل رسومات للقبر وما بداخله من أدوات وقرابين . . . إلخ . وبجانب الهيكل العظمي ، يجب أن يحفظ الباحث بملحوظاته حول عملية الحفر وذلك إما عن طريق جهاز تسجيل وهو الأنسب طالما أنه سيقول أشياء لن يدونها أو عن طريق تدوينها في دفتر الملاحظات كلما أمكن ذلك .

وعملية التصوير والرسم يجب أن تتم قبل إزالة أي من العظام أو البقايا الأخرى من مكانها . ويجب ملاحظة مكانها واتجاهها وحالتها وكل ما هو مفقود منها . وقبل أن تبدأ كباحث في إخراج العظام ، نظفها من كل ما يتعلق بها من الرمال أو الطين أو الأوساخ قبل رفعها من مكانها الأصلي . والعظام تبدو غالباً أكثر صلابة مما هي عليه في الحقيقة ، فكن حذراً ولا تمسك أي من العظام من وسطها بل التقاطها من طرفيها في وقت واحد وانقضها ببطء من الأتربة العالقة بها وارفعها فقط عندما تتأكد أنها خالية من كل ما فيها وماجاورها . أفرغ الجمجمة من محتوياتها من التراب أو الطين وأزل الأوساخ من خلال الثقب الكبير أو من خلال أي فتحة أخرى إذا كانت الجمجمة مكسورة . لاحظ أن نقاط التقاء عظام الوجه ووعاء المخ هشة وسريعة الكسر ومن الصعب إن لم يكن من المستحيل إعادة تركيب أو إصال هذه العظام ببعضها البعض . فالأسنان غالباً ما تسقط من الفكين حتى عندما تكون الجمجمة كاملة ، لذا يجب البحث عنها عن طريق غربلة التربة المحيطة بالقبر والتأكد من العثور عليها .

وحين الانتهاء من رفع العظام والأسنان والبقايا المادية الأخرى ، ضعها منفصلة في أكياس من الورق أو ما شابه بعد تغليفها بالقطن أو بمواد

غازة أخرى ثم ضع علامة على كل كيس بين فيها رقم المدفن واسم الموقع قبل نقلها إلى المختبر. ولا تخلط العظام مع بعضها لأن احتكاكها ربما يعمل على فقدان بعض المعلومات الموجودة على السطح ، وخذ عينة من التراب من داخل العظام وأخرى من التربة البعيدة عن العظام من نفس الحفرة وذلك لتحليلها كيماوياً بواسطة خبير التربة وعالم البشريات العضوي ، فكثيراً ما تحتوي هذه التربة على البذور أو حبوب اللقاح أو عظام الحيوانات الصغيرة التي توفر معلومات هامة عن نوعيات الطعام التي كانت متوفرة لمن عاشوا في هذا الموقع .

٢ - في المختبر : At the Lab

في المختبر، افتح الأكياس التي فيها العظام بعناية ، وإذا كان هناك تراب أو طين عالق بالعظم من الداخل أو الخارج نظفه بالفرشاة أو بأداة أخرى ، وإن لم يكن بالإمكان ذلك أغسلها بماء فاتر بيضاء. إفعل ذلك في وعاء للغسيل (طشت) وليس في حوض الغسيل لأن هذا يمنع فقدان الأسنان أو شظايا العظام المكسرة أو الرصاص أو أية بقايا صغيرة أخرى. أترك العظام تجف في الهواءطلق وفي مكان ظليل لتجنب تشقق وتهشم العظام وبعد أن تجف العظام في زمن يتراوح ما بين ٤٨ إلى ٢٤ ساعة يصبح بالإمكان حينئذ إنجاز عملية الترميم .

ولمعالجة العظام وصيانتها يمكن استخدام رغوة الأكرييليك أو أي مادة أخرى تتحلل في محلول الأسيتون. ضع العظام في محلول واتركها حتى تتوقف الفقاعات عن الظهور فوق سطح محلول ، اسحب العظام من داخل محلول بواسطة ملاقط واسمع للمحلول بالخروج إلى أن يتوقف التقطر ثم ضع العظام على شبك حديدي حتى تجف في فترة تتراوح ما بين ٨ إلى ٢٤ ساعة. يجب أن تكون العظام جافة تماماً حتى يتتسنى تخزينها وترميمها للدراسة .

٣ - الترميم : Preservation

بالنسبة لعملية الترميم فهذا يعتمد أولاً على مقدار العطب الذي أصاب

العظام قبل وبعد استخراجها ، فكلما قلت كمية العطوب (الكسور وتهشم العظام) كلما كانت عملية الترميم أقل صعوبة ، وأقل استهلاكاً للوقت ، وإذا كانت الكسور من النوع العام (الشائع) كالكسور في العمود الفقري أو العظام الطويلة بدون فقدان شظايا تكون عملية الترميم بسيطة . أما إذا كانت العظام مهشمة وخاصة عظام الجمجمة فإن عملية الترميم تكون صعبة وتحتاج إلى الصبر والبراعة وخبرات دقيقة . وكما ذكرنا سابقاً يجب استعمال نوع الغراء الذي يتحلل في الأسيتون لأن هذا يسمح بمعالجة الأخطاء ، ولا تستخدم قاعدة إسمانية حيث إنه لا يمكن فكها عندما تجف ، وأفضل الطرق هو استخدام صندوق من رمل ناعم حيث توضع العظام ريشما يجف الصمغ .

إن إلمام الباحث بتعلم تشريح العظام يكون باللغ الأهمية بالنسبة لإعادة تركيب العظام وهي عملية أشبه ما تكون بحل لغز . وأنسب الطرق تتم في العادة بوضع العظام مثل عظام الجمجمة ، العظام الطويلة . العظام الصغيرة وعظام الحوض على سطح طاولة . تؤخذ مجموعة من العظام المتشابهة من الناحية التشريحية لتركيبها مع بعضها البعض ، وقد تكون هناك بعض الشظايا المفقودة أو الكسر الصغيرة وهنا يجب أن لا يحاول خبير المختبر إعادة الترميم عن طريق تركيبها بالقوة .

٤ - الدراسات الجنائية : Forensic Studies

عندما تكون هناك مشكلة قضائية بالنسبة للبقايا العظمية التي يراد فحصها ، كجريمة قتل على سبيل المثال ، وهناك طرق معينة يجب اتباعها حتى يتوصل الخبير إلى حل المشكلة . وتذكر أن هذه مسألة قانونية ، ويتوارد عليك أن تكون متأكداً من كل ما تدونه من معلومات وأن تكون معلوماتك موثقة بدلائل مؤكدة . وعليك أن تكون دقيقاً في إجاباتك وخاصة حينما يترتب على شهادتك إدانة أو براءة متهم وتحتاج كمستند أو وثيقة رسمية حول البقايا كما استلمتها وأثناء فحصك لها ، مما يجب معه أن يسترعي انتباحك أي شيء غير عادي في أي جزء من الهيكل العظمي فربما تحتاج إلى هذه المعلومات حين الإدلة بشهادتك .

وللبقايا النسيجية ، إذا كانت ما تزال محفوظة مع البقايا العظمية أهمية متميزة وخاصة في التعرف على السلالة التي ينتمي إليها المتوفى . ففي حالة تحلل الجلد يتحول لونه إلى البني الداكن أو الأسود في من ينتمي للسلالة القوقازية ، بينما يتغير الجلد الرننجي إلى اللون الرمادي . ويعتقد كيرلي (1972) أن تغير لون الجلد يعتمد على كمية الميلانين الموجودة تحت طبقات الجلد ، هذا بالإضافة إلى الشعر الذي له特يئات معروفة في تحديد هوية المتوفى .

وبعد أن تم عملية تدوين البيانات المستخلصة من البقايا المتوفرة يجب إزالة ما تبقى من اللحم المعطوب من على العظام ، وتأكد أنك تحمل تصريحًا من السلطات المختصة قبل القيام بهذه الخطوة . وتم إزالة الأنسجة اللحمية إما عن طريق الغلي أو بإضافة محليل أو مواد كيمائية . وبعد سلخ الجزء الأكبر من النسيج الناعم الذي يحيط بالعظام ، ضع البقايا في وعاء يحوي مادة الأنثيفورمين Antiformin بقدر يكفي لتغييتها . بالنسبة إلى الخليط استخدم جزءاً واحداً من الأنثيفورمين إلى ٨ - ١٠ أجزاء من الماء وسخن المزيج إلى درجة ما قبل الغليان واحتفظ بدرجة الحرارة من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة وذلك يعتمد على مقدار السرعة التي تمت تعرية العظام بها . وقد يكون ضروريًا في بعض الحالات تكرار عملية الغلي والتقطيف (الاحت) مرات عديدة ، وإذا تركت العظام في الماء لمدة طويلة فإن محلول سيدأ بمهاجمة العظام نفسها . وبعد إخراج العظام نهائياً من محلول ، اغسلها بماء جاري واتركها تجف . بعد ذلك ضع العظام في محلول البنزول (بنزين غير نقي) لمدة ٢٤ إلى ٤٨ ساعة لإبعاد الرائحة . ثم اتركها في محلول Hydrogen Pyroxide أو Potassium Hydroxide (KOH) بنسبة ٣٪ .

إن عملية التبييض بطيئة وربما تستغرق أكثر من ٢٤ ساعة . وفي هذا الشأن يقول سنايدر ومساعدوه (Snyder et al 1975) إنه من الممكن تصفيية مادة الأنثيفورمين وإعادة استخدامها مرات متكررة خاصة إذا تمت إضافة القليل من الأوزورمين الجديد بين الحين والأخر . وبالنسبة لمحلول

البيروكسايد فمن الممكن إعادة استخدامه ، ولكنه يعمل ببطء في هذه الحالة. ويدرك سنايدر ومساعدوه طريقة أخرى لتنظيف العظام إذا كان هناك متسعًا من الوقت . ويتم ذلك بوضع البقايا في محلول الأنثيفورمين لمدة أربعة أيام وهذا يقلل من وقت الغليان إلى حوالي خمس دقائق لأن تكرار الغليان ، كما تبين لهؤلاء الباحثين ، قد يتسبب في تشقق العظام. ولهذا فإن هذه الطريقة مرغوبة وخاصة في حالة تنظيف العظام الرقيقة كعظام الجمجمة أو عظام الكتف . أما بالنسبة لنزع النسيج الغضروفي الملتصق بالفقرات العظمية ، انقع العمود الفقري في طشت وأضف إليها محلول Trichloroethane لمدة يومين أو ثلاثة ، اغسل البقايا بماء عادي ، ثم ضعها مرة أخرى في محلول Hydrogen Pyroxide لمدة يومين أو ثلاثة آخر وستكون هذه المفاصل حينئذ سهلة التحرك بلا آلية معالجة إضافية .

الفصل الثاني

الهيكل العظمي

The Human Skelton

تشكل العظام هيكل الجسم ، فهي التي تضفي عليه قوته ومتانة ، كما تتبع له التنقل من مكان إلى آخر دون أن يهوي كالتع班 الميت . كما أن العظام تحمي الأعضاء الداخلية ، فعظام الجمجمة مثلاً تحمي المخ ، والأضلاع تحمي الرئتين ، والقلب ، وإلى حد ما عظام الحوض تحمي الأحشاء التي تقع في الجزء الأسفل من الجسم .

والعظم على أشكال وأحجام مختلفة ، فهناك العظام الطويلة مثل عظام الذراعين والساقين وهناك العظام القصيرة مثل عظام الأصابع ، كما أن هناك العظام المفلطحة مثل عظام اللوح . وكل عظم من عظام الجسم مهمًا بحيث يؤدي وظيفة محددة . فلا تجد في العظم بروزاً أو تجويفاً إلا وله غرض معين في الحفاظ على الجسم الإنساني كنسق متتكامل .

والعظم هو المادة الأساسية في تكليس جميع فقرات جسم الإنسان ، وت تكون العظام من مادة كثيفة تنفس فيها خلايا عنكبوتية وخلايا عظمية . وتحتوي هذه المادة على ألياف هلامية وخليل من حبيبات كلسية وفوسفاتية ، أما القاعدة الإسمنتية فتحتوي على مادة مركبة من السكر المخاطي (Bourne, 1972) .

والعظم هو أقوى جزء في جسم الإنسان باستثناء مينا وعلج الأسنان . كما أن العظم حشن وقليل المرونة ويتحمل الشد والضغط إلى حد ما . وت تكون العظام من نوعين من أنواع النسيج العظمي : مادة كثيفة عاجية الشكل تكون

الجزء الخارجي للعظم ، ومادة مكونة من صفائح متعددة من خلايا شوكية مكونة طبقة لينة . والجزء الداخلي للعظم والهيكل العظمي عبارة عن مجموع عظام مختلفة الشكل بعضها منتظم ، والبعض الآخر غير منتظم ، وبعضها مفرطع ، وبعضها مستطيل ، ويتاسب كل نوع مع موضعه من الجسم والعمل الذي يقوم به . وتنشأ هذه العظام في مستهل الحياة الجنينية من الطبقة الجرثومية الوسطى المعروفة بالميزودرم ، عادة من أغشية غضروفية وتليلاً ما تنشأ من أغشية عادية . ويتحول النسيج الغضروفي أو الغشائي أحياناً إلى نسيج عظمي بواسطة مراكز تعرف بمراكيز التعظم الأولية ، ثم الثانوية وتنشأ مراكز التعظم الابتدائية في مستهل الحياة الجنينية ابتداءً من الشهر الثاني داخل الرحم في أنسجة الطبقة الجرثومية الوسطى كما ذكر . وهناك عادة مركز تعظم واحد لكل عظمة ويظهر غالباً في وسط النسيج فيحوله إلى نسيج عظمي عدا عن طرفه أو أطرافه ، أو نتوءاته الأساسية التي تبقى غضروفية إلى ما بعد الولادة . ومراكيز التعظم الثانوية هي عبارة عن مراكز للنمو تشبه مراكز التعظم الأولية في تركيبها الشكلي وتنشأ في أطراف العظام ونتوءاتها الأساسية ، وتظهر دائماً بعد الولادة حتى سن البلوغ ، ولكل مركز تعظم ثانوي مكانه الخاص به حتى تتم عملية التعظم .

ولما كان لكل عظم وقت خاص بظهور مركز تعظميه الأولى والثانوي والتحام أطرافه ، فإن باستطاعة الباحث تقدير السن في الظروف الطبيعية من خلال تصوير هذه العظام بواسطة الأشعة السينية أثناء الحياة . وقد تحول الأنسجة الغشائية دفعة واحدة إلى عظام مثل ما يحدث في عظام غطاء الجمجمة ، ولكن في معظم الأحوال تحول هذه الأنسجة إلى أنسجة غضروفية ومنها إلى أنسجة عظمية كما هو الحال في عظام قاعدة الجمجمة والعظام الطويلة للهيكل العظمي .

ويغطي العظام ويفلفها من الخارج غشاء ليفي رقيق يسمى السمحاق الظاهر ، ويحمل إلى العظام وبخاصة إلى الطبقات السطحية منها كثيراً مما تحتاج إليه من الغذاء من شرايين وأوردة وأعصاب . بالإضافة إلى أن لكل

عظم قناة واحدة على الأقل معدة لتوسيع شريان ووريد خاص بتنعيمتها ويأخذ عادة اتجاهها خاصاً بالنسبة لكل طرف عظمي ويتركب كل عظم من:

- ١ - طبقة السمحاق الخارجي .
- ٢ - طبقة قشرية من نسيج عظمي .
- ٣ - طبقة إسفنجية تلي الطبقة القشرية ونسيجها خلوي وهش وشبيكي البيان .
- ٤ - السمحاق الباطني .
- ٥ - تجويف يملئه نخاع العظام .

والعظم يتكون من حوالي ٥٠٪ ماء و ٥٠٪ مادة هلامية تتكون من نسيج مشبع من أملاح غير عضوية مثل كربونات الفوسفات الكلسية والأملاح غير العضوية . وتزداد كمية الأملاح كلما تقدم الإنسان بالعمر حيث تصبح هشه وقابلة للكسر ، والنسج الرابط هو المادة الأساسية في تكوين العظم وخلال تكوين العظم هناك خلايا معينة تسمى الخلايا البانية للعظام Osteoblasts تفرز مادة عديمة الشكل Amorphous سرعان ما تصبح أليافاً كثيفة وتعرف بعملية التعظم (تكوين العظم) وتحول إلى مادة العظم Osteoid (Bourne 1972) وتمتد عملية نمو العظام وتصلبها حتى الفترة ما بين سن الخامسة والسادسة والعشرين حيث يتوقف النمو.

والعظم نسيج حي ، وخلال دورة العمر هناك طريقان للحركة الكيميائية بين الدم والخلايا العظمية ، ونتيجة لذلك تكون المحتويات والتركيب في تغير مستمر وهذا ما يعرف بعملية البناء والهدم . والعظم مملؤ بنوعين من العظم النخاعي : مادة النخاع الأصفر ، وهذا موجود في التجويفات الكبيرة من العظام الطويلة وتحتوي على الدهون وخلايا الدم ، ومادة النخاع الحمراء الموجودة في العظام المسطحة والصغرى مثل الروابط المكونة للعظام الطويلة وأجسام الفقرات وعظمة الصدر والأضلاع . وهناك جزءان رئيسيان للهيكل العظمي هما: الهيكل المحوري والذي يحتوي على عظام الرأس والرقبة والجذع ، والهيكل الزائد والذي يتكون من عظام الأطراف

العلوية والسفلية . وفيما يلي نقدم بعض المصطلحات العلمية والخاصة بالهيكل العظمي التي يتوجب على الباحث الإلمام بها :

Axial Skeleton

(a) Skull		جمجمة
Frontal	1	جبهوي
Occipital	1	العظم القذالي ، مؤخر الرأس
Sphenoid	2	أسفيوني ، وتدى
Ethmoid	2	عظام جدران التجويف الأنفي (العظم المصفوي أو الغربالي)
Vomer	1	عظم الميكة
Hyoid	1	لامي
Mandible	1	الفك السفلي
Parietal	2	جداري
Temporal	2	صدغى
Maxilla	1	الفك العلوي
Nasal	2	أنفي
Zygomatic (malar)	2	وجني
Lacrimal	2	دممعي
Palate	2	حنك
Inferior nasal concha	2	القرن الأنفي السفلي
Malleus	2	العظم المطرقي
Incus	2	عظم السنдан
Stapes	<u>2</u>	العظم الركابي
	<u>29</u>	

(b)	Vertebral Column		ال العمود الفقري
	Cervical	7	رقبى ، عنقى
	Thoracic	12 - 13	صدرى
	Lumbar	5	قطنی
	Sacrum	1 (5 in Subadults)	العجز
	Coccyx	1 - 3	عصعص
		<hr/> 26	
(c)	Sternum	1 - 3	القص
(d)	Scapula	2	الكتف
(e)	Clavicle	2	الترقوة
(f)	Innominate	2	المضم اللا إسمى
	(Pubis)	2	المضم العانى
	(Ilium)	2	الحرقة
	(Ischium)	2	عظم الورك
(g)	Ribs	<hr/> 24 31	أضلاع

Appendicular Skeleton

(a)	Humerus	2	عصب
(b)	Radius	2	كعبرة
(c)	Ulna	2	الزند
(d)	Carpalas	16	عظام الرسخ
(e)	Metacarpals	10	مشطى
(f)	Phalanges	28	السلاميات
(g)	Femur	2	عظم الفخذ
(h)	Patella	2	رصفة
(i)	Tibia	2	القصبة عظم الساق

(j) Fibula	2	الشظية
(k) Tarsals	14	عظم كاحلي أو رسغي
(I) Metatarsals	10	مشط القدم
(m) Phalanges	28	السلاميات
	<hr/> 120	
Total	<hr/> <hr/> 206	

عظام الجمجمة


The Skull

تكون عظام الجمجمة صندوقاً عظيماً لحفظ المخ وأوعيته وأعصابه وأغشيه وذلك بالتحامها مع بعضها البعض ولكنها لا تبدأ في الالتحام إلا بعد نمو المخ إلى شكله الجمجمي الطبيعي عند سن البلوغ تقريباً. وتلتزم هذه العظام مع بعضها البعض أولاً بواسطة أغشية مرنة تتسع تدريجياً مع نمو المخ تاركة مسافات مختلفة بين بعضها البعض تعرف باليوافيغ والتي لا تثبت أن يختفي أثراها في نهاية السنة الثانية من العمر. وتتخذ هذه الأغشية شكل التداريز عند سن البلوغ تقريباً، إلا أن عظام الجمجمة تحفظ بعض هذه الغضاريف المفصلية إلى ما بعد سن العشرين. وت تكون الجمجمة من ثمانية عظام كبيرة اثنتين مزدوجتين وهي : العظم الجداري ، والعظم الصدغي لكل جهة ، وأربعة عظام منفردة وهي العظم الجبهي ، والمصفوي ، والإسفيني أي الوندي والمؤخرى بالإضافة إلى عظام أخرى كعظام الوجه (شكل ١ ، ٢) .


ومن الممكن تقسيم عظام الجمجمة إلى قسمين رئيسيين هما :

١ - الجزء العلوي ويسمى قبة الجمجمة ويحاط من الخارج بفروة الرأس ويكون من معظم العظم الجبهي والعظامين الجانبيين وجزء من العظم المؤخرى .

٢ - الجزء السفلي المكمل لقبة الجمجمة ، ويعرف بقاعدة الجمجمة . ولقاعدة الجمجمة سطحان : علوي يرتكز عليه المخ ، وسفلي يتصل بالعمود الفقري وبأنسجة العنق .



(شكل ١)
الواجهة العجانية للجمجمة




(شكل ٢)
الواجهة الأمامية للجمجمة

وتباين عظام الجمجمة في السماكة والحجم والشكل بين بعضها البعض وبين عظام الجمجمة المختلفة. وعظام الجمجمة إما أن تكون مسطحة (العظم الجداري والصدغي) أو غير منتظمة (العظمة الإسفينية أو العظم الجبهوي). وتحتوي عظام الجبهة على طبقتين هما: الطبقة الخارجية وبلغ سمكها ١,٥ ملم تقريباً، أما سمك الطبقة الداخلية فيبلغ ٠,٥ ملم تقريباً. وتفصل بين هاتين الطبقتين طبقة عظمية إسفنجية ممتدة بمادة النسيج الهراء. وأكثر الأجزاء صلابة في عظام الرأس هي نقطة الاتصال بين الدرز الإكليلي والدرز السهمي، وتعرف باسم اليافوخ وكذلك النقطة بين الدرز السهمي واللامي في نقطة تعرف باسم اللامية. وفي رأي (Pendergrass et al 1956) فإن العظام السميكة تيز الجنس الأسود. وبشكل عام فإن عظام الجمجمة أكثر سمكاً في النساء منها في الرجال. ومن الممكن استخدام هذه الميزة في تشخيص هذه العظام على أنها نسائية أو ذكرية، ولكن يجب توخي الحذر في مثل هذه الحالة، حيث إن بعض الأمراض مثل الخلية المنجلية والثلاثيسيميا وأنيميا فقر الحديد والكساح يبقى على زيادة سمك العظام.

وهناك عدة دروز تربط عظام الرأس مع بعضها البعض ، فالدرز الإكليلي يربط عظمة الرأس الأمامية مع عظام الرأس الجانبية ، والدرز السهمي يربط بين العظمتين الجداريتين ، والدرز اللامي يربط العظمتين الجداريتين مع العظمة القذالية ، والدرز القاعدي يربط العظم القذالي مع العظم الإسفيني ، والدرز المحرشف يربط عظام الصدغ مع العظام الجدارية (شكل ٣).

العظم الجبهوي : Frontal Bone

العظم الجبهوي هو العظم الأمامي للجمجمة والذي يكون الجبهة وجزء من التجويف العيني. والسطح الخارجي محدب في كلتا جهتيه ، من الأمام إلى الخلف ، ومن اليمين إلى اليسار كما يوجد بروز في كل جانب وسط العظم. ويكون العظم من نصفين أيمن وأيسر، تلتسم مع بعضها لتكون



(شكل ٣)

قبة الجمجمة ويتضمن فيها الدروز المختلفة

عظم واحدة مع نهاية السنة الثانية. أما سطحه الأنسي أي الداخلي فمقعر وبه تداريز تقابل تلافيف فصي المخ من الأمام وبه سطح حجاجي يكون معظم السطح السفلي للحفرة المخية الأمامية والسطح العلوي للحفرة الحجاجية. ويتصل العظم الجبهي مع العظم الأنفي والفك العلوي والعظم الوجني من الأمام ومع العظم الجداري من الخلف والعظم الإسفيني من كل جانب.

: Parietal Bones

يتكون العظم الجداري من عظمتين ، واحدة في كل جانب من جنبي الجمجمة وتكون الجزء العلوي والجاني للجمجمة . وللعظم الجداري سطحان؛ السطح الخارجي محدب في كلتا جهتيه ، وفي وسطه بروز يدل على مركز التعظم. أما سطحه الأنسي فمقعر وفيه أحاديد للشرايين والأوردة وتلافيف المخ. ويتصل العظم الجداري من الأمام مع العظم الجبهي ، ومن أعلى الجانب مع العظم الجداري المقابل له ومن الخلف مع العظم المؤخر والقذالي ومن أسفل مع العظم الإسفيني والعظم الصدغي .

العظم القذالي (المؤخرى) : Occipital Bone

العظم القذالي هو أحد العظام المفلطحة ويقع في مؤخرة الجمجمة ، ويتميز بوجود ثقب كبير في جزئه السفلي (قاعدة الجمجمة). وهو داخلي أو باطني مقعر ويلامس المخ وأغشيه وينقسم إلى حفرتين علويتين على شكل مثلث ، وحفرتين سفليتين على شكل مربع ، وسطح وحشي خارجي يكون جزء الجمجمة الخلفي السفلي وهو عظم محدب كبير وفي وسطه حدبة مؤخرية ظاهرة وبروز مؤخرى وخطان قفويان علوي وسفلي . وفي جزئه السفلي سطحان لقميان مفصليان على جانبي الثقب الكبير وهما نقطتنا الاتصال مع الفقرة العنقية الأولى والمعروفة بالحاملة ، وهذا السطح خشن لاتصاله بعضلات وأربطة الرقبة ، والعظمة القذالية تتحدم مع العظام الجدارية من أعلى ومع العظام الصدغية من الجانب ، ومع العظام الإسفينية من الأمام.


العظم الصدغي e TThe Temporal Bones

يتكون العظم الصدغي من عظمتين واحدة في كل جانب من الجمجمة ويكون جزءاً من جدار الجمجمة وجزءاً من قاعدتها . ويكون هذا العظم من ثلاثة أجزاء رئيسة : الجزء العلوي وهو مفرطح ورأسي وحرف العلوي محدب إلى أعلى ويعرف بالجزء القشرى ويتحد مع التصويم الصدغي ليكون القوس الوجيني ، والجزء الحلمي لوجود التصويم الحلمي به والجزء الصخري لصلابته . وبداخله جهاز حاسة السمع وجهاز حفظ توازن الجسم أيضاً . ويتصل العظم الصدغي من الأمام مع العظم الإسفيني ومن أعلى مع العظم الجداري ومن الخلف مع العظم القذالي .

العظم الإسفيني The SThe Sphenoid Bones

العظم الإسفيني أو الوتدى هو عظم يشبه الفراشة، ويمتاز بوجود جسم يتوسطه وجناحين على كل ناحية من الجانبين من أعلى وجناحين على كل جانب من أسفل ويكون هذا العظم الجزء الأوسط من قاعدة الجمجمة . وللعظم الإسفيني سطح علوي مقعر يلامس المخ وأغشيته ، وفي وسط هذا السطح تقع

حفرة الغدة النخامية ، وسطح سفلي كثير التداريز له جناحان على كل ناحية ويتصل بأنسجة قاعدة الجمجمة . ويتصل من الأمام مع العظم الوجني والجبهوي ، ومن الخلف مع العظم المؤخرى والعظامين الصدغيين ، ومن الجانبيين مع العظم الجبهوي الجداري (شكل ٤) .



(شكل ٤)
قاعدة الجمجمة

العظم المصفوى أو الغربالى : The Ethmoid

العظم الغربالى هو عظم إسفنجي رقيق ، وشكلها غير منتظم ويقع أمام العظم الإسفينى بين العينين ويكون جزءاً من وسط الجدار الأنفي .

ظام الوجه : Facial Bones

ظام الأنف Nasal Bones : عظام الأنف عبارة عن عظمتين إحداهما مقعرة والأخرى محدبة ، ويشكلان جسر الأنف . وتتصل هاتان العظمتان مع بعضهما البعض في منطقة الوسط ، ومع العظم الجبهوي من أعلى ، ويتصل الطرف الجانبي مع الفك العلوي والجبهة الداخلية .

العظم الدمعية Lacrinal Bones : العظام الدمعية وعظم نحيف

ويشبة إلى حد ما أظافر الأصابع ، ويقع وسط الجدار الذي يشكل عظام التشكيل الأنفي من الداخل . وأهمية هذه العظام تكمن في أنها تحتوي على القناة الدمعية .

ظام الفك الأعلى : Maxillary Bones

تُكون هذه العظام منتصف الوجه وظام الفك الأعلى ، ويتكون كل عظم منها من كتلة مركبة كبيرة بالإضافة إلى الجسم وأربعة نتوءات . وتحتوي الجسم على فتحة كبيرة غير منتظمة تسمى الفتحة الأنفية وعلى تجويف كبير يدعى جيب الفك الأعلى . أما النتوء الجبهي (الأنفي) فهو البروز العلوي الذي يتصل في الأعلى مع عظام الجبهة والأنف وفي الوسط مع العظم الغربالي والمحارة السفلية . والنتوء الوجني هو بروز مثلث الشكل يتصل بالعظم الوجني مشكلاً الجزء الأمامي من القوس الوجني . أما النتوء السنخي فيحمل الأسنان العليا والنتوء الحنكي يشكل معظم أرضية الأنف ومعظم الجزء الصلب من سقف الفم . والتتواءان الحنكية يلتقيان في المنتصف ليشكلان الخط الدرزي ما بين عظمي الفك الأعلى . وتتصل عظام الفك الأعلى مع العظم الجبهي والغربالي والأنفي والدمعي والوجني ومحارة الألف السفلية والحنك والميكة وظام الفك الأعلى في الجهة الثانية .


العظم الوجني : Zygomatic Bone

العظم الوجني يسند الوجنة (الخد) ويتصل وسطياً مع عظام الفك الأعلى ومن أعلى مع عظم الجبهة وخارجياً مع العظم الصدغي ، ومن الخلف مع الجناح الأكبر من العظم الإسفيني . أما البروز الخلفي فيؤلف الجزء الأمامي من القوس الوجني والبروز العلوي يكمل الجدار الخارجي لتجويف العين .

ظام الفك السفلي : The Mandible

ويتكون عظام الفك السفلي مثل عظم الفك العلوي من جزأين يتعظمان معاً في الوسط من الأمام وذلك في نهاية السنة الأولى من عمر الطفل ، ويعرف

اتحادهما بالارتفاق الذقني ويشمل كل جزء: الجسم وهو الجزء الأنسي الأفقي الذي يحمل الأسنان، والفرع وهو الجزء الرأسي الذي يقابل الجسم في زاوية الفك ويتجه إلى أعلى بنتوء أمامي حاد يسمى التتوه القرني، ونتهجه خلفي محدب في كلتا جبهتيه ويسمى التتوه اللقمي الذي يتمفصل مع حفرة الفك السفلي بقاعدة الجمجمة. ولكل من الجسم والفرع سطحان، سطح أنسي جهة تجويف الفم وسطح وحشي يكون جزءاً من عظام الوجه (شكل ٥).



(شكل ٥)
عظام الفك السفلي

العظم اللامي : Hyoid Bone

وهو عظم دقيق على شكل حدوة الحصان يوجد أسفل عظم الفك الأسفل على الحافة العلوية للحنجرة .

ظام الأذن : Ear Bones

ضمن تجويف الأذن الوسطى للجزء القذالي لكل من عظمي الصدug تقع هناك ثلاثة عظام تسمى المطرقة والسدان والركاب .

ال العمود الفقري The Vertebral Column


يتكون العمود الفقري من سبع فقرات عنقية وأثنى عشرة فقرة صدرية وخمس فقرات قطنية وخمس فقرات ملتحمة تدعى العجز وثلاث إلى خمس فقرات ملتحمة تدعى العصعص. وتفصل الفقرات بعضها عن بعض أقراص تكون من مواد غضروفية ليفية. وتتماسك الفقرات بواسطة الأربطة ، والفقرة المثلالية تتألف من جزء أوسط يدعى الجسم وهو أسطواني الشكل وسطحين خشين علوي وسفلي مع ارتفاع طفيف في الحواف. وخلف الجسم هناك القوس الفقري الذي يتتألف من وسادتين وهما نتوءان قصيران وسميكان تبرزان خلفياً ليربطا النتوء المستعرض بالجسم والصفائح عريضة ومسطحة تتجه خلف ووسط الوسادة. ويزداد خلفياً من الصفائح النتوء الشوكي. وتميز فقرات كل قسم من العمود الفقري عن القسم الذي يليه ب特اليات جوهرية خاصة ، وفي بعض الأحيان توجد مميزات خاصة بإحدى هذه الفقرات دون غيرها في القسم الواحد.

ال الفقرات العنقية : Cervical Vertebrae

وهذه الفقرات هي الأصغر ويسهل تمييزها عن بقية الفقرات وذلك بوجود فتحة صغيرة في كل نتوء مستعرض لمرور الشريان الفقري . والントءات المستعرضة صغيرة وليس لها أسطح للتمفصل مع الأضلاع ، أما النتوء الشوكي قصير وغالباً ما يكون مشطوراً عند النهاية. والفقرة العنقية الأولى (الأطلس) هي

عظم أشبه ما يكون بالخاتم ليس له جسم ولا نتوء شوكي وإن كان يوجد نتوءان مستعرضان جيدا التكوين.


كما أن أسطح التمفصل العليا على النتوء المستعرض تكون كبيرة وبضاوية ومقعرة. وتلك الفقرات تSEND بالتمفصل مع عظم القحف على جانبي الفتحة العظمية. أما الفقرة العنقية الثانية فتتميز بوجود نتوء سميك يبرز إلى أعلى من الجسم، وهذا النتوء هو الجسم المزاح للفقرة العنقية الأولى. أما الفقرة العنقية السادسة فتشبه الفقرة الصدرية الأولى من حيث الشكل وخاصة شكل النتوء الشوكي (انظر شكل ٦).



(شكل ٦)
الفقرات العنقية - أعلى - الفقرة الأولى -
وسط الفقرة الثانية. أسفل - الفقرة السادسة

الفقرات الصدرية Thoracic Vertebrae

تتميز هذه الفقرات بوجود أسطوح للتمفصل مع الأضلاع ولا يوجد فتحات للشريان الفقري . أما من ناحية الحجم فهي متوسطة أي ما بين الفقرات العنقية والقطنية ، والوسادات قصيرة والصفائح عريضة وسميكه لكن النتوء الشوكي طويل ويزداد بحدة إلى الأسفل في معظم الفقرات . والントء المستعرض تكون سميكه وطويله وقوية ، وهناك اختلافات طفيفه في الشكل والحجم ممكنا حصولها ، ولكن بشكل عام فكل الفقرات الصدرية متشابهة (شكل ٧) .



(شكل ٧)

الفقرات الصدرية والقطنية


- أعلى - الفقرة الصدرية السادسة
- وسط - الفقرة القطنية الثالثة - الوجه الأمامي
- أسفل - الفقرة القطنية الثالثة - الجانب الأيسر

ال الفقرات القطنية : Lumbar Vertebrae

وهذه أكبر الفقرات جمِيعاً وتميُز بعدم وجود الفتحة المستعرضة وأسطح التمفصل مع الأضلاع، في الجزء السفلي والجانبِي لكل نتوء متفصل علوي يوجد غالباً نتوء عظمي صغير يسمى النتوء الحلمي. أما النتوء الشوكي فيبدو سميكاً وقصيرًا وعربيضاً والصفائح عريضة وقصيرة، والفتحة الفقرية ف تكون أكبر منها في الفقرات الصدرية ولكنها أصغر مما هي عليه في الفقرات العنقية (شكل ٧).

العجز : The Sacrum

والعجز هو عظم كبير مثلث الشكل والفرقة العجزية الأولى هي الأكبر وما يليها من فقرات تتوالى في الصغر. والسطح الأمامي المقوس الأمامي (أو الحوض) يؤلف تجويف العجز، والسطح الخلفي يكون خشنًا وغير منتظم وفيه تتصل العضلات والأربطة الثقيلة للظهر (شكل ٨).



(شكل ٨)

عظم العجز - الصورة اليمنى للعجز من الخلف
والصورة اليسرى للعجز من الأمام

ويشمل عظم العجز على عظم إسفنجي التركيب محاط بطبقة خفيفة من العظم الصلب وعلى السطحين الأمامي والخلفي وهناك أربع من الفتحات ما

بين الفقرات. ويتمفصل العجز مع أربعة عظام: الفقرة القطنية الخامسة والفقرة العصعصية الأولى ومع العظام عديمة الاسم في كلا الجانبين.

العصعص : The Coccyx

يتكون العصعص من عظام صغيرة تكون القطعة النهائية من العمود الفقري. وتتكون عظام العصعص في العادة من أربع فقرات عصعصية ولكنها قد تختلف من ثلاثة إلى خمس وتلتتحم مع بعضها البعض وقت البلوغ. والفقرة الأولى هي الأكبر أما الباقيات فتدرج في الصغر، ولا تحتوي الفقرات العصعصية على الصفائح ولا الوسائل ولا التوءات الشوكية.

عظام الصدر Bones of the Thorax

الأضلاع : Ribs

إن الصلع النموذجي هو عظم طويل محدب يتمفصل مع فقرتين صدريتين واحدة تقابلها والثانية أعلى منه ، والضلاعان الحادي عشر والثاني عشر لهما سطح متالف واحد للفقرة المقابلة . كما أن للصلع الأول سطح متالف واحد ، يكون قصيراً ومحدباً بشكل حاد وأعرض نسبياً من بقية الأضلاع . وتقع خلف العنق . ما عدا في الضلاعين الآخرين ، درنة صغيرة تتمفصل مع التوءات المستعرضة للفقرات الأعلى منها . والصلع الثاني أطول بكثير من الصلع الأول وأكثر نحافة . أما الأضلاع من الثالث إلى السابع فيزيد طولها باطراد وما يليها يقل حجمها بانتظام .



عظام القص : The Sternum

يتكون القص من ثلاثة أجزاء : الجزء العلوي : وهو سميك وعربيض ويتمفصل من الجانبيين مع عظم الترقوة والصلع الأول ، الجزء الأوسط (الجسم) : وهو أنحف وأضيق ، والجزء الأسفل : وهو الأصغر وفي العادة يكون مثلث الشكل ولكنه يختلف كثيراً من شخص إلى آخر . ويكون هذا الجزء غضروفيأ عند الصغار ولكنه يتضخم ويلتحم مع الجسم (الجزء الأوسط) عند البالغين ، ولكن من الممكن ألا يتضخم (شكل ٩) .

عظم الترقوة : The Clavicle

هو عظم طويل ونحيف ويقع فوق الصلع الأول . والنهاية الداخلية فيه

تكون مستديرة وتمفصل مع عظم القص . أما النهاية الخارجية ف تكون عريضة وتمفصل مع نتوء عظم الكتف (شكل ٩) .



(شكل ٩)

أعلى - القص
وسط - سطح الترقوة من أعلى
أسفل سطح الترقوة من أسفل



ظام الطرف العلوي Bones of the Upper Extremity

عزم الكتف : Shoulder Blade

ويسمى أيضاً لوح الكتف وهو عظم مسطح رقيق ومثلث الشكل . والسطح الأوسط على شكل تجويف سطحي عريض ، وفي الزاوية العليا الخرجية هناك سطح بيضاوي صقيل يسمى التجويف سطحي التقرر يتمفصل مع رأس عظم العضد . أما السطح الظاهري فيقسم فيه التتوء إلى نقرة علوية ونقرة سفلية ، ولعزم الكتف ثلاثة حدود : علوي : مقعر ويمتد من الزاوية الوسطية إلى قاعدة التتوء الغرافي . خارجي : على هذا السطح يوجد انبعاج نصف دائري يسمى انبعاج عظم الكتف ، وهناك شوكة تؤلف قمة الكتف وتمفصل من الأمام مع النهاية الخارجية للترقوة . التتوء الغرافي يتصل بواسطة قاعدة عريضة في الحد العلوي قرب رقبة عظم الكتف . أما الحد الثاني فيسمى الحد المساعد (الإضافي) : ويبدأ عند حافة التجويف سطحي التقرر وينحدر جانبياً إلى الزاوية السفلية . وهذا الحد هو أسمك الحدود الثلاثة . والحد الثالث هو الحد الفقري : وهو أطول الحدود الثلاثة ويمتد من الزاوية العليا إلى الزاوية السفلية (شكل ١٠) .

عزم العضد : The Humerus


وهذا أكبر عظم في الطرف العلوي . وفي نهايته العلوية عقدة نصف كروية كبيرة تسمى الرأس . أما الدرنة الكبرى والدرنة الصغرى فهما بروزان



(شكل ١٠)
منظار أمامي وخلفي لعظم الكتف

في الجهة الخارجية للرأس، والجزء الأوسط من الجسم يكون مستديراً ولكن العظم يصبح مسطحاً خارجياً في نهايته السفلية. أما الجزء المسطح السفلي فيتشكل بروزين داخلي وخارجي (أنسي ووحشي). والسطح المتعرّض السفلي مقسم إلى جزأين: الخارجي وهو بروز مستدير أملس (الرأس) ويترافق مع النهاية العليا لعظم الزند، والجزء العلوي والأمامي. وهناك انبساط صغير يسمى الحفرة التاجية وإليها يتصل التتواء التاجي لعظم الزند عندما تثنى


الذراع . كما أن هناك حفرة أخرى في السطح الخلفي من البكرة وهذه الحفرة تستقبل نتوء عظم الزند عندما تمد الذراع . وهذه الحفرة غالباً ما تكون مثقوبة خاصة عند النساء وبذلك تسمح بدرجة أكبر من الامتداد عند مفصل المرفق (شكل ١١) .



(شكل ١١)
عظم العضد - اليمين - الواجهة الخلفية
اليسار - الواجهة الأمامية

عظم الزند The Ulna

يوجد في الجزء الأنسي (الداخلي) من الساعد ، وفي النهاية العليا هناك ارتفاع كبير وسميك يشبه الخطاف ويسمى النتوء المرفقي . والناتئ الإكليلي يبرز أمامياً مباشرة أسفل انبعاث المرفق . وجسم عظم الزند محدب خارجياً وظاهرياً . لكن النهاية السفلية لها جزء على شكل عقدة يدعى الرأس وبجواره يوجد بروز مخروطي يدعى الشاخصة الأبرية للزند (شكل ١٢) .



(١٢) شكل

عظم الزند والكعبرة

اليمين - منظر خلفي.


اليسار منظر أمامي

عزم الكعبرة The Radius


يقع عظم الكعبرة موازياً لعظم الزند في الجزء الخارجي (الوحشي) من الساعد. وفي النهاية العليا يوجد قرص دائري يسمى الرأس يتمفصل مع رأس عظم العضد وعظم الزند. وفي الجزء الداخلي (الأنسى) مباشرة تحت الرأس هناك الدرنة الكعبرية. والجسم أضيق علوياً ومقوس قليلاً ومحدب خارجياً. والنهاية السفلية أكبر من النهاية العليا ولها بروز مخروطي في الجهة الخارجية باتجاه الأسفل يدعى الشاخصة الأبرية. أما السطح المتمفصل مع عظم الزند فيدعى الانبعاج الزندي للكعبرة. وفي نهايتها السفلية تتمفصل الكعبرة مع عظمين من عظام الرسغ هما العظم الزورقي والعظم الهلالي (شكل ١٢).

عظام الكف Bones of the Hand

تتكون عظام الكف من خمسة عظام مشطية مرقمة ابتداءً من الجهة الكعبية أو الإبهامية. وتمفصل العظام الأربع الداخلية (الأنسية) بواسطة قواعدها مع بعضها البعض ومع عظام الرسغ. والعظم المشطي الأول (الإبهام) هو الأقصر والأسمك. أما مشط أصبع السبابية (رقم واحد) فهو الأطول وقاعدته هي الأكبر من الأربع الباقية. والثالث والرابع والخامس يتناقصون بالحجم بالتتابع. وهناك أربع عشرة سلامية. ثلاث لكل أصبع وأثنان للإبهام. وسلاميات الأصبع تبدو مسطحة على الجانب الراحي للكف. وعظام المشط الخارجية تمفصل علويًا مع عظام الرسغ ورأس كل مشط يتمفصل سلفيًا مع عظم الأصبع المطابق له (شكل ١٣/أ ١٣ ب).



عظام الكف - الوجه الظاهري



(شكل ١٣ ب)
عظام اليد - راحة اليد

عظام الطرف السفلي Bones of the Lower Extremity


عظام الحوض : The Hip Bones

عظم الحوض كبير ومسطح وغير منتظم ويكون من ثلاثة عظام متدرجة مع بعضها البعض وهي: الحرقفة والورك والعانة . وفي نقطة التقاء هذه العظام هناك انبعاج نصف كروي يسمى التجويف الحقي وهو محل التقاء رأس عظم الفخذ . والحرقة هي أكبر العظام الثلاثة م-curva وعربيضاً جداً ويتألف عظمها من جزئين رئيسيين: الجسم ، و يؤلف الجزء العلوي من الحق ، والجناح وهو جزء واسع يشبه المرقطة وهو الذي يحد الحوض خارجياً . والورك يؤلف

الجزء الأسفل والظهري من عظم الحوض وله جسم وفرع حيث يؤلف الجسم خمس الحق . أما النتوء أو الشوكة الوركية وهو ارتفاع مثلث ويز من الحد الظاهري . وفوق الشوكة هناك الفتحة الوركية العظيمة . وأسفلها هناك الفتحة الوركية الصغرى . وظاهرياً إلى الثقب السادس هناك تضخم حشن كبير يسمى الدرنة الوركية . أما العانة فتؤلف الجزء الأمامي للحق ويتمفصل العظم العاني في الوسط (شكل ١٤) .

عظم الفخذ The Femur

وهو أطول وأثقل وأقوى عظام الجسم . وفي النهاية العليا هناك الرأس والعنق والمدورات الكبيرة والمدورات الصغرى . والرأس كبير مستدير . أما العنق فيربط الرأس إلى الجسم ويقع على زاوية قائمة مع الجسم . والمدورات الكبيرة هي البروز العلوي الكبير على الجزء الخارجي من الساق



(شكل ١٤)
عظمة الحوض اليسرى

في محل التقائه مع الرقبة . والمدوره الصغرى هي الأصغر ، وهي ارتفاع مخروطي على الجزء الداخلي من الجسم مباشرة تحت العنق . وهناك بروز طولي على الجزء الخلفي من الجسم طولياً . والنهاية السفلية لعظم الفخذ تؤلف لقمنتي عظم الفخذ الداخلية والخارجية حيث يتصلان من الأمام ويفترقان من الخلف وبينهما من الناحية الخلفية نقرة عميقه تسمى الحفرة ما بين اللقمتين . وهناك أيضاً جواراً لللقمتين وهما سطحين مرتفعين خشنين في السطحين الداخلي والخارجي لللقمتين . وجوار اللقمة الداخلية يكون أكبر وأكثر ارتفاعاً من الخارجية (شكل ١٥) .




Figure 9b.

(شكل ١٥)

عظام الفخذ

اليمين - الواجهة الخلفية

اليسار - الواجهة الأمامية

الرُّضْفَة The Patella

وهي عظم سمسي كبير يمؤلف الارتفاع المشاهد أمام الركبة عندما تثنى

الساق وهي في العادة مسطحة ومثلثة الشكل . والسطح الأمامي مقعر أما السطح الخلفي فأملس بيضاوي ومقسم إلى سطحين مقعرین للتمفصل . والقمة تشير إلى الأسفل ، والحد العلوي سميك ومدور .

القصبة The Tibia

وهي أكبر عظم في الساق . والنهاية العليا السميكة فيها تسند السطوح المتمفصلة الداخلية والخارجية للقمات عظم الفخذ وبين هذين السطحين يوجد بروز . كذلك توجد درنة القصبة تحت النهاية السفلية (شكل ١٦) .




Figure 9a.


(شكل ١٦)
ظام القصبة والشظية
اليمين - الواجهة الخلفية
اليسار - الواجهة الأمامية

الشظية The Fibula

وهي عظم دقيق ورفيع على الجهة الوحشية (الخارجية للساق) . تتمفصل الرأس مع القمة الجانبية للقصبة في الأعلى والأسفل (شكل ١٦) .

القدم The Foot

هناك ٢٦ عظماً في القدم مقسمة إلى ثلاث مجاميع ، رسفية ، مشطية وسلامية . السلاميات متشابهة في الترتيب لما وصف في الكف وهناك سلاميتان في أصبع القدم الكبير وللآخرين ثلاثة لكل أصبع آخر (شكل ١٧) .



(شكل ١٧)

منظر علوي وسفلي لعظام القدم

الفصل الثالث

الأسنان

Dentition

إن أهمية دراسة علم الشكل الخارجي للأسنان في الدراسات الأنثروبولوجية أو دراسات علم الأجناس قد اتضحت منذ سنوات عديدة . وعملية التنسين مفيدة كمؤشر على السلوك وال العلاقات البيولوجية أو قابلية التأقلم للمجتمعات الإنسانية . والأسنان من أصلب المواد في طبيعتها وتعمر طويلاً ، ولهذا فإنها كثيراً ما تستخدم في دراسة التغيرات البيولوجية على المدى الطويل . ووظيفة الأسنان معروفة ، ويمكن تحديدها ، كما أن لها خواص ذات دلالة قوية في مركب الوراثة وقلة التأثر بالعوامل البيئية المحيطة ، لذا ثبتت فائدتها في دراسة علم الوراثة وإيضاح العلاقة البيولوجية بين مختلف المجموعات البشرية وغير البشرية . وتوضح الأسنان وعملية التنسين النظم السلوكية والتدخلات الحيوية البيئية ، وكمثال على ذلك فإن نسبة تسوس الأسنان في الجماعات الإنسانية المختلفة توضح الاختلافات في الغذية ، ووجود التشوهات في تكوين طبقة المينا لها علاقة بفترات سوء التغذية وأمراض الطفولة . كما أن الأسنان هي الجزء الصلب الوحيد الذي يظهر مباشرة في الأحياء دون اللجوء للفحص بالأشعة ولهذا فإن للإنسان قيمة كبيرة في دراسة التغيرات الميكروبيولوجية على المدى الطويل والقصير .

ومع ذلك فإن الأسنان في الدراسات المختلفة لها بعض العيوب ؛ ذلك لأنها قابلة للتغير وذلك بالتآكل الذي يخفي ويضيع الشكل العام للأسطح والنتوءات ونظام الأخداد في سطح السن مما يجعل الملاحظات صعبة وأحياناً

غير ممكنة أو مستحيلة ولا يُعرف سوى القليل عن أهمية التغيرات المورفولوجية من حيث وظيفتها، كما أن صفاتها الوراثية المعقدة تجعل من الصعب التأكد من كيفية وراثة بعض صفاتها المميزة مثل نتوء كارابيللي والثبور والخطوط في الأسنان التي تراوح دائمًا ما بين أن تكون نامية بشكل جيد أو تكون على هيئة خطوط بسيطة وغير نامية؛ ولذلك يصعب فيها التصنيف والمقارنة حيث إننا في بعض الأحيان نجد صفة معينة لكنها لا تكون واضحة ومن الممكن أن تؤخذ على أنها شيء آخر. كما أن التغيرات التي تحدث نتيجة الوسط أو البيئة المحيطة والتي تظهر في شكل الأسنان مثل التسوس، وتكون حلقات من الكلس، والخلع أو الإزالة تقلل أيضًا من فائدتها في الدراسات الأنثروبولوجية.

الوصف التشريحي للأسنان الدائمة **Anatomy of the Permanent Teeth**

يتكون السن من ٤ أنواع مختلفة من الأنسجة وهي :

- ١ - طبقة المينا Enamel وهي الطبقة الخارجية التي تغطي تاج السن وهي مادة صلبة جداً .
 - ٢ - طبقة العاج Dentin وهي تشبه العظم في التكوين وتكون جسم السن .
 - ٣ - طبقة السمنت Cementum وهي الطبقة التي تغطي جذر السن وتشبه العظم .
 - ٤ - اللب Pulp ويحتل التجويف بمركز السن (Morrey and Nelson, 1970). وتعتبر طبقات المينا والعاج والسمنت المادة الصلبة في السن . ويمثل اللب المادة الرخوة ويمد السن بالدم والأنسجة العصبية . والسن مثبت في مكانه بزائدة عظمية من عظام الفك تحيط بالسن . The Alveolar Process .
- والتابع Crown في الأسنان إما أن يكون له حواف قاطعة مثل الأسنان

الأمامية (السن المركزي الأول والثالي له) أو أن يكون له نتوء واحد مثل تاج الناب ، أو يكون له اثنين أو أكثر من الت nomineات مثل الطواحين والأضراس . أما الجذر في الأسنان ، فإما أن يكون أحادي كما هو الحال في القواطع والأنياب أو ثانوي الفرع مثل ما يكون في الطواحين أو ثلاثي التصدع مثل ما يكون في الأضراس العليا وأحياناً تكون الأضراس العليا ذات أربعة جذور .

وتسمى الأسطح المواجهة للشفة في القواطع والأنياب بالأسطح الشفية . أما في الطواحين فهذا السطح يسمى بالسطح الشدقي لأنه يواجه الشدق ، ويسمى الاثنان الشفي والشدقي معاً بالأسطح الوجهية . أما الأسطح الملامسة ما بين الأسنان فتسمى بالأسطح الأقربية وهي المواجهة لخط المنتصف والأسطح الأبعدية وهي التي تبتعد عن خط المنتصف .

القواطع الأمامية العليا Upper (Maxillary) Incisors

القاطع الأول أو المركزي هو أعرض الأسنان الأمامية وسطحه المواجه للسان غير منتظم وأقل تحدباً من السن الثالي له . أما السن الثالي فهو أصغر في كل مقاييسه عدا الجذور التي تختلف في الشكل عن باقي الأسنان عدا السن الثالث أو ما يسمى بضرس العقل ، وفي بعض الأحيان يظهر التاج في القاطع الثاني بشكل مدبب . كما تتميز الأسنان الأمامية في بعض الأحيان بوجود بروز كبير في السطح اللساني أو المواجه للشفاء وبوجود الأخداد التكونية والجذور والتيجان المشوهة . كما يتميز سطح السن القاطع الثاني بأن انحناء السطح فيه أكبر منه في القاطع الأول .

الدواجن الأمامية السفلية Lower (Mandibular) Incisors

وهي غالباً ما تكون أصغر الأسنان في الفك ، والقاطع الأول أو المركزي أصغر من القاطع الثاني وله شكل ثابت وقليلًا ما يحدث اختلاف في الشكل . وخلافاً للدواجن العليا فإن الأسطح اللسانية للدواجن السفلية ناعمة جداً والقاطع الأول والثاني غالباً ما يكونا متشابهين مما يجعل التفريق بينهما صعباً وخاصة في العينات الدراسية بعد أن يفصلان عن عظام الفك .

الأنياب Canines

وهي أطول الأسنان في الفك وتشابه الأناب العليا والسفلى في الشكل والوظيفة وتتميز بطول التيجان والجذور كما تتميز أيضاً بوجود نتوء واحد في التاج وتحدب التاج والجذر. ويعتبر الناب السن الأكثر ثباتاً وذلك لأنه سميك قياساً من السطح الشفي للسطح اللساني في كل من التاج والجذر وطول الجذر مما يزيد دعامتة في عظام الفك. والسطح اللساني في الناب غالباً ما يكون ناعماً وبه بروز غير كامل النمو وذا حجم أقل منه في القواطع.

الطواحين العلوية The Maxillary Premolars

تختلف هذه الأسنان عن القواطع والأنياب بوجود نتوء واضح في السطح اللساني ينمو من الفص اللساني للسن. والنتوء الشفي أو الشدقي طويل وحاد في الطاحن الأول، كما أن التاج والجذر في الطواحين العلوية أقصر منها في الأناب العلوية. والجذر إما أن يكون آحادياً كما هو في الناجذ السفلية في الغالب أو ثنائياً كما هو في العلوية، وفي هذه الحالة يوجد جذر شدقي وجذر لساني.

الطواحين السفلية The Mandibular Premolars

الطاحن الأول له نتوء شدقي نام جيداً، والنتوء اللساني غير وظيفي، غالباً ما يكون الطاحن الأول أصغر والعكس صحيح في الطواحين العليا في معظم الأوقات. أما الناجذ الثاني فغالباً ما يكون مستديراً وله جذر واحد في الغالب والنتوء الشدقي ليس طويلاً وحاداً كما هو الحال في الطاحن الأول. وتسمية السن الطاحن بثنائي النتوء ليس بالصحيحة دائمًا في بعض الأحيان كما هو الحال في الطواحين السفلية يكون النتوء اللساني غير وظيفي. والطواحين السفلية تختلف في شكل أسطحها الطاحنة أكثر منه في الطواحين العلوية. والجذر نادراً ما يكون ثنائياً وهو في الطاحن الثاني أطول وأكبر، كما أن النتوء اللساني من الطاحن الثاني غالباً ما تكون له وظيفة مكملة أو مساعدة للضرس السفلي الأول.

الأضراس العلوية The Maxillary Molars

الضرس العلوي الأول:

في الغالب يكون تاج الضرس العلوي الأول أوسع في القياس من السطح الشدقي اللساني منه في القياس من السطح الأقربى للسطح الأبعدى . وهو أكبر سن في الفك العلوي وله أربعة نتوءات كبيرة وهي - الأقربى الشدقي والأبعدى الشدقي ، والأقربى اللسانى والأبعدى اللسانى . وهناك نتوء خامس يسمى بنتوء (كربيلى) Carabellies Cusp وغالباً ما يوجد ويظهر على شكل نقطة غائرة أو يكون كامل النمو وينشأ في اتجاه اللسان على الت noe الأقربى اللسانى الذي يكون أكبر النتوءات . ولهذا الضرس ثلاثة جذور متفصلة ونامية جيداً وهي الجذر الأقربى الشدقي ، والأبعدى الشدقي ، والجذر اللسانى وهو أطولها وأكبرها . أما الأقربى الشدقي فهو ليس طويلاً ولكنه عريضاً ، أما الجذر الأبعدى الشدقي فهو الأصغر بينها .

الضرس العلوي الثاني:

يكمل الضرس العلوي الثاني الضرس العلوي الأول في الوظيفة وفي الشكل أيضاً ، وهو إما أن يماثل الضرس الأول أو الثالث أو الاثنين معاً . والنتوء الأبعدى اللسانى ضعيف النمو مما يجعل السطح الطاحن له على شكل القلب كما في الضرس الثالث أما احتمال وجود نتوء (كربيلى) فهو أقل في هذا الضرس ويماثل الضرس العلوي الثاني الضرس الأول في الشكل والعدد .

الضرس العلوي الثالث

في هذا الضرس اختلاف كبير في الشكل والحجم والموضع . وهو في تركيبه العام يشبه الضرس العلوي الثاني لكن الناج أصغر وله شكل القلب في ذلك لعدم النمو الجيد للنتوء الأبعدى اللسانى . وفي بعض الأحيان يختلف تماماً في كل شيء حيث يظهر بشكل مشوه ولا يشابه أي من الضرس العلوي الأول أو الثاني .

الأضراس السفلية The Mandibular Molars

هناك لجميع الأضراس السفلية جدران أحدهما يسمى بالجذر الأقرب والأخر يسمى بالأبعدى . كما تتميز بوجود تيجان مربعة الشكل وقياسها يكون أكبر في الاتجاه الأقربى للأبعدى عنه في الاتجاه الشدفى اللسانى .

الضرس السفلي الأول :

وهو الأكبر في الأضراس وله خمسة نتوءات نامية بشكل جيد ، منها اثنان شدقيان واثنان لسانيان واحد في الاتجاه الأبعدى . والجذور متعددة لأسفل أو متباudee والجذر الأقربى عريض ومنحني في الاتجاه الأبعدى ، أما الجذر الأبعدى فهو مستدير وعربيض في الجزء السفلي منه ومدبب في الاتجاه الأبعدى أيضاً .

الضرس السفلي الثاني :

بالرغم من تشابهه مع الضرس الأول في الوظيفة إلا أنه يختلف في خواصه التشريحية حيث إن له في التاج أربعة نتوءات نامية : اثنان شدقيان وأخران لسانيان . ولا يوجد نتوء خامس والجذور عريضة ، ولكن ليس كما في الضرس السفلي الأول ، وهي في العادة غير متباudee .

الضرس السفلي الثالث :

يختلف الضرس السفلي الثالث كثيراً في الشكل والموضع ونادراً ما يكون كامل النمو . والتاج غير منتظم في الشكل ، والجذور إما أن تكون ملتحمة مع بعضها أو غير منتظمة . وهو يقارب في شكله وتكوينه الضرس السفلي الثاني أكثر من الضرس السفلي الأول . وأحياناً يحتوى هذا الضرس على أربعة أو خمسة نتوءات ونتيجة لعدم وجود مسافة كافية لنمو هذا الضرس فهو غالباً ما يكون مدفوناً كلياً أو جزئياً في عظام الفك .

مصطلحات

Terminology

يتوجب على الطالب أن يكون ملماً ببعض المصطلحات العلمية نذكر منها :

١ - التتوء أو زائدة السنخية : Alveolar Process

وهي زائدة عظمية تحيط بجذور الأسنان وتمسك بالأسنان في الفك.

٢ - التجويف العظمي : Alveolus

وهو التجويف الموجود في العظم وفيه تأخذ جذور الأسنان دعمتها.

٣ - الزاوية : Angle

وهي منطقة أو نقطة التقاء حافتين متقطعتين.

٤ - القمة أو الذروة : Apex

وهي نهاية الجذر أو الجزء المدبب من الجذر.

الفتحة الجذرية : Apical Foramen

هي فتحة في نهاية الجذر تدخل من خلالها الأوعية الدموية والأعصاب.

٦ - ثنائي التتوء : Bicusped

وهو سن له تتوءان كما هو الحال في الطواحين.

٧- السطح الشدقي : Buccal Surface

وهو سطح السن المقابل أو القريب من لحم الشدق.

٨- الشدقي اللساني : Buccolingual

وهو الجزء من السن الذي يبدأ من الشدق في اتجاه اللسان.

٩- ملاط الأسنان : Cementum

هي مادة شبه عظمية تشكل طبقة تكسو جذر الفرس وعنه وأحياناً أجزاء من تاجه.

١٠- البروز أو الطوق اللساني : Cingulum

هو فص من السن من الناحية اللسانية في الأسنان الأمامية ، ويظهر فوق خط العنق في الأسنان.

١١- التاج : Crown

وهو الجزء البارز من السن مغطى بطبقة المينا.

١٢- أحادي النتوء : Cuspid

اصطلاح يطلق على السن أحادي النتوء مثل الأناب.

١٣- الحافة القاطعة : Cutting Edge

هي حافة تكون من التقاء السطح الشفي بالسطح اللساني في الأسنان الأمامية أو القواطع.

١٤- العاج : Dentin

هو نسيج يكون الجزء الأعظم من جسم السن ويحيط بتجويف اللب ويمتد تحت المينا وملاط الأسنان.

(*) لمزيد من المعلومات انظر: Wheler: 1968.

١٥ - الأبعدي : Distal

هو أي سطح أو شيء يبتعد عن الخط لمنتصف الفك.

١٦ - المينا : Enamel

هو نسيج صلب يغطي التاج.

١٧ - الأخدود : Fissure

هو عيب غائر في السن نتيجة عدم التحام كامل للفصوص المكونة للسن.

١٨ - الحفرة أو النقرة : Fossa

منخفض مستدير على سطح الفرسوس والسطح اللساني للأسنان القاطعة.

١٩ - اللثة : Gingiva

هي جزء من اللحم يغطي أعناق الأسنان ويلتصق بها.

٢٠ - الأخدود الرئيسي : Groove

هو ما يفصل بين الأجزاء الرئيسية للأسطح الطاحنة.

٢١ - القاطع : Incisor

هو سن له حافة قاطعة واحدة.

٢٢ - الشفي : Labial

هو كل شيء له علاقة باتجاه الشفة.

٢٣ - السطح الشفي : Labial Surface

هو سطح السن المواجه للشفة.

٢٤ - شفي لساني : Labiolingual

هو الشيء الذي يبدأ من الشفة في اتجاه اللسان.

٢٥ - لسانی Lingual :

هو طرف يواجه أو له علاقة باللسان.

٢٦ - ماميلون Mammelons :

هي بروزات دائيرية تظهر على الحافة القاطعة للقواطع عند بزوغها.

٢٧ - خط المنتصف Median Line :

هو خط وهمي يقطع الجسم من الأمام للخلف وعمودياً.

٢٨ - أقربی Mesial :

هو سطح السن باتجاه خط المنتصف.

٢٩ - الزاوية الأقربیة Mesial Angle :

هو التقاء الحافة الأقربیة مع الخط القاطع في الأسنان أو التقاء الحافة الأقربیة والشدقیة والطاھنة كما في الأضراس.

٣٠ - العنق Neck :

هو جزء من السن يلتقي فيه الناج مع الجذور.

٢١ - السطح الطاھن Occlusal Surface :

هو سطح السن من الطواھين أو الأضراس الذي يتقابل بين الفکین المعاكسین.

٣٢ - النقط الغائرة Pits :

هي أماكن صغیرة غائرة مثل رأس الدبوس في طبقة المينا.

٣٣ - اللب Pulp :

هو نسيج رخو يملأ التجويف العصبي داخل قنوات الجذور ويحتوي على الأوعية الدمویة والأعصاب في السن.

الوصف المورفولوجي للناتج في السن

Dental Crown Morphology

١ - القواطع المقعرة Shovel - Shaped Incisors

كلمة مقعر Shovel ذكرها مهليريتر Muhlreiter سنة ١٨٧٠ وتدل على حالة تنتاب من ارتفاع في الحواف الجانبية لكل من القواطع العليا والسفلى (شكل ١٨). وكان هردىشكا(١٩١١) أول من لاحظ هذا التغير في قواطع الهندود



(شكل ١٨)
الأسنان القاطعة العلوية المقعرة

الحمر الأمريكيان. وفي سنة ١٩٢٠ و ١٩٢١ كتب هردىشكا عن وجود نسبة كبيرة من

هذا النوع من الأسنان في السلالة المغولية مثل: الصينيين واليابانيين والأسكبي والهنود الحمر الأميركيين، ولكنها توجد بنسبة قليلة جداً في الزنوج والقوقيزين وقدم كل من نلسون (Nelson 1938)، وجولدشتين Goldstein (1948) وبدرسون (Perderson 1949) ودالبرج (Dahlberg 1949) أبحاثاً أيدت ما جاء في أبحاث هردلشكا من أن هذه الصفة تميز السلالة المغولية عن غيرها من السلالات البشرية.

وقد قسم هردلشكا سنة ١٩٢٠ هذه الخاصة بين الأسنان إلى أربع أنواع :

- ١ - أسنان مقعرة بالكامل وفيها تظهر هذه الخاصية بشكل تام.
- ٢ - نصف مقعرة وهي أقل بعض الشيء من النوع الأول.



(شكل ١٨ ب)
الأسنان القاطعة السفلية المقعرة

- ٣ - يوجد ارتفاع في المينا لكن لا يمكن القول بوجود نصف مقرر.
- ٤ - السن ناعم ، ولا يوجد تقرؤ أو أي ارتفاع في المينا .


نتوء كربللي Carabelli's Cusp

وكان أول من وصف هذا هو فون كربللي في سنة ١٨٤٢ كنتوء في السطح اللساني للضرس العلوي الأول ، ويختلف هذا النتوء في وجوده أو عدم وجوده وفي حجمه وموضعه ومعدل حدوثه بالترتيب التناصفي في الأسنان كالتالي : الضرس اللبناني الأول ، الضرس الثاني ، الضرس الثالث . ويختلف من كونه كامل النمو وكامل التحديد كخط رفيع أو أخدود بسيط ، ويمكن أن يحدث هذا على الجانبين الأيمن والأيسر في الفك أو أن يكون أحدياً على جهة واحدة . وموضعه على الضرس اللبناني الثاني وعلى الضرس الدائم الأول غالباً يكون في النصف الأقربى من السطح اللساني (شكل ١٩) . وبظاهر هذا النتوء بمعدل أقل في السلالة المغولية والمجتمعات القريبة منها ، وبمعدل أكبر لدى القوقازيين والزنوج والأسكيمو في شرق جرين لاند . وقد لاحظ بدرسون (Pederson 1949) نسبة عالية (٪٢٩) من نتوء كربللي لدىهم ، كما لاحظ أن النسبة أقل في الأماكن المعزولة التي لا يوجد فيها اختلاط بين الأسكيمو والجماعات القوقازية . والوراثة في هذه الظاهرة ليست واضحة بالرغم من تأكيد بعض علماء الأجناس في أن هذه الظاهرة وراثية حيث بين كراوس (Kraus 1951) على أن هذه الظاهرة تورث بعامل سائد ولكن يبدو أن وراثة هذه الصفة من النوع الوراثي المركب وقد باعثت معظم المحاولات لتحديد كيفية وراثتها بالفشل .

٣ - أشكال الشقوق وعدد التنوءات في الضرس في الفك السفلي :


Groove Pattern and Cusp Number of the Mandibular Molars

في سنة ١٩١٦ اكتشف وليم . ك . جريجوري Gregory وجود تشابه أو تماثل في الشقوق وعدد التنوءات في الأضراس السفلية بين الإنسان والقردة العليا وأسلافها وتكون التنوءات الشكل المثالي



(شكل ١٩)
نحوه كربللي

للحرف "Y" الذي يتكون من الشقوق الرئيسية الشدقية اللسانية الثلاثة بين الخمس نتوءات الرئيسية ويمكن أن يكون واحد وأربعة بشكل متصل أو اثنين وثلاثة بشكل متصل (شكل ٢٠). ودرجة الشقوق وأشكالها الهندسية ليست متشابهة في كل المجموعات البشرية وأيضاً هي ليست متماثلة في كل الأضراس السفلي (Goldstein 1948). كما أوضح هذا الباحث أن الأضراس اللبانية الثانية تحفظ بالشكل "Y" بنسبة أكبر مما هي في الأضراس



(شكل ٢٠)
الشكل المثالي للحرف 'Y', 'X', 'و' +
في الأضراس السفلية

الدائمة لنفس الشخص وربما يتغير الشكل "Y" إلى الشكل "X" بوجود خمس نتوءات أو إلى الشكل + باختصار النتوءات من خمسة إلى أربعة . وفي الغالب فالضرس السفلي الأول هو الأكثر ثباتاً ولكن الثاني في الأكثر يتغير إلى X أو + والضرس الثالث يكون وسطاً في معدل التغير . ويقول هيلمان (Hellman, 1928) أن التعديل في كل من الشقوق في شكلها الهندسي وعدد النتوءات يحدث لدى القوقيازيين بشكل أكثر منه في الزنج المغوليين .

٤ - عدد النتوءات في الأضراس العليا :

Number of Cusps in the Maxillary Molars:

يختلف عدد النتوءات في الأضراس العليا من ثلاثة إلى أربعة . والضرس الدائم الأول هو الأكثر ثباتاً وله غالباً أربعة نتوءات ، لكن عدد النتوءات يكون أكثر اختلافاً في الضرس الثالث عنه في الضرسين الأول والثاني . وقد لوحظ أن شكل السن عن سكان جزر الأليوشن وهند تكساس والأسكيمو في شرق جرينلاند هو الشكل الرباعي للنحوئات في الضرس الثاني بنسبة ٦٠ - ٧٠٪ لكن لدى الأستراليين القدماء تكون هذه النسبة ١٠٠٪ (Morrees 1957) . ويجب على الباحث أن يكون حذراً في استخدام مختلف التقسيمات بواسطة مختلف المؤلفين أو الكتاب وغالباً ما تكون المقارنة في أضيق الحدود .

٥ - الأسنان الزائدة أو المفقودة طبيعياً :

Supernumerary and Missing Teeth

إن «هايبرودونشيا» Hyperodontia الكلمة معناها زيادة في عدد الأسنان عن العدد الطبيعي وتوجد أساساً في منطقة القواطع الأمامية ، لكن من الممكن أن يظهر سن زائد في أي مكان من الفكين العلوي أو السفلي . ومعدل حدوثها يختلف بين المجموعات الإنسانية المختلفة وتصل نسبة حدوثها إلى حوالي ما بين ٣ - ٢٧٪ طبقاً لأبحاث بدرسون (Pederson 1949) . وقد لاحظ بدرسون هذا أن هناك نسبة عالية لفقد الضرس الثالث في الفك العلوي والسفلي عند الأسكيمو ومن المهم التفريق بين فقدان الطبيعي من

الولادة للضرس الثالث وبين هؤلاء الذين يفقدونه بعد الولادة أو بعد ظهوره، وذلك بملاحظة تأكل عظام الفك المدمعة للسن. وهذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى خطأ في جميع المعلومات أو البيانات.

٦ - التتوء الزائد **Supernumerary Cuspus**

لقد وصف بولك Bolk في سنة ١٩١٦ التتوء الزائد الذي يظهر في السطح الشدقي للضرس الثاني والثالث وسماه بالتوء جار الأضراس وقد اقترح أن هذا ينبع من وجود سن زائد التهم خلال عملية التكوين والنمو للأسنان الدائمة. كما أوضح بولك أيضاً أن هذه التتوءات هي بقايا الأسنان الخلفية اللبنية ولذلك فهي لا توجد في السن الدائم الأول. وفي عام ١٩٤٥ كتب دالبرج عن وجود تتوء جار الأضراس في السن الدائم الأول، وبهذا صحت نظرية بولك. وفي عام ١٩٥٠ استخدم دالبرج اسم التتوء جار الأضراس ليدل على كل التشوهات الزائدة في السطح الشدقي لكل من الأضراس والطواحين العليا والسفلى، وكما قال: توجد مجموعات وتفرعات للمجموعات التي يكون فيها التتوء الزائد محدد في الجزء الأقرب للسطح الشدقي للأضراس السفلية.

أمراض الأسنان **Dental Pathology**

تسوس الأسنان **Dental Caries**

يعتبر تسوس الأسنان أكثر أمراض الأسنان شيوعاً في العالم. والتسوس حالة مرضية يحدث فيها إزالة الكالسيوم من المينا والعااج ويتبقى الجزء العضوي والذي بدوره يتحطم ويتحلل (Fisher, Kuhm and Adami, 1931). والتسوس يحدث في مكان أو أكثر في السن، في السطح الطاحن للأكل وعند التقاء المينا والعااج في الأسنان الأمامية. وهو يحدث بنسبة أكبر في السطح الشفي غالباً.

والاختلاف في أماكن تواجد التسوس في مختلف مجموعات الأسنان

يكون مرتبطةً بالاختلاف التثريحي وطبقاً لما يقول موريس (Moorrees, 1957) فإن هناك تاج كبير للأضراس في إبعاده عن أي سن آخر، وله مساحة سطح أكبر وهي الطاحنة، ولها جيوب وجفونات تجمع وتمسك بالطعام داخلها وأيضاً لها مسافات أكبر بين الأسنان تساعد على تجميع وترانك فضلات الطعام. والكربوهيدرات تعتبر أكثر المواد المساعدة على بدأ عملية التسوس حيث إنها توفر المواد التي تخمر وتؤدي مع نمو البакتيريا إلى تكون أحماض على سطح الأسنان والتي بدورها تعمل على إزالة الكالسيوم من المينا.

ومن التفسيرات المرضية أو المقبولة في شرح سبب تسوس الأسنان تفسير ميلر (Miller, 1883 a, b) وهو أن الأحماض تكون بفعل البكتيريا حيث إن تخمر بقايا الطعام (الكربوهيدرات) هو المسؤول الأكبر عن تكسير الأنسجة المكونة للنتائج. وقد اكتشف سوجنيس (Sognnaes 1948 a, b) أن التسوس يظهر بسرعة أكبر في حيوانات التجارب عندما يعطى العامل المسبب للتسوس للألم خلال عملية الحمل والتكون والنمو في الأسنان ، كما بين أيضاً أن معدل التسوس في الأسنان قل خلال الحرب العالمية الثانية بسبب قلة أو نقص الكربوهيدرات.

أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان **Periodontal Diseases**

وهي تعني إصابة العظم الداعم للأسنان في الفك والأنسجة الرخوة التي تحيط بها وهي ثلاثة . وهذه الأمراض تسبب انكماس وانحسار العظم الذي يؤدي إلى تخلخل الأسنان وفقدانها بعد ذلك . والسبب الحقيقي والأكيد لم يعرف بعد وربما كان للنقص الغذائي والترسبات الكلسية وقلة العناية بصحة الفم والتأكل دوراً أساسياً في حدوث مثل هذه الأمراض .

خراب أو تقيع الأسنان **Dental Abscess**

والخراب هو تجمع الصديد في منطقة محاطة بعظام شبه صلبة (Brothwell, 1972) . وفي العادة يوجد الخراب على هيئة تجويف في العظام

الفكية قرب قمة الجذر، ويمكن أن يحدث الخراج مصاحباً لإصابة الأنسجة الدعامية أو تأكل الأسنان أو التسوس. وبمعدل حدوث الخراج يشبه المعدل في التسوس وأمراض اللثة وهو يختلف من شخص لآخر، ومن مجموعات بشريّة لأخرى. وقد وجد لي (Leigh, 1925) أن نسبة تقيع الأسنان بين بعض القبائل الهندية التي يتكون غذاؤها الرئيسي من البروتينات أقل منها (١٦٪) عند القبائل التي تتناول الكثير من الكربوهيدرات (٥٢٪). وفي دراسة مماثلة في عام ١٩٧٤ حصل المترجم على معلومات جديدة تؤكّد ما قاله لي في عام ١٩٢٥ (EL - Najjar, 1974).

نقص تكون طبقة المينا في الأسنان **Dental Enamel Hypoplasia**

وهو عيب خلقي «أو تكولوجي» في المينا، ويحدث في الأسنان اللبنية وال دائمية، ويعود إلى تغيير في التركيب يظهر على هيئة خطوط أو بثرات غائرة وشققات على سطح المينا. ويترافق هذا العيب ما بين أن يكون بسيطاً وموضعياً أو متعددًا يشمل الكثير من الأسنان، وأحياناً يكون كل سطح المينا متأثراً. وأكثر أنواع هذا العيب هو الذي يحدث في عدد من الأسنان التي يحدث فيها تكون المادة العضوية المكونة للأسنان في نفس الوقت، والعامل المسبب يؤثر على منطقة إنتاج المينا في نفس الوقت. وبغض النظر عن السبب فإن هذا المرض أو العيب يمكن أن يحدث فقط إذا حدث الخلل في نفس الوقت الذي تكون فيه عملية تكون المادة العضوية في الأسنان نشطة. وقد وجد روбинسون (Robinson, 1952) أن هذا المرض يحدث في حوالي ٢٨٪ من أسنان الإنسان الإفريقي الذي عاش قبل ما يقرب من ٧٠ ألف سنة. كما لاحظ سوجنيس (Sognnaes 1956) وجود هذا العيب في إنسان جبل الكرمل بفلسطين والذي عاش قبل حوالي ٤٠,٠٠٠ سنة. ويقول هذا الباحث أن خللاً قد حدث خلال الفترة التكورية لطبقة المينا وربما حدث أيضاً نتيجة نوع آخر من الأمراض التي تعيق نمو طبقة المينا. وأسباب هذا الخلل التكولوجي غير معروفة وقد أرجعه البعض إلى نقص في فيتامين د، (Gottleib, 1920) ونقص في فيتامين أ (Boyle, 1933) أو عوامل وراثية (Butting, 1920).

أو الزهري الخلقي (Braur and Blackstone, 1924) ، وبالإضافة للعوامل المذكورة هناك عوامل أخرى مثل زيادة نشاط الغدة الجندرية (Van Arsdale, 1955) والأنيميا الناتجة عن تكسير الدم (Watson, 1964) والولادة المبكرة (Grahnen, Sjolin and Stenstrom, 1964) ونقص الكالسيوم (Levine, 1974) الذي قد يؤثر على الشخص قبل وبعد الولادة.

فقد الأسنان قبل الوفاة Antemortem Tooth Loss Attrition

إن أكثر الأسباب شيوعاً لذلك هي أمراض الأنسجة الدعامية، والتسوس ، ونقص التغذية . وقد أوضح شاو (Shaw, 1962) إن النقص الحاد في البروتين في فرمان الألبينو يتسبب في تكسير الأنسجة الصامدة في اللثة والأغشية المدعمة للأسنان وضغط العظام الهشة المحيطة بالسن وتأخير تشكيل السنن . وطبقاً لأبحاث كير (Ker, 1962) فإن نقص فيتامين ج يزيد من تزيف اللثة ومن قابلية الأوعية الدموية لمرور السوائل ، كما أن النقص في هذا الفيتامين يمنع التأم وشفاء أمراض اللثة ويؤدي إلى أمراض مزمنة تعمل على تأكل الأنسجة الدعامية . ولذلك فإن المرض يمكن أن يتقدم أكثر وبسرعة في الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ج .

التآكل Attrition

وهو فقد تدريجي للمادة الصلبة للأسنان نتيجة الاحتكاك في حالة مضيغ الطعام وبخاصة عندما يحتوي الطعام على مواد رملية أو تتغفل هذه المواد عليه من الخارج خلال إعداده درجة التآكل في الأسطح الطاحنة تكون أكثر . وقد قسم فيشر ومساعده (Fisher et al 1931) هذا التآكل إلى خمسة أنواع هي :-

- ١ - التوءات متآكلة لدرجة اختفاء التجويف بينها .
- ٢ - المينا متآكلة ويظهر تحتها العاج .

- ٣ - اللب منكشف أو حدث له تعرية .
- ٤ - استمرار التآكل حتى ينتهي الناج ويظهر سطح الجذور .
- ٥ - التنوءات متآكلة ولكن بدون تعرية أو كشف العاج من تحتها .

الفصل الرابع

تقدير الأعمار

Age Estimation

لقد صمم هذا الفصل ليوفر للطالب خطوطاً إيضاحية لبناء ما يمكن توفيره من معلومات بالنسبة للهيكل العظمي للمتوفى متضمنة العمر والسلالة الجنس والطول . وهذا بلا شك ليس كل ما يمكن الحصول عليه من معلومات من الهيكل العظمي ولكن هو ما يمكن تعلمه . وإضافة إلى هذه المعلومات فالخيال يتوقف على الفضول والخبرة لدى الباحث وحالة وتكامل الهيكل العظمي المتعامل معه . ويفترض بعض التكينيكيين وجود هيكلًا عظمي متكاملاً للطريقة المستخدمة أو على الأقل أن تكون معظم أجزاء الهيكل العظمي في حالة جيدة . ولما كانت حالة الهياكل العظمية التي يعثر عليها لا يمكن دائمًا أن توفر المعلومات المطلوبة لذا يجوز استخدام وسائل بديلة وبذلك يمكن الحصول على التقييم المطلوب .

أولويات التقييم كالتالي : العمر والسلالة والجنس والطول . ويجب اتباع هذا الترتيب حيث إن كل موضوع يتأثر بالموضع السابق له . فالهيكل العظمي لمخلوق معين يمكن أن يتغير بفعل بعض المؤثرات بحيث يشبه مخلوقاً من سلالة و الجنس آخر والقامة تقصر كلما تقدم بالإنسان العمر . والعمر والسلالة يمكن أن يؤثرا في تعبير الجنس . فالموضوعات الثلاثة الأولى يجب أن تعرف بالترتيب لكي توفر الجداول الصحيحة لتقدير الطول ومعرفة الحكم الصحيح بالنسبة للسن . وباستخدام الوسائل المنشورة هنا يمكن للباحث أن يقيم السن والجنس والطول في أي هيكل عظمي بدرجة كاملة ولا يوجد بديل بالنسبة للخبرة . فهذا ليس بكتاب للطبع للاستعمال بدون أي مجال للإبداع ،

فمعظم هذه الوسائل تحتاج إلى التعديل في بعض الأحيان والكثير منها يرتفع إلى فن يمكن أن يتحقق بفحص الكثير من الهياكل العظمية.

في معظم الحالات ، يكون تقدير العمر من الهيكل العظمي للإنسان تقريرًا بنفس درجة صعوبة تقدير العمر من الملامح الخارجية للإنسان الحي وتناقض الدقة والتأكد كلما تقدم عمر الشخص سواء أكان حيًا أو ميتًا . وكما هو الحال مع الجسم الحي ، فإن مختلف أجزاء الهيكل العظمي توفر معلومات متميزة في الأعمار المختلفة من حياة المتوفى . ولتعزيز حيرة عالم الإنسانيات فإنه من الضروري أن يقدر أولًا العمر التقريري للشخص وقت الوفاة لكي يتم استخدام أنساب جزء من الهيكل العظمي في التقدير التفصيلي للعمر . ولحسن الحظ ، فإن هذا ليس صعباً كما يبدو في الظاهر نظراً لأن المعاير التي تشكل المعالم الرئيسية لمختلف فئات العمر تكون في العادة واضحة تماماً للملاحظ الذي اعتاد على الطرق المستخدمة في تقدير العمر . وسيكون التصنيف التالي والذي يقوم على أساس الأساليب المتوفرة لتقدير العمر في مختلف فئاته شديد الفائدة لعالم البشريات الطبيعية الذي يتعامل مع العظام البشرية .

حديث الولادة Neonate

إن فترة ما قبل ظهور الأسنان اللبنية تترافق مع تواجد عظام صغيرة جداً ونقص اندماج كثیر من أجزاء الهيكل العظمي مثل الأقواس العصبية للقفرات وأجزاء من الحوض ونصف العظمة الجبهية وأطراف العظام الطويلة . . . إلخ وتكون تجاويف الأسنان التي لم ت تكون بعد ظاهرة في الفكين . ومن الصعب جداً تقدير العمر بدقة كبيرة في مثل هذا الهيكل العظمي لحديث السن . ولكن يمكن استخدام طول القامة التي نحصل عليها بطريقة أولفري وبنوي (Oliver and Pineau, 1957) والتي سنقدمها في القسم الخاص بالقامة وذلك لتقدير عمر الطفل حديث الولادة وفقاً للجدول رقم (١) . ونظراً

لاختلاف الحجم في أي جنس معين عن النماذج القياسية المعروفة ، فإن هذا الجدول بناءً على ما ذكره أوليفر وبنوي يحتمل الخطأ بمعدل أربعة إلى خمسة أسابيع قرب البداية إلى حوالي عشرة أسابيع قرب النهاية .

الطفولة/ مرحلة الصبا المبكر

Infancy/ Early Childhood

تستمر معظم معايير عدم نضج الهيكل العظمي المذكورة أعلاه خلال الجزء الأكبر من هذه الفترة ، إلا أن نصف العظمة الجبهية يندمجان عادة في هذه الفترة لتكوين عظمة واحدة إضافة إلى حدوث تغيرات أخرى . ومن العلامات الواضحة لهذه المجموعة من العمر ظهور الأسنان التي تعتبر دليلاً موثوقاً به في تقدير العمر . وفي القسم الخاص بفترة الصبا المتأخر ، أوردنا موجزاً بشأن تتابع ظهور الأسنان حيث يساعد ظهور مراكز تكوين العظام في تقدير العمر في كل من مرحلتي الولادة الحديثة والصبا المبكر .

جدول رقم (١)

عمر الجنين بالنسبة إلى الطول الكلي لقامة الجنين

العمر مقدراً بالشهر القمري	قامة الجنين بالستمتر
٥	٢٣,٨٠
٦	٣٠,٦٩
٧	٣٦,٥٢
٨	٤١,٥٨
٩	٤٦,٧٣
١٠	٥٠,٠٢

جدول رقم (٢)

العمر بترتيب ظهور مراكز تكوين العظام بعد حوالي ٥ سنوات مقدراً
بالسنوات والشهور

المركز	الذكر الأبيض	الأثنى البيضاء
النتوء الوسطي لعظم الساعد	٥,٢	-
عظم الزند الطرفي	٥,٦	-
أطراف عظام كعب القدم (الحديبة)	٦,٢	-
أطراف أعلى عظام القدم	٨,-	٦,١٠
بكرة عظم الساعد	٨,٤	٧,٢
النؤ المرفقي	٨,٨	٦,٨
المدور الصغير لعظمة الفخذ	٩,٤	٧,٧
العظمة الحمصية	٩,١٠	٧,١
العظمة السمسامية (العضلة القابضة		
الصغرى في إبهام القدم)	١٠,٤	٨,٢
النؤ الجانبي لعظم الساعد	١٠,٥	٨,٣
حدبة عظم القصبة	١٠,١٠	٩,-
العظمة الخامسة لمشط القدم القريب	١١,-	٨,٧
العظمة السمسامية (العضلة القابضة		
الصغرى في إبهام اليد)	١١,٨	٩,٤
حدبة الصلع الأول	١٣,٣	١٠,-
الشوكة الأمامية العلوية لعظمة الحرقفة	١٣,٤	٩,٣
الفترة الأولى الصدرية النتوء		
المستعرض	١٣,٤	١١,٤
قمة الكشف	١٣,٥	١١,٤
الحافة الحرفية	١٣,٥	١٢,-

المركز	الذكر الأبيض	الأثني البيضاء
زاوية النتوء الغرابي	١٣,١٠	١١,٣
الحدبة الوركية	١٥,-	١٣,٢
عظم الترقة الوسطى	١٥,-	١٤,٦

Kroghnan, 1962: Table 26.

مرحلة الصبا المتأخر Late Childhood

في هذه الفترة يبدأ ظهور الأسنان الدائمة. ومثلاً ما حدث في فترة ظهور الأسنان اللبنية، فإن تقدير العمر في سنوات الصبا المتأخرة يعتمد على ظهور الأسنان الدائمة، ويحدث هذا في انتظام تام حيث يمكن تمييز بداية هذه الفترة بظهور أول سن دائم، رغم أن الأسنان ستكون خليطاً من الأسنان الدائمة واللبنية لبعض سنين قادمة. والمعايير التي يشيع استعمالها لتقدير عمر الأشخاص غير البالغين باستخدام تكوين الأسنان هي على الأرجح تلك المعايير التي وضعها شور وماسلر (Schour and Massler, 1940). ولا تعتبر هذه المعايير بلا عيوب من حيث إنه يوجد اختلاف في توقيت ظهور الأسنان ولكن التقديرات تكون في العادة قريبة جداً من الواقع بالنسبة لمعظم الأشخاص. ويمكن الحصول على رسم بياني لهذه المعايير من جمعية الأسنان الأمريكية في شيكاغو وهي مفيدة جداً. وفيما يلي تتابع ظهور الأسنان وفقاً للتفاصيل على هذه الخارطة.

الأسنان اللبنية : Deciduous Dentition

٦ شهور (± 2) بدء ظهور القواطع الوسطى في الفك العلوي وكل القواطع بالفك السفلي.

٩ شهور (± 3) ظهور القواطع الجانبية في الفك العلوي واستكمال مجموعة الأسنان (القواطع).

سنة (± 3 شهور) بدء ظهور الأضراس الأمامية بالفك السفلي.

١٨ شهراً (± 3 شهور) ظهور الأضراس الأولى في الفك العلوي، وبدء ظهور الأنابيب والأضراس.

ستنان (± 6 شهور) اكتمال ما ذكر أعلاه باستثناء الأضراس التي لا يكتمل ظهورها بصورة نهائية.

ثلاث سنوات (± 6 شهور) اكتمال الأسنان اللبنية.

الأسنان المختلطة Mixed Dentition

٦ شهور (+ ٩ شهور) بدء ظهور أول ضرس دائم وفي هذه السن يحتفظ بكل الأسنان اللبنية.

٧ سنوات (± 9 شهور) سقوط القواطع اللبنية الوسطى في الفك العلوي وكذلك كل القواطع في الفك السفلي. بدء ظهور القواطع الدائمة الوسطى في الفك العلوي وكل القواطع بالفك العلوي بحيث تكون الوسطى في مرحلة ظهور متقدمة على الجانبيين. استكمال ظهور أول ضرس دائم.

٨ سنوات (± 9 شهور) بدء ظهور القواطع الجانبية في الفك العلوي وسقوط القواطع اللبنية الجانبية في الفك العلوي.

٩ سنوات (± 9 شهور) اكتمال ظهور القواطع الدائمة وفي هذه السن، تكون الأسنان من مجموعة القواطع الدائمة والأضراس الدائمة الأولى بالإضافة إلى الأنابيب اللبنية والطواحين والأضراس.

١٠ سنوات (± 9 شهور) بدء ظهور الطواحين الأمامية الأولى في الفكين العلوي والسفلي وكذلك الأنابيب في الفك السفلي وسقوط الطواحين اللبنية والأنابيب في الفك السفلي.

١١ سنة (± 9 شهور) سقوط بقية الأسنان اللبنية ، بدء ظهور الأناب في الفكين العلوي والسفلي والطواحين الأمامية الثانية .

١٢ سنة (± 9 شهور) اكتمال ظهور الأسنان الدائمة من الضرس الأول إلى منتصف الفك وبدء ظهور الضرس الثاني .

١٥ سنة (± 6 شهور) اكتمال ظهور الأضراس الثانية .

٢١ سنة (متغيرة تماماً) ظهور الضرس الثالث وبذلك تستكمل مجموعة الأسنان الدائمة وفي بعض الأشخاص لا تظهر هذه الأسنان (ضرس العقل) أبداً .

ويشير ماكرن وستيوارت (1957) إلى أن فترة الظهور الرئيسية للضرس الثالث هي سن السابعة عشرة إلى الثانية والعشرين ، ولكنها يلاحظان أيضاً بعض حالات عدم ظهور الضرس الثالث حتى سن الخامسة والثلاثين .

وقد لاحظ كيرلي (Kerley, 1965, 1973) أنه يمكن تقدير العمر إلى أقرب ما يمكن عن طريق فحص بعض سمات الأسنان مجهرياً إلا أنه يحذر بأن أفضل من يفعل ذلك هو طبيب الأسنان الشرعي نظراً لما يتطلبه من أساليب خاصة .

فترة المراهقة Adolescence

وتتميز هذه الفترة بتوقف الزيادة في طول غالبية العظام الطولية لمدة من الزمن ، ويدل عليها اندماج القبة العظمية (الكردوس) للعظم مع العمود (ساق العظمة) ، وهذا الاندماج الذي يطلق عليه «الاتحاد الكردولي» يحدث بشكل منتظم بما يكفي لاستخدامه كمؤشر على العمر . ويلتحم كل كردوس مع ساق العظمة في عمر معين ، لكن العملية بكاملها ابتداءً من أول اتحاد كردوسي إلى آخر اتحاد تستغرق عدة سنوات تمتد من البلوغ إلى النضوج

النام للهيكل العظمي. وقد حدد ماكern وستيوارت (McKern and Stewart, 1957) خمس درجات للاتحاد الكردوسى : غير ملاحظ (صفر)، بداية (١)، نشط (٢)، حديث (٣)، التحام كامل (٤). وتستخدم الدرجات في صورة جداول مأخوذة في الكتاب الذى أصدره المذكوران (شكل ٢١).



(شكل ٢١)

عظمة القصبة تبين عدم التحام الكراديس في شاب دون العشرين

الشاب البالغ Young Adult

يبدأ تقدير العمر خلال هذه الفترة في التحول من تفاصيل النشأة والتكتوب إلى تفاصيل الانحلال والانتكاس . ففي السابق ، كان التحام الدروز في الجمجمة يستعمل كمعيار لتقدير عمر البالغين غير أن مشاهدات ماكيرن وستيوارت على المرضى من ضحايا الحرب الكورية أدت إلى نفي أي قيمة لهذه الطريقة . وقد ذكر هذان الباحثان بأن الشكل غير المنتظم لهذه الدروز لا يدل ولا يثبت أن هناك عمراً محدداً لقفل هذه الدروز في حدود الأعمار الممثلة (McKern and Stewart, 1957) . ويدل هذا على أن قفل الدروز في الجمجمة لا يمكن أن يعتمد عليه في معظم الحالات وحتى سن الخامسة والأربعين على الأقل . ويذكر ماكيرن وستيوارت أنه يستثنى من ذلك الدرز القاعدي والذي يربط العظم القذالي بالعظم الإسفيني والذي يُغلق تماماً في سن الحادية والعشرين . وقد عرف بأن هذا الدرز يُغلق بسرعة وبصورة تامة ، ولكن لا يوجد حتى الآن دليل بشأن توقيت محدد لذلك . وهكذا يمكن اعتبار هذا الأخير مؤثراً موثقاً به للبلوغ سن الحادية والعشرين على الأقل إذا كان الالتحام قد تم .

وبجانب توقيت ظهور الأسنان اللبنية والدائمة ، يعتبر ترتيب اندماج أو التحام أطراف العظام (الكرياديس) من أفضل الطرق لتقدير العمر (انظر الجدول رقم ٣) .

جدول رقم (٣)

ترتيب التحام أطراف العظام (الكرياديس) بالسنين

السنة الرابعة - في الإناث ، اندماج الحدية الكبرى مع رأس عظم العضد .

السنة الخامسة - في الذكور ، اندماج الحدية الكبرى مع رأس عظم العضد .

السنة السابعة - في الإناث ، اندماج فروع عظم الورك وعظم العانة .

- السنة التاسعة - في الذكور، اندماج فروع عظم الورك وعظم العانة .
- السنة الثالثة عشرة - في الإناث ، اندماج عظام الحرقفة والورك والعانة في التجويف الحقي .
- في الذكور، اندماج البكرة العضدية مع التنوء الجاني .
- السنة الرابعة عشرة - في الإناث ، اندماج التنوء المرفقي وعظم الكعبـة العلوي ، ورأس عظم الفخذ وعظم القصبة البعـيد وعظم الشـظـية البعـيد .
- السنة الخامسة عشرة - في الإناث ، اندماج التـنوـءـ الأـوـسـطـ وـعـظـمـ القـصـبـةـ القـرـيـبـ .
- في الذكور، اندماج الحرقـفةـ والـورـكـ وـالـعـانـةـ فيـ التجـوـيفـ الحـقـيـ .
- السنة السادسة عشرة - في الذكور، اندماج الكردوس المشترـكـ السـفـليـ لـعـظـمـ العـضـدـ ، أوـالـتـنـوـءـ الأـوـسـطـ ، وـالـتـنـوـءـ المـرـفـقـيـ وـرـأـسـ عـظـمـ الكـعـبـةـ .
- السنة السابعة عشرة - في كلا الجنسين ، اندماج قمة لوح الكتف .
- في الإناث ، اندماج الكردوس المشترـكـ لـعـظـمـ العـضـدـ وـعـظـمـةـ السـاعـدـ البعـيدـ ، وـعـظـمـةـ الفـخـذـ البعـيدـ وـعـظـمـةـ الشـظـيةـ القرـيبـةـ .
- السنة الثامنة عشرة - في الإناث ، اندماج عـظـمـةـ الكـعـبـةـ البعـيدـةـ .
- في الذكور، اندماج عـظـمـةـ القـصـبـةـ القرـيبـةـ .
- السنة التاسعة عشرة - في الذكور، اندماج الكردوس المشترـكـ العـلـويـ لـعـظـمـ العـضـدـ وـعـظـمـ الكـعـبـةـ البعـيدـ وـعـظـمـةـ السـاقـ البعـيدـةـ وـعـظـمـةـ الفـخـذـ البعـيدـةـ ، وـعـظـمـةـ الشـظـيةـ القرـيبـةـ .
- السنة العشرون - في الجنسين ، اندماج الحافة الحرقـفـيةـ .
- في الذكور، اندماج الحـدـبةـ الـوـرـكـيـةـ .

السنة الحادية والعشرون - في كلا الجنسين ، اندماج عظام الترقوة .


- في الإناث ، اندماج الحدبة الوركية .

وقد تبين أنه بدلاً من التركيز على أجزاء الهيكل العظمي كاملة ، يمكن للباحث استنباط تقديرات للعمر موثوق بها وبشكل أفضل من النشاط النضوجي المشترك في عدد قليل من مناطق النمو الهامة . وبمعنى آخر فإن عمر هيكل عظمي معين يمكن التنبؤ به من مجموع نتائج النشاط الكردودسي في المناطق الهامة وأهمها عظام الحوض .

ت تكون التحامات عظمة العانة من التقاء العظام (غير المسممة) اليمنى واليسرى عند خط الوسط من الأمام . وقد ثبت أن هذه المنطقة هي الأفضل في حالة تقدير عمر الشباب البالغ بعد أن يكتمل قفل الكراديس (أطراف العظام) المختلفة وحتى عمر يقارب الخامسة والأربعين عاماً . ويتم تقدير العمر بالمقارنة بين واجهة التحام عظمة العانة وبين قوالب قياسية من الالتحامات المعروفة سلفاً بانتمامها لأعمار معينة ، وهذا الأسلوب موثوق به بالنسبة للذكور أكثر من الإناث نظراً لقلة التغيير المنتظم وزيادة سرعة الانحلال في الإناث نتيجة للإصابة في هذه المنطقة وارتباطها بالحمل والولادة . وبناءً عليه فإن تقدير العمر الناتج بهذا الأسلوب يكون أقل دقة .

أما الأسلوب الذي وصفه ماكيرن وستيوارت (1957) فإنه يقوم على أساس فحص عظام الذكور من الشبان الأميركيين الذين تم التعرف عليهم وإعادتهم إلى موطنهم عقب انتهاء الحرب الكورية . وبسبب تركيب العينة التي جرى فحصها ، فإن هذا الأسلوب يقتصر استخدامه على الذكور الشبان نسبياً . وهي تعتبر بديلاً لطريقة تود (Todd, 1920) التي أوضح بروكس (Brooks, 1955) أنها تحوي بعض أوجه النقص والعيوب المحملة .

وقد حدد ماكيرن وستيوارت (1957) ثلاثة أجزاء للفحص في التحام عظام العانة كل منها مقسمة إلى خمس مراحل تكوينية (شكل ٢٢) .



(شكل ٢٢)
مناطق التحام عظمة العانة عند الذكور

١ - الهضبة الظهرية : Dorsal Plateau

صفر - الحافة الظهرية غير موجودة .

- ١ - يظهر تكوين حافة خفيفة في الثلث الأوسط من الحد الظهري .
- ٢ - تمتد الحافة الظهرية على طول الحد الظهري بكامله .
- ٣ - امتلاء الأخديد وتشرب الحواف لتكوين بداية الهضبة في الثلث الأوسط من منتصف الواجهة الظهرية .
- ٤ - ما زالت الهضبة تحمل آثار الانتفاخ وتمتد على معظم نصف الواجهة الظهرية .

٥ - يختفي الانفاس تماماً ويصبح نصف الوجهة بكامله مسطحةً مستويّاً مع تحبس خفيف.

٢ - الجدار البطني : **Ventral Rampart**

صفر - الميل البطني غير موجود.

١ - الميل البطني موجود فقط عند الطرف العلوي للحد البطني.

٢ - يمتد الميل باتجاه الأسفل على طول الحد البطني.

٣ - يبدأ الجدار البطني عن طريق امتدادات عظمية من إحدى الطرفين أو كليهما.

٤ - الجدار ممتد ولكن لا تزال توجد فوائل واضحة على طول الحد البطني السابق وتكون أوضح في الثلثين العلويين.

٥ - الجدار كامل تماماً.

٣ - الإطار الالتحامي : **Synphyseal Rim**

صفر - الإطار غير موجود.

١ - الإطار الظاهري موجود جزئياً وهو عادة يبدو عند الطرف العلوي من الحافة الظهرية ، وهو مستدير ذو نسيج ناعم ومرتفع فوق السطح الالتحامي .

٢ - الإطار الظاهري كامل بينما يبدأ تكون الإطار البطني محدد للتكونين .

٣ - الإطار كامل تماماً. السطح الالتحامي المحصور بداخله ذو نسيج دقيق التحبب ومظهره غير منتظم أو متوج .

٤ - الإطار يبدأ في الانحلال ، فيصبح الواجهة ناعمة ومسطحة ولا يعود الإطار مستديراً ولكنه محدد بوضوح تام. بعض الدلائل على حدوث تشرفات (نمو عظمي) على الحد البطني .

٥ - مزيد من انحلال الإطار وبصورة خاصة على طول الحد البطني

الأعلى مع ترقق الواجهة الالتحامية . وكذلك تفسخ وتحول عظمي لا مركري على طول الإطار البطني .

وباستخدام أساليب مشابهة لطريقة ماكيرن وستيوارت فقد تمكّن جلبرت وماكيرن (Gilbert and Mckern 1973) من وضع طريقة لتقدير عمر الهياكل العظمية للإناث باستعمال التحامات عظمة العانة ، وقد استخدما أيضاً ثلاثة عناصر مقسمة إلى خمس أطوار . وقد تم وصف العناصر والدرجات كالتالي .

العنصر ١ :

صفر - الأخداديد والشقوق مميزة بوضوح ، الأخداديد منتفرخة والحافات الظاهرة غير محددة .

- ١ - الأخداديد تبدأ في السطح ، وتمتلئ الشقوق وتبدأ الحافة الظاهرة المستوى في الثلث الأوسط من منتصف الواجهة المفصلية .
- ٢ - نصف الواجهة الظاهرة ينتشر باتجاه البطن ويصبح أعرض ويستمر السطح وتمتد الحافة الظاهرة باتجاه أعلى وأسفل .
- ٣ - نصف الواجهة الظاهرة ناعم تماماً وقد تكون الحافة ضيقة أو غير ممكّن تمييزها من الأمام .
- ٤ - نصف الواجهة المفصلية يصبح كاملاً ومتصلأً وهو عريض ذو حبيبات دقيقة جداً ويمكن أن يظهر عليه انتفاخ أفقي .
- ٥ - تصبح الواجهة المفصلية منقرفة وغير منتظمة من خلال الترقق .

العنصر ٢ :

صفر - الأخداديد والشقوق مميزة بوضوح تام . نصف السطح المفصلي بكماله مشطوف لأعلى باتجاه نصف السطح الظهري .

- ١ - ابتداءً من أسفل تمتليء شقوق نصف السطح البطني مكونة جداراً

متflexاً ومتسعًا والحافة الجانبية يمكن تمييزها بوضوح كخط منحنٍ يمتد بطول الالتحام.

٢ - يستمر سد الشقوق واتساع نصف السطح المفصلي من كلا الطرفين العلوي والسفلي وينتشر الجدار جانبياً على طول الحافة البطنية.

٣ - يمتد كل نصف السطح المفصلي البطني باستثناء حوالي ثلثه بعادة عظمية ذات حبيبات دقيقة.

٤ - يظهر الجدار البطني على شكل سطح عريض وكامل والحببيات الدقيقة من قمة عظمة العانة حتى الشعبة السفلية.

٥ - قد يبدأ الجدار البطني في الانحلال ليصبح ذا مظهر منقر أو ربما سامي من خلال عملية التدقّيق.

العنصر ٣:

صغر - الإطار غير موجود.

١ - يبدأ الإطار من الثلث الأوسط للسطح الظاهري.

٢ - الجزء الظاهري من الإطار الالتحامي كامل تماماً.

٣ - يمتد الإطار من الطرفين العلوي والسفلي للالتحام حتى يكتمل كل السطح البطني باستثناء حوالي ثلثه.

٤ - الإطار الالتحامي كامل.

٥ - قد تتحلل الحافة البطنية من نصف السطح الظاهري بحيث تظهر فوائل في الإطار أو أنها قد تستدير بحيث لا يعود هناك وجود للخط الفاصل الواضح بين نصف السطح الظاهري والجدار البطني.

وهكذا تقدم العناصر الثلاثة جميعاً بصورة ثابتة عبر المراحل الخمسة مع تقدم العمر، وتحدد نتيجة كل عنصر على حده بصورة منفصلة لتحديد الدرجة التي يندرج تحتها. وعند استخراج نتائج العناصر الثلاثة جميعاً،

تضاف معاً ويتم إدخال الرقم الناتج في جدول لتحديد العمر، والانحراف القياسي المناسب لهذه النتيجة. مثلاً إذا كانت الأرقام التي أحرزتها العناصر الثلاثة كالتالي.

$$4 = 1$$

$$3 = 2$$

$$4 = 3$$

$$\text{المجموع } \overline{11}$$

فإن المجموع النهائي (11) يتم البحث عنه في الجدول رقم (٥) الذي يبين أن هذه النتيجة (11) يقابلها متوسط عمر ٢٩,١٨ وانحراف قياسي مقداره ٣,٣٣ مما يعني أن هناك احتمالاً بنسبة ٦٦ بالمائة أن يكون العمر (الصحيح) في حدود $\pm 6,66$ سنة. أي إن مدى العمر الذي يقابل هذه النتيجة هو من ٢٣ إلى ٣٩ سنة.

جدول رقم (٥)

جدول تقدير العمر الذي يستخدم مع قوالب التحام عظمة العانة في الذكور

الرقم الناتج	العمر	الانحراف القياسي	المدى
صفر	١٧,٢٩	٠,٤٩	١٧-
٢ - ١	١٩,٠٤	٠,٧٩	٢٠ - ١٧
٣	١٧,٧٩	٠,٨٥	٢١ - ١٨
٥ - ٤	٢٠,٨٤	١,١٣	٢٣ - ١٨
٧ - ٦	٢٢,٤٢	٠,٩٩	٢٤ - ٢٠
٩ - ٨	٢٤,١٤	١,٩٣	٢٨ - ٢٢
١٠	٢٦٠,٥	١,٨٧	٢٨ - ٢٣
١٣ - ١١	٢٩,١٨	٣,٣٣	٢٩ - ٢٣
١٤	٣٥,٨٤	٣,٨٩	- ٢٩
١٥	٤١,-	٦,٢٢	- ٣٦

وتشتمل الأرقام الناتجة في الحصول على تقديرات العمر بإدخالها في
الجدول رقم (٦) .

جدول رقم (٦)

جدول تقدير العمر الذي يستخدم مع قوالب التحام عظمة العانة في الإناث

الانحراف القياسي	مدى العمر	متوسط العمر	الرقم الناتج
٢,-	١٨ - ١٤	١٦,-	صفر
٢,٧٦	٢٤ - ٢٣	١٩,٨٠	١
٤,٩٧	٢٥ - ١٦	٢٠,١٥	٢
٥,٣٦	٢٥ - ١٨	٢١,٥٠	٣
٥,٧٠	٢٩ - ٢٢	٢٦,-	٥ - ٤
٦,٨٦	٣٦ - ٢٥	٢٩,٦٢	٦
٥,٥٤	٣٩ - ٢٣	٣٢,-	٨ - ٧
٩,-	٤٠ - ٢٢	٣٣,-	٩
٧,٧٣	٤٧ - ٣٠	٣٦,٩٠	١١ - ١٠
٨,٥٤	٥٢ - ٣٢	٣٩,-	١٢
٧,٥٧	٥٤ - ٤٤	٤٧,٧٥	١٣
٨,٠٧	٥٩ - ٥٢	٥٥,٧١	١٥ - ١٤

وكما هو واضح من دراسة الجداول ، فإن الطريقة المستخدمة لتقدير عمر التحامات عظمة العانة في الإناث تتضمن انحرافات قياسية أوسع مما هي عليه في الطريقة المستخدمة للذكور. وبناءً عليه يكون الاحتمال أقل في الحصول على تقدير دقيق جداً لعمر الهياكل العظمية في الإناث . ويعود سبب الفرق بين الجنسين إلى الإصابة التي تلحق بالتحامات عظمة العانة من جراء الحمل والولادة في الإناث (Gilbert, 1973) .

كبار السن البالغين Old Adults

يعتبر عمر الهيكل العظمي بعد سن الخامسة والأربعين أشد صعوبة لتقديره بدقة إذ يستمر الاتجاه نحو انحلال الأسنان والهيكل العظمي الذي كان

قد بدأ بالفعل في فترة البالغ الشاب وإن كان يجري بدون انتظام. وفي هذه السن تكون التهابات المفاصل قد ظهرت بصورة دائمة تقرباً في العمود الفقري ، إلا أن شدة هذه الالتهابات لا تعتبر مؤشراً إلى العمر موثقاً به لأنها تختلف باختلاف الأشخاص . وظهور الأسنان عموماً باسطح بالية ومتآكلة رغم أن درجة البلى والتأكل تعتمد على نوع الغذاء والعادات الشخصية . وقد تكون الطبقة العليا من الأسنان فقط مثلمة أو قد يلي تاج الأسنان ويتآكل حتى خط اللثة . وفي أواسط الأربعينات تكون هناك سن أو أكثر مفقودة من جراء حادث أو مرض رغم أن هذا أيضاً يختلف حسب الأشخاص . وقد يحتفظ شخصاً أو آخر بمجموعة كاملة من اثنين وثلاثين سنة في سن الستين ، في حين يكون فرد آخر من نفس الجماعة قد فقد كل أسنانه بالكامل في سن الأربعين . وهكذا فإنه لا توجد طريقة دقيقة لتحديد العمر عن طريق الملاحظة الشاملة للهيكل العظمي في البالغين الأكبر سنًا . ويوفر الفحص المجهرى للأجزاء الرقيقة من عظام البالغين التقدير الدقيق للعمر في هذه المجموعة من البالغين كبار السن .

وتشتمل طريقة كيرلي (Kerley, 1965) لتقدير عمر الهياكل العظمية المسنة أو الشابة على فحص مقاطع رقيقة من منتصف ساق العظام الطويلة تحت مجهر منخفض الطاقة وذلك للبحث عن أي تغيرات تركيبية مرتبطة بالعمر في الثلث الخارجي من النخاع العظمي . ويمكن استخدام هذه التغيرات لتقدير عمر العظمة حتى سن خمسة وستين عاماً على الأقل بمعدل دقة ± 10 سنوات - لجميع العينات و ± 5 سنوات بنسبة ٨٧,٣ بالمائة من الحالات التي جرى فحصها . ويلاحظ كيرلي أن معدل الدقة يكون أعلى في العينات الأصغر سنًا .

ويجري فحص مقاطع العظام لتحديد:

- ١ - عدد وحدات الخلايا العظمية .
- ٢ - عدد جزئيات وحدات الخلايا العظمية القديمة .
- ٣ - النسبة المئوية للعظام الصفائحية المحيطة .

٤ - عدد القنوات غير الها فرسية .

يزيد البندان (١) ، (٢) مع العمر المتقدم ، ويتناقص البندان (٣) ، (٤) مع تقدم العمر إلى أن يختفي تماماً عن بلوغ سن الخامسة والخمسين . ويمكن الاطلاع على خرائط تقدير العمر وعينة نموذج البيانات في المقالة الأصلية .

ويشير ستیوارت وماکرن (Stewart and Mckern, 1957) إلى أن العظمة غير المسماة هي أكثر المناطق أهمية في الهيكل العظمي . واللاحظة المشتركة لالتحام العظمة غير المسماة والحافة الحرفية والحدبة الوركية والفرع المفصلي لا بد أن تضع الهيكل العظمي على الفور في مجموعة عمره المناسبة . فإذا تبين أن التحام عظمة العانة - وهو مؤشر جيد للعمر على أكبر مدى من سنوات العمر - كان تالفاً أو مفقوداً ، فإن مناطق العمر الباقي في العظمة غير المسماة ستعطي الملاحظ دليلاً يهديه إلى مصدر آخر موثوق به للمعلومات عن العمر . مثلاً إذا أوحىت الحافة الحرفية بأنها لمراهق ، فإن الدرز القاعدي بالجمجمة والالتحامات المرفقة يمكن الرجوع إليها للحصول على مزيد من الإيضاحات والإثبات المؤيد لذلك . ومن ناحية أخرى إذا أظهرت الحافة الحرفية أنها لبالغ شاب فإن التحامات الأكتاف والرسغين ومفاصل الركبة وكذا الطرف الأوسط من الترقوة تساعد كلها على إيجاد التقدير الصحيح للعمر .

التعرف على العنصر البشري

Race Identification

ليس من السهل التعرف على السلالة البشرية من خلال الهيكل العظمي . وذلك لعدم وجود معيار سلالي محدد في كثير من الحالات بالإضافة إلى عدم وجود تعريفات دقيقة لما تعينه السلالة البشرية وكيفية تميزها عن غيرها . فالسلالة مثلها مثل العمر لم يعد بالإمكان التعرف عليها بسهولة كما يتصور البعض . ففي كثير من الحالات ليس ثمة أدلة شك في إمكانية التعرف على أن الفرد ينتمي إلى السلالة الزنجية أو القوقازية ، ولكن بالنسبة لأفراد آخرين يكون التصنيف غير دقيق . وفي

الحالات التي يكون فيها الفرد خليطاً من سلالتين أو أكثر تزداد المشكلة صعوبة (Gill, 1976). على سبيل المثال، ومع خبرة الباحث، من الممكن القول إن شخصاً ما من شمال أوروبا أكثر من كونه شخصاً قوقازياً فقط. ولكن هذا القول يكون محفوفاً بالمخاطر نظراً للتغير الذي عادة ما يطرأ على القوقازيين أو أي سلالة أخرى، وخاصة اختلاطهم بسلالات بشرية أخرى. وعلى ذلك فإن وجه هذا الشخص الطويل جداً لا يمثل جميع الأجناس المحلية القوقازية التي تعيش في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفيما يلي خلاصة موجزة جداً عن السمات والمميزات التي يفرق على ضوئها بين الزنوج والقوقازيين والمغوليين إعتماداً على البقايا العظمية.

الزنوج السود Negro

جبهة مستديرة «جمجمة أشبه بجماجم الأطفال» وبها القليل من التوءات. ويعتبر جمامجم الزنوج علامات العضلات الخفيفة ولكن أكثر ما يميز الزنوج هو العظم الأفطس للمنخر. فبدلاً من الحافة الحادة للمنخر كتلك الموجودة عند القوقازيين والمغوليين، نجد أن عظم المنخر عند الزنوج دائمة عادية. وفضلاً عن ذلك نجد أن القناة أو المجرى غالباً ما تمتد في الجانبين حوالي ٥ مم داخل المنخر. وأن القناة المنخرية ما تزال ثابتة الظهور في جمامجم الزنوج الذين عرف عنهم الاختلاط بالقوقازيين أو المغوليين - كما هو الحال بالنسبة للزنوج الأمريكيين. وثمة سمة أخرى في جمامجم الزنوج الشبيهة بجماجم الأطفال وهي بروز الجزء من الفك الذي تكون جذور الأسنان مغروسة فيه، وقد يوجد مثل هذا البروز كذلك في جمامجم بعض الهنود الحمر، وإن كان ذلك بدرجة أقل مما هي عند الزنوج، ولكن هذه السمة غير موجودة عند القوقازيين. ويميل محيط محجر العين عند الزنوج إلى أن يكون مربعاً مع انساط في عظمة المنخر. ويكون سقف الحلق مربعاً تقريباً أو ضيق ومستلق. وتميل ججمة الزنوج لأن تكون طويلة أكثر من

كونها مستديرة، وهي ميزة قد تتعرض للتغيير بسبب الاختلاط بالأجناس البشرية الأخرى.

Caucasians

يتميز الوجه القوقي بالخط العمودي الحاد في المنبسط السهمي مما يجعل الوجه أشبه بالبلطة في مشهد الجنبي. وتميل الجمجمة إلى الطول بدلاً من الاستدارة، ويلاحظ انبعاج جذر المنخر جيداً، كما أن بروز أطراف عظام المنخر من الجانبين يتلاشى تحت بروز مفرق الحاجبين. وهذه ميزة نموذجية في الذكور عند الأوربيين الشماليين وهي أقل ظهوراً في سكان حوض البحر الأبيض المتوسط وعند النساء عموماً. وقد تظهر فيه علامات على مواضع العضلات. ويميل محيط الجمجمة إلى الاستدارة وفتحات المنخر إلى الضيق والاستطاله ويكون سقف الحلق مثلاً، وتكون العظام خلف الجمجمة ثقيلة مقارنة بالأجناس الأخرى.

(المغوليون بما في ذلك الهنود الحمر الأمريكيون) : Mongoloids

تكون جمجمة الشخص المغولي في العادة، ولكن ليس دائماً، مستديرة أكثر من كونها طويلة، كما أن بروز الوجنتان يجعل الوجه يبدو مفلطحاً وعلامات مواضع العضلات قد تظهر وقد لا تظهر. والسمة المميزة هو شكل الأسنان القاطع. فغالباً ما تكون تلك الأسنان وبخاصة الأمامية منها أشبه ما تكون بالشبل من حيث الشكل (انظر شكل ١٨أ و ب) وقد يظهر في الوجه أحياناً بروز في الفك السفلي ولكن على نحو أقل مما هو عند الزنوج. ومحجر العين مثلث الشكل إلى حد ما. أما قسمات المنخر فتميل إلى الاستدارة، ويكون سقف الحلق على شكل حدوة الحصان.

إن دراسة السمات السابقة لمختلف الأجناس وتفحص عدد من الجماجم من كل جنس منها هي الطريقة الوحيدة للكشف عن علامات العنصر الساللي في الجمجمة. ويحتمل أن لا تكون بعض السمات ظاهرة في جمجمة ما من الجماجم على الرغم من كون تلك الجمجمة تخص شخصاً

يتنمي إلى الجنس الذي يتميز بتلك السمات . وبالمثل فإن بعض السمات الأخرى قد تكون مفيدة في التعرف على الجنس غير أن ذلك يعتمد أولاً وأخيراً على خبرة ودراية الباحث الذي يقوم بعملية التعرف التي يصعب عليك أن تحدد معها ما الذي يجعلك تعتقد أو تجزم بأن هؤلاء الناس يبدون يهوداً أو إيطاليين . ولهذا فليس من السهل تحديد الجنس من مجرد الاطلاع على الهيكل العظمي . وتزداد هذه الصعوبة بالنسبة لأجناس معينة دون غيرها . ولا اختيار مقدرتك في التمييز حاول أن تخمن أوضاع أناس معينين ثم اسألهم عن أصولهم العرقية وستجد أن تخمينك يخونك في الكثير من الحالات ، وبخاصة عندما تورط نفسك في محاولة التمييز بين الفروع المتفرعة عن أصول عرقية واحدة ، مثل الجرمانيين في أوروبا الشمالية وسكان جبال الألب .. إلخ . وعادة ما يجد المرء تخمينه صحيحاً إذا حصر نفسه في الأصول العرقية الرئيسية الثلاث ، وستجد أن قدرتك تتحسن مع استمرار الخبرة .

الفصل الخامس التقدير على الجنس

حتى تتمكن من تمييز ما إذا كان الهيكل العظمي لذكر أو أنثى فإنه من المفيد لك أن تعرف أولاً من أي الأجناس انحدر صاحب الهيكل العظمي . إذ إن ثمة فوارق واختلافات إقليمية وعنصرية في تطور المميزات الجنسية في الهيكل العظمي (Stewart, 1947:128). ويعتمد التقدير الصحيح للجنس - ذكرأً كان أو أنثى - على العظام المتوفرة للشخص المراقب أو الباحث، حيث إن بعض العظام تكشف الكثير عن هذه الناحية عما تكشفه عظام أخرى غيرها من عظام المتوفى . فمثلاً نجد أنه بالنسبة لعظمة الحوض فإن هناك الكثير من المميزات التي تم توصيفها للكشف عن جنس المتوفى (Krogman, 1962) . وهنالك عظام أخرى يمكن أن تساعد على تحديد الجنس بدرجات متفاوتة . فعظام كعظام الترقوة وعظام العقب والكعبية والزند قد تكون مفيدة في بعض الحالات ، وعلى العكس فإن عظاماً أخرى مثل عظام الأصابع وفقرات العمود الفقري والأضلاع لا تمدنا في الغالب بأية معلومات مفيدة لتحديد جنس صاحبها . ومن هنا فإن القدرات العقلية للشخص الباحث تصبح حاسمة بهذا الصدد ، حيث إنه سيكون قد يكون لنفسه تصوراً خاصاً للحجم والمورفولوجيا الذي كان عليه صاحب الهيكل العظمي ويستطيع من خلال ذلك التفريق بين هيكل الأنثى والذكر.


إن عظام الأفراد غير البالغين تكون في الغالب عديمة الفائدة لتحديد الجنس ، ذلك لأن المميزات الجنسية الثانوية لا تبرز في العظام إلا تحت تأثير

ظهور معالم الأنوثة والذكورة في مرحلة البلوغ (Weiss, 1972). فالأطفال دون سن البلوغ لا تظهر عليهم سوى فوارق قليلة جداً من حيث البنية والشكل الجسماني خارج نطاق الأعضاء التناسلية. وعلى أية حال فقد يصبح القول بأن ثمة مميزات يمكن ملاحظتها في تلك العظام. فلقد لاحظت (Boucher, 1957, 1955) على سبيل المثال، وجود فوارق جنسية في عظام الحوض عند الأطفال الرضع، إلا أن طريقتها تتطلب إما أن يكون الجسم سليماً وتبني القياسات والتقديرات على صور الأشعة أو على استعمال الهياكل العظمية شريطة أن يكون عظم الغضروف سليماً. وهناك عدد من العظام في الهيكل العظمي البشري التي تقدم الأدلة للمراقب الخبر. والأمثلة على ذلك تشمل درجة غلاظة وحجم عظام الترقوة والقص. ونجد أن كل واحد من الباحثين المراقبين يطور لنفسه المعيار الذي يراه ملائماً لتحديد جنس صاحب الهيكل العظمي.

عظام الحوض The Pelvis

ترى الغالبية العظمى من الباحثين أن الجزء الذي يعول عليه أكثر من غيره في الهيكل العظمي الإنساني لمعرفة الجنس هو الحوض وأفضل معيار لتحديد الجنس هما زاويتان غير مسميتان في كل من الورك، وتحت العانة. فهاتان الزاويتان تكونان أكثر انفراجاً عند المرأة مما هما عند الرجل. وتقول «قاعدة الإبهام» لمعرفة الجنس من هاتين الزاويتين على أن كلاً منها تكون في الأثنى مساوية تقريباً لأنفراج الزاوية بين السباة والإبهام عند المباعدة بينهما إلى أقصى درجة. في حين أن هاتين الزاويتين عند الرجال تكون مساوية للزاوية المحصورة بين السباة والأصبع الأوسط (شكل ٢٣) وإذا

كانت هاتان الزاويتان غير المسميتان موجودتين بالنسبة لشخص ما ، فإنه يمكن استرجاع أو استعادة زاوية تحت العانة بمطابقة مفصل الوصل العاني ، وعلى كل فإنه غالباً ما لا يبقى سوى زاوية واحدة من هاتين الزاويتين . وفي هذه الحالة فإن فحص فرع الورك العاني قد يكون كافياً . ففي المرأة غالباً ما يكون هذا الفرع مقعرأ بينما يكون عند الرجل إما مستوياً أو مسحوباً . ويمكن إعادة تشكيل الزاوية بصورة ذهنية من خلال ملاحظة الزاوية المتكونة من وجه الورك العاني في مقابل الوجه الداخلي لفرع الورك العاني (شكل ٢٤) .



شكل (٢٣)

الزاويتان غير المسميتين التي يمكن من خلالهما التمييز بين
عظم الرجل ذي الزاوية الحادة
وعظم المرأة ذي الزاوية المنفرجة



شكل (٢٤)
الصورة العليا لحوض انتى بالغة
والسفلى لحوض ذكر بانغ

لقد أعطى «باس» قاعدة إبهام مختلفة بالنسبة لزاوية تحت العانة ولاحظ أنه: «متى ما وضع إصبع السبابة بشكل عمودي على مفصل الوصل العاني فإن حركة الإبهام تكون محدودة إن لم تكن معدومة في حالة الرجل ، ولكن عند المرأة يكون ثمة متسع لتحرك الإبهام (Bass. 1971) .

وقد اقترح هينوفيس (1962 - Genoves) استعمال ما يلي لتقدير نوع الجنس من عظم الحوض :

- ١ - حجم منتصف عظم الحوض من نقطة مركز الحدود الأمامية للمفصل العاني حتى أقرب طرف وسطي للثقب المسدود - يكون أصغر حجماً عن الذكور.
- ٢ - أقل عرض سفلي للحرفة وهي أقصر مسافة بين نقطة الحق التحتي والحد الخارجي للفرصة الوركية - وهي عند الذكور أعرض.
- ٣ - أقصى قطر عمودي للحق - القطر عند الرجال أكبر.
- ٤ - الحرف الممتد من الحد الخارجي للسطح الأذيني الذي يؤدي مباشرة إلى الحد الخارجي لقمة الفرصة الوركية - الإناث ليس عندهن مثل هذا الحرف.
- ٥ - الضخامة النسبية للجزء العلوي من المنطقة الوسطى للعانية أو القوس العاني - ويكون عند الرجال أكثر ضخامة .

إن الثلم الواقع أمام أذن عظم الحوض هو عبارة عن أخدود يحدث بشكل محاذٍ مباشرة للمفصل العجزي الحرقفي ، على الوجه الخارجي لعظم الحرقفة . وفي دراسة عن هذا الثلم عرف هوتون (Houghton, 1974) شكلين من أشكال هذا الثلم أسماهما «ثلم الحمل» و«ثلم الرباط القوي» على العظم وهذا الأخير يحدث في عظم حوض الذكور والإإناث وإن معرفة ما إذا كان الثلم ناتجاً عن الحمل فإن ذلك يدل على أن الهيكل العظمي لامرأة . أما إذا كان من النوع الآخر فإنه يجب على المراقب البحث عن أساليب أخرى للتفرير بين هيكل الأنثى وهيكل الرجل .



شكل (٢٥)
الثلم الأيسر في مفصل الحوض عند الأنثى
ويشير السهم إلى مكان الثلم الذي عرفه هوفمان

في عام ١٩٧٢ نشر نيميسكري (Nemeskeri, 1972) برنامجاً من خمس مراحل لتقدير عدد حالات الحمل التي مرت بها الأنثى، وتعتمد هذه الطريقة على التغيرات التكيسية الملحوظة في مفاصل عظم الحوض عند الأنثى البالغة وهي التغيرات التي يمكن أن تعزى للحمل (شكل ٢٦). وقد لاحظ نيميسكري أن عدد مرات الحمل التي عزّاها إلى كل مرحلة من تلك المراحل تحتاج إلى ما يبرهن على صحتها بواسطة الفحوص والاستقصاءات التي تم عن طريق تشريح الجثث.



(شكل ٢٦)

مشهد خلفي (ظاهري) لنفس الحوض المبين في
شكل ٢٥ يوضح الحفر التي تخلفها الولادة، أي التغيرات
التنكية حسب تعريف نيميسكري

وفيما يلي المراحل الخمسة التي نشرها نيميسكري (١٩٧٢) :

- ١ - حيث تكون المواقع الحادة لمعارز العضلات تمتد بشكل حلزوني إلى الأسفل . ويفصل فيما بينهما بعض الشذرات عند الهاشم الوسطي الأمامي لعظم العانة (عدد ١ - ٢ ولادة) .
- ٢ - نجات واضحة تماماً شبيهة باللؤلؤ على امتداد خطوط مغارز العضلات الممتدة إلى الأسفل (٣ - ٤ حالات ولادة) .
- ٣ - الخطوط المحددة بدقة مبدئياً بالنسبة لمعارز العضلات على السطحين الأمامي والخلفي لعظم العانة تصبح أكثر سماكة . (٤ - ٥ حالات ولادة) .
- ٤ - تكرار الخطوط السميكة لمعارز العضلات مع النجات التي تظهر على هيئة حدبات قذالية وحشية . (٦ - ٨ حالات ولادة) .

٥ - تشوّه منطقة العانة بشكل تفاضلي إلى حد كبير. بحيث يصعب بعدها تصنيف التغيرات التي تمر بها. (أكثر من ٨ - ١٠ حالات ولادة).

وهناك بيانات التدقيق التي قام بها أوليفر (Oliver. 1969) بما في ذلك العديد من الملاحظات. ففي الرجال أوضح أن عظم العانة مثلث عموماً يتوجه رأسه إلى الأسفل ، وأن جميع الأجزاء العظمية أكثر سمكاً وثقلأً. أما عند النساء فعظم العانة مربع الشكل تقريباً مع وجود حفرة في سطحه الأمامي أما بالنسبة لعظام العجز فإنه يمكن القول بأن تحديد الجنس على أساس عظم العجز أمر ينطوي على مجازفة ، وعلى العموم فإن العجز أكثر انحناء عند الرجال متى شوهد من الجانب ، وإن شكل العظم طويل نسبة إلى ارتفاعه عند الذكور في حين أنه أكثر تربعاً عند النساء .

الجمجمة The Skull

بعد عظام الحوض تعتبر الجمجمة هي المنطقة الأكثر أهمية بالنسبة لتحديد الجنس ذكرأً كان أم أنثى . ذلك لأن عدداً من الصفات الدالة على الجنس تكون موجودة في الجمجمة . ولكن ينبغي بذل قدر معين من الحرص حيث إن درجة الوضوح الجنسي المنشورة هناك تختلف باختلاف بعض تفرعات الأجناس البشرية .

وعلى العموم يمكن تلخيص العلامات الدالة على الجنس في الجمجمة بالقول إن الجمجمة أكثر صلابة وسمكاً عند الرجال منها عند النساء وإذا كانت النعومة والاستدارة هما مما يميز شكل النساء عموماً عن الرجال ، وأن الرجال يتضمنون بالغلوظة والخشونة ، فإنه يمكن قول الشيء ذاته بالنسبة للجمجمة . ويمكن الاعتماد على الجمجمة لتحديد نوع الجنس إذا ما أمكن التعرف على السمات الخاصة التي تحدد نوع الجنس من قبل أحد المختصين ، أو فحص عدد من الجمامجم حيث يتبيّن أنه يمكن تصنيف الجمجمة وفقاً للخصائص والسمات التالية : معظم الجمامجم الغليظة والخشنة تعود إلى الرجال ، أما الجمامجم النحيلة والدقيقة فتعود إلى النساء علاوة على بعض الصفات

المشتركة بين الجنسين والتي ينبغي توخي الحذر عند الاعتماد عليها لتحديد نوع الجنس.

عَظْمُ الْجَبَهَةِ : The Frontal Bone

أحد السمات التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد نوع الجنس ، إذ يتصرف الرجال عادة بوجود حديثين على عظم الجبهة ، بينما للنساء حدبة واحدة في المنتصف . وهذه سمة يمكن ملاحظتها بسهولة فيمن حولك من البشر حيث يضع الفرق بين الرجال والنساء .

حافة محجر العين : Orbital Rim Sharpness

أحد العلامات المميزة التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد نوع الجنس .
إن حافة محجر العين لدى الرجال التي تكون مستديرة وغير مستدقه الطرف ،
بينما في النساء تكون حافة محجر العين ذات طرف حاد مستدق وواضح ،
ويمكن فحص هذه الخاصية المميزة بإمارار طرف الأصبع على حافة محجر
العين داخل الفتحة .

حجم الخشاء - التوء الحلمي للعظم الصدغي : Process

يتميز التنوء الحلمي للعظم الصدغي بكبر حجمه في الرجال عن النساء . ويمكن مقارنة الاختلاف بين النساء والرجال بالمقارنة بين المقطع النهائي لطرف الخنصر والمقطع النهائي للإبهام . وهناك خاصية أخرى وهي أن التنوء الحلمي للعظم الصدغي لدى الرجال يمتد أسفل عظم الججمة بينما لا نجد ذلك الوضع لدى النساء ، وهذه الخاصية التشخيصية يمكن إلى حد ما الاعتماد عليها لتحديد الجنس ، إلا أنها تختلف بين الأجناس المختلفة .

: زاوية الفك الأسفل Gonial Angle

تشبه رأس زاوية الفك الأسفل لدى الرجال الزاوية القائمة، بينما تكون أشبه بالزاوية المنفرجة لدى النساء. أي إن الفك الأسفل للرجال ذو

طرف مميز عنه لدى النساء ، ويمكن تفحص هذه الخاصية بملاحظة رأس زاوية الفك للزملاء معك ، حيث إنها خاصية وعلامة مميزة يمكن الاعتماد عليها .

ارتفاع جسم الفك السفلي : Height of the Mandibular Body

يمكن فحص هذه الخاصية من منتصف الخط الأمامي للفك السفلي ، إذ يكون ارتفاع جسم الفك السفلي أكبر لدى الرجال منه عند النساء حين قياسه بالعين من الحافة العليا للتنوء السنخي إلى الطرف الداخلي من الفك السفلي . في الإناث يشكل جسم الفك ثلثي ارتفاعه في حين أن التنوء السنخي يمثل جزءاً واحداً من ارتفاعه . وهذه الخاصية يمكن الاعتماد عليها إلى حد كبير .

شكل الذقن : Shape of the Chin

يتنهى الطرف الأسفل للفك السفلي عند النساء ببروز واحد فقط ، بينما يتميز ذقن الرجال ب نقطتين بارزتين يربط بينهما خط مستقيم ، مما يشير إلى أن ذقن الرجال تبدو غالباً مربعة . وهذه علامة مميزة يمكن الاعتماد عليها و مشاهدتها بفحص ذقن الزملاء لديك .

النحت النافر للعضلات : Muscular Relief

يعول البعض على هذه الخاصية لتحديد الجنس ، بينما يجد البعض الآخر صعوبة بالغة في الاعتماد عليها . على العموم ، يتميز الرجال عادة بوجود آثار بارزة للعضلات على الجمجمة غير ظاهرة عند النساء ، وخاصة في منطقة التنوء العنقى ، وفي منطقة السطح الخارجي لزاوية الفك السفلي وكذلك خط الصدر .

لامعات أخرى : Other Features

يتصف الرجال بشكل عام بأن قفا العنق لديهم يكون غليظاً وبارزاً أكثر منه عند النساء وأن منطقة أعلى الفم مسطحة وأعرض كثيراً مما هي عند النساء . والجمجمة بصفة عامة أكبر عند الرجال عنها عند النساء . كما أن

الجانب الأمامي لجمجمة الرجال أقرب ما تكون إلى المربع أي مربعة الشكل بينما تكون طويلة الشكل عند النساء . غير أن هذه الملامح والصفات تختلف باختلاف الأجناس البشرية ، وفي رأي المترجم وبناءً على خبرته الشخصية ، فإن أهم الملامح التي يعتمد عليها لتحديد الجنس ذكرًا أم أنثى اعتماداً على الججممة هي : مدى بروز حواف الحاجب ومدى حدة محجر العين وكذلك مدى ارتفاع جسم الفك السفلي ، وهي علامات قد يختلف عليها باحث آخر يضع معايير أخرى لتحديد نوع الجنس .

تحديد الجنس بناءً على عظام أخرى غير الججممة أو الحوض : **Sex Determination from Post - Cranial Bones**

تعتبر الصفات التي يعتمد عليها لتحديد نوع الجنس ذكرًا كان أم أنثى بناءً على العظام التي تقع أسفل الججممة نفس الصفات التي يتميز بها الكائن الحي . ففي العادة تكون أطراف الرجال أكثر طولاً وصلابة وغلاظة منها عن النساء . كما أن الأكتاف أعرض وكذلك الأيدي والأقدام أكبر عند الرجال منها عند النساء ، وينطبق ذلك الأمر على بقية عظام هذه الأجزاء . وقد تكون هذه المعايير أمراً مؤكداً يعتمد عليه بالنسبة للأحياء رغم وجود بعض الاستثناءات والحالات الشاذة إذ نجد أن بعض الرجال لهم أطراف صغيرة ورفيعة بينما هناك نساء لهن أطراف كبيرة وخشنة . وينطبق ذلك أيضاً على العظام . وعلاوة على ذلك فإن مدى التداخل وعدم القدرة على تحديد نوع الجنس يعود إلى الهيكل العظمي ، ولذا نجد بعض النساء لهن أكتاف عريضة مثل الرجال ، وهو الأمر الذي يمثله طول وصلابة الترقوة . كما أن كثيراً من النساء لهن أيدي وأقدام عريضة مثل كثير من الرجال . وهذه حالات كثيرة لا يستهان بها ، ومن ثم فإن العظام تعكس هذا الوضع تماماً .

وفي مجال تحديد نوع الجنس بناءً على العظام الأخرى خلاف الججممة يلجأ الباحث إلى الاعتماد على الصورة الذهنية لديه لما يكون عليه الحجم والشكل العادي لعظام كل نوع من الجنس ذكرًا أم أنثى . ويصبح رأي الباحث المُجرب أمراً حيوياً في هذا المجال حيث لا يوجد فرق كبير بين

الرجال والنساء . وبمعنى آخر يمكن القول إن الفن في هذا المجال يلعب دوراً حيوياً مثل العلم تماماً لتحديد نوع الجنس ذكرأ كان أم أنثى ، إضافة إلى الخبرة والتجربة ومدى هذه التجربة والخبرة العملية السابقة .

The Clavicle

الترقوة هي أحد العظام التي تبدو الاختلافات فيها بين الجنسين بشكل مميز . غير أن هذه الاختلافات غير قابلة للقياس بشكل محدد . وقد استعان ثيم (Tehme. 1957) بهذه الاختلافات بين الجنسين في ترقية الزنوج لإجراء سلسلة من القياسات التي استخدمها لتحديد نوع الجنس بناءً على الهيكل العظمي للزنوج . وقد لاحظ ثيم أن هذه الاختلافات ، مثلما كان متوقعاً لها ، تمثل في أن ترقية الرجال تكون عادة أكبر وأطول منها عند النساء . وبلغ متوسط طول الترقية للرجال ١٥٨،٥٤ ملليمتر مع انحراف قياس يصل إلى ١٠،٠٦ ملليمتر ، بينما يصل متوسط طول الترقية للنساء إلى ١٤٠،٢٨ ملليمتر ، مع انحراف قياسي يصل إلى ٧،٩٩ ملليمتر .

وقد قام جت وسننج (Jit and Singh. 1966) بدراسة عظام الترقية للبالغين في الهند ووجد أن طول الترقية يمكن الاعتماد عليه لتحديد نوع الجنس بنسبة ٨٪ للرجال و ١٤٪ بالنسبة للنساء . كما لاحظ هذان الباحثان أن وزن عظام الترقية أكثر قيمة لتحديد نوع الجنس خاصة بالنسبة للرجال وليس في النساء . كما أن استدارة القصبة الوسطى لعظم الترقية هي السمة التشخيصية الوحيدة التي يعتمد عليها لتحديد نوع الجنس خاصة بالنسبة للرجال ولكن مرة أخرى ليس للنساء .

Humerus

يعتبر عظم العضد بشكل عام مثل غيره من العظام أكثر صلابة وسمكاً لدى الرجال . وقد قام دوايت (Dwight. 1904/05) بدراسة قطر المستعرض والعمودي لعظم العضد حيث وجد أن قطر العضد لدى الرجال أكبر مما هو بالنسبة للنساء .

القطر العمودي	القطر المستعرض
ذكور ٤٨,٧٦ ملليمتر	٤٤ ملليمتر
إناث ٤٢,٦٧ ملليمتر	٣٦,٩٨ ملليمتر

وقد ذكر ثيم (Theme. 1957) أن عرض اللقمة المزدوجة للعظم يصل إلى أقل من ٥٦,٦ ملليمتر وأكثر من ٦٣,٤ ملليمتر لكل من النساء والرجال على التوالي ، وقد أورد أوليفير (Oliver. 1969) البيانات التالية بالنسبة لعظم العضد غير مكتملة النمو وهي كما يلي :

أقصى طول	القطر العمودي للرأس مع الغضروف	القطر المستعرض للرأس مع الغضروف	الوزن	إناث	ذكور
٣٣٠ ملليمتر	٢٨٠ ملليمتر	٤٤ ملليمتر	١٣٦ جرام	٤٣ ملليمتر	٤٨ ملليمتر

ويشير أوليفير إلى أن البيانات السابقة تطبق على الأوربيين فقط.

عظم الزند Ulna

البيانات التالية وفقاً لما أورده أوليفير (1969).

أقصى طول	الطول الفسيولوجي	الوزن	إناث	ذكور
٢٣٠ ملليمتر	٢٤٠ ملليمتر	٤٠,٥ جرام	٢٦٥ ملليمتر	٢٣٠ ملليمتر

البيانات السابقة تطبق على الفرنسيين فقط.

عظم الكتف Scapula

البيانات التالية وفقاً لما أورده أوليفير وبنوي (Oliver and Pineau 1957).

ذكور	إناث	
٢٦,١	٨٦,٦	عرض تجويف الحفيرة الروحاء
٢٧,٩	١٤١,٤	طول العمود الفقري
١٤٤,٤	١٥٧,٥	الارتفاع تحت الفقري
عظم القص Sternum		

يبلغ جسم عظام القص إلى أكثر من ضعف طول قبضة القص أي الجزء العلوي منه عند الرجال ، بينما لدى النساء يصل إلى أقل من ضعف هذا الطول .

عظم الفخذ Femur

أورد بيرسون (Pearson. 1917-19) البيانات التالية لتحديد نوع الجنس بناءً على عظام الفخذ وفقاً للقياسات التالية (مقدرة بالملليمتر) :

ذكور	إناث	
٤٥,٥	٤١,٥	القطر العمودي
١٤٥,٠	١٠٦,٠	الطول المدور
٧٨,٠	٧٢,٠	عرض اللقمة المزدوجة للعظمة
٤٥٠,٠	٣٩٠,٠	الطول المائل

والقياسات السابقة أخذت في القرن السابع عشر من المقيمين في لندن حيث ، وينبغي تعديليها لتتناسب مع الأعمار الحالية حيث تميل القياسات الحديثة للمواطنين الأوروبيين إلى تزايد نسبة طول العظام عما كانت عليه . وقد أورد ثيم (1957) البيانات التالية عن عظم الفخذ بالنسبة للزنوج :

خطا قياس	انحراف قياس	المتوسط ملييم	عدد	الجنس	طول الفخذ
٢,٦٦	٢٨,٣٧	٤٧٧,٣٤	٩٨	ذكر	
٢,٦٠	٢٤,٥٥	٤٣٩,١٠	١٠٠	أنثى	
٠,٢٧٨	٢,٧٥	٤٧,١٧	٩٨	ذكر	قطر الرأس
٠,١٤٢	٢,١٢	٤١,٥٢	١٠٠	أنثى	

عظم القصبة Tibia

أورد أوليفير (١٩٦٩) البيانات التالية بالنسبة لعظم القصبة :

ذكور	إناث	أقصى الطول
٣٨٠,٠	٣٢٠,٠	ملييمتر
٢٢٤,٦	١٥٦	جرام

وهذه البيانات السابقة تتطابق على عظام القصبة بالنسبة للفرنسيين ، إلا أنها عندما تجف ويتربع منها الدسم ، ينخفض الوزن إلى ١١٦ ، ١٧٤ جرام على التوالي .

الفصل السادس

تقدير القامة

Stature Estimation

إن تقدير القامة من الهياكل العظمية قصوى في إعادة رسم صورة حقيقة للجماعات الإنسانية التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ وحتى في العصور التاريخية غير البعيدة. والتعرف على القامة له أهمية خاصة في حالات الجثث المتحللة التي يعثر عليها للتعرف على شخصية المتوفى من قبل الطب الشرعي وعالم الأثري بولوجيا الطبيعية وأيضاً في الديموغرافيا (الدراسات الإحصائية للسكان من حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج .. إلخ) والتغذية والنمو وعادات الأكل في الجماعات الإنسانية التي انقرضت منذ الأزمان القديمة.

وهناك العديد من الدراسات والبحوث هدفها إيجاد طرق علمية منظمة يمكن من خلالها تقدير القامة من الهيكل العظمي. وقد ركز معظم الباحثون على العظام الطويلة (مثل عظام الفخذ والساقي والعضد)، واستخدموها في معادلات رياضية مختلفة لتقدير القامة ككل (انظر Telkka, 1950; Pearson, 1892; Manouvrier, Fully, 1956). وفي إحدى الدراسات استخدم فولي (Woolley, 1956) كل العظام في تقدير القامة. وفي هذا الجزء سوف نقدم أفضل الطرق التي طورت، وشاع استعمالها ولاقت قبولاً من العاملين في هذا الحقل.

ويواجه الباحث أول مشكلاته حين يحاول تقدير القامة للأطفال وحتى سن البلوغ وذلك لأن عظامهم لم تكن قد التحمت بعد. وكما يبين الجدول

التالي فإن الباحث الأنثروبولوجي أوليفر (Oliver. 1969) استخدم الساق أو عظم الفخذ في تقديره للقامة من الهيكل العظمي (جدول ٧).

(جدول ٧)

الجدول يوضح طول القامة اعتماداً على طول عاصم الفخذ

عاصم الفخذ بالمليمتر	القامة بالستيمتر	عاصم الفخذ بالمليمتر	القامة بالستيمتر
80	50.	193	111.
85	55.	200	114.
90	58.5	210	116.
95	61.5	220	119.
100	64.5	230	122.
105	67.5	240	125.
110	70.	250	127.5
115	73.	260	130.25
120	76.5	270	133.25
125	79.	280	135.75
130	81.5	290	138.5
135	84.5	300	141.
140	87.	310	143.5
145	89.5	320	146.
150	93.	330	148.75
155	94.5	340	151.
160	96.75	350	153.75
165	99.25	360	156.
170	101.5	370	158.75
175	103.5	380	161.75
180	105.5	390	165.
185	107.5	400	170.
190	109.5		

*From G. Olivier, *Practical Anthropology*, 1969. Courtesy of Charles C Thomas, Publisher, Springfield, Illinois.

وبالنسبة لتقدير قامة الجنين فقد طور أوليفر وبنوي المعادلة التالية:

$$\text{طول الجنين بالستيمترات} = 1,8 \pm 0,32 \times \text{طول العضد} - 7,92$$

$$1,8 \pm 2,85 \times \text{طول الكعبة} =$$

$$1,59 \pm 1,07 \times \text{طول الزند} - 8,73 =$$

$$1,82 \pm 4,42 + 6,29 =$$

$$1,65 \pm 2,78 + 7,85 =$$

$$1,92 \pm 3,55 + 7,39 =$$

والأسلوب الأكثر شيوعاً لتقدير عمر البالغين في الولايات المتحدة هو استخدام المعادلة التي طورها تروتر وجليسون (Trotter and Gleser, 1952) على أكمل وجه وخاصة في السلالتين القوقازية والزنجية ولاستخدام هاتين المعادلتين ينبغي على الباحث أولاً أن يتعرف على سلالة و الجنس المتوفى ليطبق المعادلة الصحيحة . وبإضافة إلى معرفة السلالة والجنس يتوجب على الباحث أيضاً أن يعرف عمر المتوفى لإدخال عوامل التصحيح تحسيناً للتغيرات التي تطرأ على عظام المتوفى من فترة الشباب إلى فترة الكهولة (Trotter and Gleser 1951) والمعادلة مبنية كالتالي (جدول ٨).

(جدول ٨)

معادلة تقدير القامة قبل الوفاة بالستمير من العظام الطويلة للأمريكيين بين سن
الثامنة عشرة والثلاثين


Caucasian males			Negro males		
الخطأ التياسي			الخطأ التياسي		
3.08 Hum	+70.45	±4.05	3.26 Hum	+62.10	±4.43
3.78 Rad	+79.01	±4.32	3.42 Rad	+81.56	±4.30
3.70 Ulna	+74.05	±4.32	3.26 Ulna	+79.29	±4.42
2.38 Fem	+61.41	±3.27	2.11 Fem	+70.35	±3.94
2.52 Tib	+78.62	±3.37	2.10 Tib	+86.20	±3.78
2.68 Fib	+71.78	±3.29	2.19 Fib	+85.65	±4.08
1.30 (Fem + Tib)	+63.29	±2.99	1.15 (Fem + Tib)	+71.04	±3.53
Caucasian Females			Negro Females		
الخطأ التياسي			الخطأ التياسي		
3.36 Hum	+57.97	±4.45	3.08 Hum	+64.67	±4.25
4.74 Rad	+54.93	±4.24	2.75 Rad	+94.51	±5.05
4.27 Ulna	+57.76	±4.30	3.31 Ulna	+75.38	±4.83
2.47 Fem	+54.10	±3.72	2.28 Fem	+59.76	±3.41
2.90 Tib	+61.53	±3.66	2.45 Tib	+72.65	±3.70
2.93 Fib	+59.61	±3.57	2.49 Fib	+70.90	±3.80
1.39 (Fem + Tib)	+53.20	±3.55	1.26 (Fem + Tib)	+59.72	±3.28
Mongoloid Males			Mexican Males		
الخطأ التياسي			الخطأ التياسي		
2.68 Hum	+83.19	±4.25	2.92 Hum	+73.94	±4.24
3.54 Rad	+82.00	±4.60	3.55 Rad	+80.71	±4.04
3.48 Ulna	+77.45	±4.66	3.56 Ulna	+74.56	±4.05
2.15 Fem	+72.57	±3.80	2.44 Fem	+58.67	±2.99
2.39 Tib	+81.45	±3.27	2.36 Tib	+80.62	±3.73
2.40 Fib	+80.56	±3.24	2.50 Fib	+75.44	±3.52
1.22 (Fem + Tib)	+70.37	±3.24			

To estimate stature of older individuals subtract 0.06 (age - 30) cm.

To estimate cadaver stature, add 2.5 cm.

*From M. Trotter, Estimation of stature. In T.D. Stewart (ed.), *Personal Identification in Mass Disasters*, 1970. Courtesy of National Museum of Natural History, Washington.

وبالنسبة للعظام فيتوجب عمل القياسات عليها كما هو موضح في
الشكل . ٢٧



(شكل ٢٧)

نقاط القياس للعظام الطويلة وفقاً لتروتر وجليس

وفي عام ١٩٥٦ طور فولي (Fulley. 1956) معادلة جديدة لتقدير معامل الطول في حالة الهياكل العظمية الكاملة . وهذه المعادلة تعطي أقل درجة من الانحراف القياسي Standard Deviation ولتطبيق معادلة فولي بنجاح فإنه ليس من الضروري معرفة جنس أو سلالة الهيكل العظمي بعكس معادلات تروتر وجليس وهنوفيز التي تتطلب معرفة الجنس بالسلالة للحصول على نتائج صحيحة ودقيقة . وتتضمن طريقة فولي الحصول على قياس جميع العظام المستخدمة في معامل الطول إضافة إلى زيادة معينة لتعويض النسخ الناعم المفقود . ومن الممكن استخدام هذه المعادلة في حالة وجود هيكل

عظمي كامل أو تقصه فقط بعض فقرات العمود الفقري. وحتى لا تقع في خطأ لا تستخدم هذه المعادلة إذا زادت نسبة الفقرات المفقودة عن ٢٠٪ من العمود الفقري الكامل. بعد ذلك يجبأخذ القياسات التالية:

Basion - Bregma Height	١- ارتفاع القامة
Total Vertebral Height	٢- طول العمود الفقري كاملاً
First Sacrol Segment Height	٣- طول الفقرة الأولى من فقرات العجز
Total Femur Length	٤- الطول الكامل لعظمة الفخذ
Total Tibial Length	٥- الطول الكامل للشظية
Tarstal Height	٦- طول عظام الرسغ (في القدم)

وبعد الحصول على القياسات المذكورة أعلاه، ضعها في المعادلة الموضحة أدناه. طول القامة = ٠,٩٨ + (طول الهيكل العظمي الكامل) + ١٤,٦٣ + ٢,٠٥ سم.

(جدول ٩)

تقدير طول القامة عند المغوليين من العظام الطويلة.

Males:

$$\begin{aligned} \text{All bones: } \text{Stature} &= 2.52\text{rad} - 0.07\text{ulna} + 0.41\text{hum} + 2.98\text{fib} - 0.49\text{tib} + \\ &\quad 0.68\text{fem} + 95.113 \pm 2.614 \\ \text{Femur: } \text{Stature} &= 2.26\text{fem} + 66.370 \pm 3.417 \\ \text{Tibia: } \text{Stature} &= 1.96\text{tib} + 93.752 \pm 2.812 \end{aligned}$$

Females:

$$\begin{aligned} \text{All bones}: \text{Stature} &= 8.66\text{rad} - 7.37\text{ulna} + 1.25\text{tib} - 0.93\text{fem} + \\ &\quad 96.674 \pm 2.812 \\ \text{Femur: } \text{Stature} &= 2.59\text{fem} + 49.742 \pm 3.816 \\ \text{Tibia: } \text{Stature} &= 2.72\text{tib} + 63.781 \pm 3.513 \end{aligned}$$

¹Subtract 2.5 cm to obtain the stature while alive.

²In this case, the humerus contributes practically nothing, and therefore is omitted.

³From S. Genovés, Proportionality of the long bones, *Am J Phys Anthropol*, 26:67-77, 1967.

وبالنسبة لتقدير طول القامة عند المغوليين فقد تبين عدم صلاحيتها

للتنوع الكبير داخل السلالة مثل اليابانيين والفلبينيين وهنود أمريكا الحمر (Genoves 1967). ولكن هناك معادلة أخرى يقدمها هنوفيز (Genoves, 1966, 1967) لتقدير معامل الطول عند الهنود الحمر من سكان أمريكا حيث إن الغالبية العظمى (٩٠٪ أو أكثر) من الهياكل العظمية الموجودة في المتاحف والمعاهد والمؤسسات العلمية الأمريكية هي لهنود أمريكا الحمر الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ قبل اكتشاف الأمريكتين عام ١٤٩٢. وقد وجد هنوفيز أن المعادلة تتطبق بدقة أكثر حين استخدم واحدة فقط من العظام الطويلة وخاصة عظام الفخذ والساقي في تقدير معامل الطول بالنسبة للسلالة المغولية وخاصة الشطوية من عظام الساق، ونورد هنا معادلة هذا الباحث في الجدول التالي:

الفصل التاسع

القياسات المترية

(الأثربومترى)

Anthropometry

حتى وقت قريب كانت القياسات المترية من أهم الأدوات التي يستخدمها عالم الأنثروبولوجيا الطبيعية في دراسة المجتمعات الإنسانية القديمة والحديثة. والقياسات المترية متغيرة ومتباينة اعتماداً على حجم الجسم والأبعاد التي يراد قياسها. والوراثة لهذه الملامح أو الصفات تعتمد على العديد من الجينات وتتأثر البيئة الطبيعية عليها (Hanna, 1962; Boyd and Li, 1963). ولهذا فإن استخدامها في دراسة العلاقات البيولوجية بين الجماعات الإنسانية المختلفة محكمة بعدها عوامل، ومن هذه العوامل: ١ - الاختلاف في التغير الظاهري للصفة ، ٢ - عدم معرفة نوعية العوامل الوراثية ، ٣ - مرونتها . ٤ - تغير مظهر الصفة مع التقدم في العمر. ٥ - عوامل بيئية أخرى كال營غذية والمناخ تؤثر في هذه الصفات خلال حياة الفرد. ومع هذا فقد قام الباحثون في هذا المجال من الدراسة بجمع آلاف من القياسات على جماعات إنسانية مختلفة خاصة الجماعات المنقرضة منها. هذا لأن العظام توفر المعلومات الوحيدة التي يستطيع الباحث الأثربولوجي استخدامها في التعرف على شكل وحجم وبنية الجماعات الإنسانية التي عاشت في عصور ما قبل التاريخ والتعرف على نوعية العلاقات البيولوجية التي كانت قائمة آنذاك . وفي هذا الجزء من الكتاب نقدم بعض البيانات التي تساعد الطالب في التعرف على القياسات المترية وطرق استخدامها للحصول على معلومات ربما تكون ذات نفع في حالة عدم توفر معلومات أخرى عن البقايا العظمية للجماعات الإنسانية القديمة .

إن معظم التقنية التي استخدمت في الأنثروبولوجيا الطبيعية قد استعيرت من علم التشريح والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم الطب وعلم الأمراض . إلا أن هناك علمين استثنائيين قد ساهمت فيما الأنثروبولوجيا وهما : الأنثروبومتريا ، وعلم المستحضرات الإحيائية التي تأخذ الصفات المميزة للأحياء والأموات والتي من المتذر قياسها وتتضمن تلك الصفات لون الشعر والجلد والعيون والأف ، وغيرها من الصفات . أما الأنثروبومترى فتقسم إلى ثلاثة فئات وهي : سوماتومترى - قياس الجسم في الأحياء والجثث ، وأوستيومترى - قياس الهيكل العظمي وأجزائه ، وكرينيومترى - قياس الجمجمة .

المصطلحات

و قبل أن نواصل مناقشتنا حول الأنثروبومتريا ، فإن من المفيد لنا أن نطلع على المصطلحات المتنوعة والرموز في نظام المقاييس التي تستخدم في الأنثروبومترى .

- جمجمة : هيكل قحف الدماغ والوجه والفك .
- قحف الجمجمة : الجمجمة بدون الجزء الوجهي والفك بل فقط قحف الدماغ .
- القلنسوة : قبة الجمجمة ، أو قمة الدماغ .

معالم الجمجمة

Cranial Marks

- **البجم Asterion** : نقطة ملتقي الدرز أي خط الاتصال بين عظام الجمجمة اللامي والجداري الخشائي والقذالي الخشائي .
- **الباسيون Basion** : النقطة المتوسطة للحافة الأمامية للثقب الأعظم ، (نقطة القاعدة) .

- **اليافوخ Bregma** : نقطة على السطح العلوي عند التقائه التدرز الإكليلي السهمي .
- **النقطة الدمعية Dacryon** : نقطة على التدرز الأفقي داخل محجر العين عند التقائه بالتدرز الرأسي إلى الداخل من نقطة القياس .
- **جוניون Gonion** : نقطة رأس زاوية الفك السفلي .
- **القمودحة Inion** : الحدية القذالية الوحشية أو نقطة القفا ، وهي أعلى نقطة على الحدية المؤخرة الظاهرة .
- **البجة أو مفرق الحاجبين Glabella** : النقطة الظاهرة بين عظام الحاجبين مباشرة فوق التقائه الدرز الأنفي مع الدرز الجبهي .
- **اللامية Lambda** : ملتقى الدرز السهمي بالدرز اللامي .
- **الأفيري Opisthion** : النقطة الخلفية أو النقطة المتوسطة على حافة الثقب الأعظم السفلية .
- **قطب الفك أو نقطة الذقن Gnathion** : أدنى نقطة في الفك السفلي (الذقن) .
- **نقطة الأنف Nasion** : نقطة التقائه الدرز الأنفي مع الدرز الجبهي .
- **الحفرة، النقرة Obelion** : نقطة على الدرز السهمي على خط يربط الثقبين الجداريين .
- **نقطة الحاجب Ophryon** : نقطة الوسط للقطر المستعرض الأصغر للجبهة تقادس من الخط الصدغي الأيمن إلى الخط الصدغي الأيسر .
- **نقطة الحجاج Orbitalia** : أسفل نقطة على حافة حجر العين .
- **يافوخ الجنيح Pterion** : منطقة على جانب قبة الجمجمة حيث يتقابل العظم الجبهي والجداري والصدغي والإسفيني .
- **المخرم، نقطة النخرة Rhinion** : أعلى نقطة في فتحة الأنف من أعلى .

- قبة الرأس **Vertex** : قمة أو أعلى الوسط السهمي لمركز القنطرة الخارجي .

قياسات الجمجمة Cranial Measurements

- ارتفاع الجمجمة **Skull Height** : من النقطة المتوسطة للحافة الأمامية للثقب الأعظم إلى نقطة التقاء الدرز الإكليلي والدرز السهمي .

- محجر العين **Biorbital Breadth** : من وسط الحافة الجانبي لممحجر العين إلى وسط الحافة المتوسطة .

- عرض الثقب الكبير **Foramen Magnum Breadth** : المسافة المستعرضة لحافتي الثقب من جانب إلى آخر .

- عرض جذر الأنف السفلي **Lowest Nasal Breadth** : المسافة بين نقطة نهاية فتحة العظم الأنفي يسار ويمين الجانبي .

- عرض الفك العلوي **Maxilla Breadth** : أقصى عرض في سطح الفم بين прرسين الثانيين ويؤخذ القياس من الجدار الخارجي للأسنان .

- طول الجمجمة **Skull Length** : أقصى طول للجمجمة بين مؤخرة الرأس ونقطة مفرق الحاجبين .

- أقصى عرض للجمجمة **Maximum Skull Breadth** : المسافة بين أبعد نقطتين في السطح العلوي للجمجمة .

- أدنى عرض للجمجمة **Minium Skull Breadth** : أدنى مسافة بين عظام الصدغ على عظام الجبهة .

- عرض الأنف **Nasal Breadth** : أكبر مسافة بين نقطة تقاطع الدرز الأنفي في يمينه ويساره .

- إرتفاع الأنف **Nasal Height** : من نقطة التقاء الدرز الجبهي مع الدرز الأنفي إلى أسفل نتوء العظم الأنفي على حافة فتحة العظم الأنفي .

- طول حجر العين **Orbital Height** : أكبر مسافة بين أعلى وأسفل حافة حجر العين .
- عرض الحنك **Palatal Breadth** : المسافة بين حافة السنخ الداخلي بين الضرسین الثانیین من الداخل .
- ارتفاع الحنك **Palatal Length** : نقطة الوسط للخط المستقيم للحافة السنخية الخلفية إلى وسط القواطع المركزية .
- طول الوجه **Facial Height** : المسافة من نقطة الأنف (Nasion) إلى أدنى نقطة في الفك الأسفل .

أ - معاملات الرأس

Cranial Indices

<u>أكبر عرض للجمجمة × ١٠٠</u>	<u>أكبر طول للجمجمة</u>	١ - المعامل الججمجي :
٧٤,٩ ×		الجمجمة طويلة Dolichocranic
٧٩,٩ - ٧٥,٠		الجمجمة متوسطة Mesocranic
٨٤,٩ - ٨٠,٠		الجمجمة عريضة Brachycranic
٨٩,٩ - ٨٥,٠		الجمجمة عريضة جداً Hyperbrachycranic
<u>ارتفاع الججمة السمعي × ١٠٠</u>	<u>أكبر طول للجمجمة</u>	٢ - معامل طول وارتفاع الججمة :
٦٩,٩ ×		الجمجمة منخفضة Chaaecranie
٧٤,٩ - ٧٠,٠		الجمجمة متوسطة Orthocranic
٧٥,٠ ×		الجمجمة مرتفعة Hypsicranic
<u>ارتفاع الججمة السمعي × ١٠٠</u>	<u>أكبر عرض للجمجمة</u>	٣ - معامل عرض وارتفاع الججمة :
٩١,٩ ×		الجمجمة منخفضة Tapeinocranic
٩٧,٩ - ٩٢,٠		الجمجمة متوسطة Metriocranic
٩٨,٠ ×		الجمجمة مرتفعة Aeocranic
<u>الارتفاع الكلي للوجه × ١٠٠</u>	<u>عرض الوجه</u>	٤ - معامل الوجه الكلي :
٧٩,٩ ×		الوجه عريض جداً Hypereury Prosopic

٨٤,٩ - ٨٠,٠	الوجه عريض Euryprosopic
٨٩,٩ - ٨٥,٠	الوجه متوسط Meso Prosopic
٩٤,٩ - ٩٠,٠	الوجه طويل Leptoprosopic
٧ - ٩٥,٠	الوجه طويل جداً Hyperlepto Prosopic

ارتفاع الوجه العلوي × ١٠٠
عرض الوجه

٥- معامل الوجه العلوي :

٤٤,٩ - ×	الوجه عريض جداً Hypereur yene
٤٩,٩ - ٨٠,٠	الوجه عريض Euryene
٥٤,٩ - ٥٠,٠	الوجه متوسط Mesene
٥٤,٩ - ٥٥,٠	الوجه طويل Leptene
٧ - ٦٠	الوجه طويل جداً Hyperleptene

أكبر عرض للأنف × ١٠٠
ارتفاع الأنف

٦- معامل الأنف العام

٤٦,٩ - ×	الأنف ضيق Leptorrhine
٥٠,٩ - ٤٧,٠	الأنف متوسطة Mesorrhine
٥٧,٩ - ٥١,٠	الأنف عريضة Chamaerrhine
٧ - ٥٨,٠	الأنف عريضة جداً Hyperchamaerrhine

أكبر عرض لمحجر العين × ١٠٠
ارتفاع محجر العين

٧- معامل حجر العين

٧٥,٩ - ×	العيون واسعة Chamaeconch
٨٤,٩ - ٧٦,٠	العيون متوسطة Mesoconch
٧ - ٨٥,٠	العيون ضيقة Hypsiconch

عرض الحنك (من الداخل) × ١٠٠
طول الحنك

٨- معامل الحنك العام

٧٩,٩ - ×	الحنك ضيق Leptostaphyline
٨٤,٩ - ٨٠,٠	الحنك متوسط Mesostaphyline

$\frac{\text{عرض الفك (من الخارج)}}{\text{طول الفك}} \times 100$	$\times - 85,0$	الحنك عريض Brachystaphyline
		٩ - معامل الفك السنخي
	$\times - 109,9$	الفك طويل Dolichouranic
	$114,9 - 110,0$	الفك متوسط Mesuranic
	$\times - 115,0$	الفك عريض Brachyuranic

ب - معاملات الأطراف . Relative Length of Upper Limb

١ - معامل طول الأطراف العليا :

$$\frac{\text{طول الطرف العلوي}}{\text{ارتفاع القامة الكلية}} \times 100 =$$

وتصنف الأرقام الناتجة طبقاً للتوزيع التالي :

Brachybrachion	أطراف عليا قصيرة	$\times - 44,9$
Metriobrachion	أطراف عليا متوسطة	$46,9 - 45$
Macrobrachion	أطراف عليا طويلة	$\times - 47$

٢ - معامل طول الأطراف السفلية :

Relative Length of Lower Limb Index (Shelic Index):

$$\frac{\text{طول الطرف السفلي}}{\text{ارتفاع القامة الكلية}} \times 100 =$$

وتصنف الأرقام الناتجة طبقاً للتوزيع التالي :

Brachyskelic	أطراف سفلی قصیرة	٥٤,٩ - X
Metrioskelic	أطراف سفلی متوسطة	٥٦,٩ - ٥٥
Macroskelic	أطراف سفلی طویلة	X - ٥٧

٣ - معامل الساق Relative Leg Index

$$\frac{\text{طول القصبة} \times 100}{\text{ارتفاع القامة الكلي}} =$$

وتصنف الأرقام الناتجة طبقاً للتوزيع التالي :

Brachycnemic	ساق قصیرة	٢١,٩ - X
Netriocromic	ساق متوسطة	٢٣,٩ - ٢٢
Macrocnemic	ساق طویلة	X - ٢٤

- المعامل بين طول الساعد وطول العضد Branchiol Index

وتوزع الأرقام الناتجة حسب التصنيف التالي :

Brachypichus	ساعد قصیر	٧٧,٩ - X
Metriopichors	ساعد متوسط	٨٢,٩ - ٧٨
Mecropichus	ساعد طویل	X - ٨٣

٥ - معامل عرض القدم Breadth Foot Index

$$\frac{\text{عرض القدم} \times 100}{\text{طول القدم}} =$$

وتوزيع الأرقام المستخرجة طبقاً للتصنيف التالي :

Short	قدم قصيرة	٣٧,٩ - X
Medium	قدم متوسطة	٤٠,٩ - ٣٨
Long	قدم طويلة	X - ٤٠

(*) من كتاب الأنثروبومتريا للدكتور فاروق شوقي، ١٩٨١ ص، ٨٨ - ٨٩، دار النهضة العربية، القاهرة.

الفصل الثامن

التشوهات الخلقية والشذوذ في تكوين العظام

Congenital Variations, Anomalies and Deformities

إن الإمام بالاختلافات الطبيعية وتشوهات الهيكل العظمي أمر مهم لغرض تمييز هذه الحالات عن تلك الناتجة عن الأعراض أو المظاهر المرضية. وفي هذا الفصل ستنظر إلى التشوهات سهلة التشخيص ومعظم هذه الأمراض خلقية أو تطورية في طبيعتها، والعيوب الولادية هي تلك التي تكون موجودة منذ الولادة، وقد تكون هذه العيوب موروثة أو مكتسبة في حين تعرض الجنين للإصابة ساعة الولادة. وبشكل عام فإن معرفتنا ضئيلة بالتشوهات الخلقية في الجماعات الإنسانية عبر التاريخ. والمهم في هذه الدراسات هو عدم وجود حد فاصل بين اختلافات الهيكل العظمي الطبيعية والاختلافات الولادية.

وستتحدث في هذا الفصل عن الأنواع المختلفة من التشوهات القحفية (الجمجمية) التي ينتج عنها أحجام وأشكال غير طبيعية بسبب الانغلاق المبكر للدروز (تعظم التداريز الباكر)، كما ستحدث عن التشوهات غير القحفية بسبب النمو أو المشكلات التطورية في المراحل الجنينية وما بعد الولادة.

تعظم التداريز المبكر : Craniostenosis

وهو تشه نادر، حيث تنغلق دروز الججمة مبكراً مسببة ضغطاً على محتويات القحف وتوقف نموها. والحالة معروفة منذ عدة قرون وقد سميت بهذا الاسم من قبل فرشاو (Virchow, 1851)، وتحت هذا المسمى تدرج أنواع مختلفة من التشوهات الناتجة عن الانغلاق الدرزي المبكر موضعياً وشاملاً.

بالإضافة لهذا الاسم فهناك أسماء عديدة تطلق على الحالة ذاتها.
والتصنيف التالي اقترحه سيمونز وبايرن :
(Simmons and Peyron. 1947).

أ - التعظم المبكر الكامل لدروز القحف :

١ - تسم الرأس بدون تشوهات وجهية .

٢ - سوء التعظم القحفى الوجهى .

٣ - تسم الرأس مع ارتفاع الأصابع .

٤ - تسم الرأس المتأخر (يبدأ بعد الولادة) .

ب - التعظم المبكر غير الكامل لدروز القحف :

١ - الرأس الزورقي .

٢ - قصر الرأس .

٣ - الرأس الموارب .

٤ - مختلط.

ج - التعظم المتأخر (طبيعي) لدروز القحف ويبدأ بعد البلوغ ولذلك لا تظهر تشوهات أو أعراض شاذة .

وكل حالات التعظم الباكر تنتج أشكالاً غير طبيعية للجمجمة . ويعتمد مقدار ذلك على عدد الدروز المتأثرة وعلى ترتيب انغلاقها وعلى العمر الذي يحدث فيه الانغلاق وعلى كيفية حدوث هذا الانغلاق . والدرجات الكبيرة من التشوهات تحصل عند حدوث الانغلاق في وقت مبكر . وإذا انغلق الدرز السهمي فسيتخرج رأساً طويلاً وعند انغلاق الدروز الإكليلية فإن الرأس تصبح مدوراً ، ولكن توقف النمو الناتج عن الانغلاق يعوض بنمو أكثر في الاتجاهات الأخرى مما ينتج عنه أشكال غريبة للرأس . ومثال على ذلك أنه عند انغلاق الدروز في جهة واحدة من الججمجة فهذا يسبب عدم تماثل في جهتي الرأس ، أما عند انغلاق كل الدروز فيصبح شكل الججمجة أشبه بالبرج بسبب الضغط إلى الأعلى على اليافوخ الأمامي المفتوح من قبل الدماغ أثناء

نموه . وقد فحص بولك (Bolk. 1914) جمجمة بشرية تراوحت أعمار أصحابها بين ٣ - ٢٠ سنة ووجد انغلاقاً في واحد أو أكثر من الدروز في ٣٤٣ حالة .

إن نمو انغلاق الدروز يعتمد مباشرة على نمو الدماغ ، ومعدل نمو الجمجمة موازٍ لمعدل نمو الدماغ . وخلال السنوات الثلاث الأولى من العمر ينمو الدماغ حوالي ٨٪ من النمو الكامل له ، وبعد ٣ سنوات من العمر تكون هناك زيادة طفيفة فقط في النمو، وأي زيادة في حجم الجمجمة يسبب عادةً زيادة في سمك عظام الجمجمة ونمو الأوعية الإضافية وعظام الوجه . وفي العادة فإن قاعدة الدماغ لا تتأثر بالتعظم الباكير (Rieping. 1919) ، ولكن موس (Moss. 1957) يرى العكس . وقد ظهرت نظريات مختلفة لتفسير طبيعة هذا العيب والأسباب المحتملة لهذه الحالة . فيرشوف (1851) يذكر على سبيل المثال أن النمو يتوقف عمودياً على الدرز المغلق ويزيد في الاتجاهات الأخرى . كما يعتقد فيرشوف أنه بما يكون للالتهاب السحائي سبباً للانغلاق المبكر . أما توما (Thoma. 1907) فيفترض أن الضغط هو سبب الانغلاق في الفترة الجنينية الأولى ولكن بارك وباورز (Park and Powers. 1920) يقران بأن حواف العظام القحفية مفصولة بنسيج حشوي . أما جريج (Greig. 1920) فقد عرف التعظم الباكير بأنه اندماج العظام المجاورة مما يسبب انعدام الحركة والنمو . أما سير وسيدني (Scar and Sydney. 1937) فاقروا بأن التعظم الباكير ما هو إلا حثل للعظام الغشائية .

والتفسير المعقول للتعظم الباكير يأتي من مورسيلي (Morselli. 1875) الذي يذكر بأن اقتراب المراكز التعظمية للعظام المجاورة هو السبب . أما جibilin وألي (Giblin and Alley 1940) فقد أثبتا فيتجار بهما على الحيوانات بأن التعظم يتأثر بحركة العظام . وقد عدد موس (Moss. 1950) أسباباً للتعظم المبكر منها الالتهاب السحائي والكساح والإصابة الولادية وزيادة ونقصان الأوعية الدموية واضطرابات النمو بين الدماغ وسقف الرأس . وباستعمال تحليل شجرة النسب أثبت عدة باحثين أن التغظم

الباكير موروث . واعتبر بينيت (Bennet 1967) أن التعظم صفة صورية ثانوية بعض النظر عن كونه طبيعياً أو غير ذلك .

الرأس الزورقي (تعظم الدرز السهمي) :

Scaphocephaly (Sagittal Synostosis):

في هذه الحالة تكون الجمجمة طويلة وضيقة بسبب الانغلاق المبكر للدرز السهمي ، ومن الممكن أيضاً حدوث اتساع وارتفاع في الجبهة وتجسر وسطي ، ويتميز هذا النوع من التعظم بزيادة النمو في اتجاه أمامي خلفي بينما عرض الجمجمة يكون أصغر . والسبة الرأسية تكون عادة أقل من سبعين . أما قاعدة الجمجمة والفك العلوي فيكونان ضيقين وتكون العظام الجدارية مسطحة . وكما ذكر برنات وبرنات (١٩٧٣) فإن الرأس الزورقي لا يكون معه أي شكل آخر من العيوب الرأسية أو في بقية الهيكل العظمي . ويبدو أنه يورث على شكل صفة متغلبة مع ظهور مختلف .

الرأس البرجي : Turricephaly

وهو أكثر الحالات حدوثاً في التعظم الدرزى الباكير ، وفي هذه الحالة يزداد ارتفاع الرأس وفي بعض الأحيان يزداد العرض أيضاً . وبسبب التعظم الباكير للدروز المستعرضة فإن المنطقة الجبهية أو الجدارية قد تتضخم بدرجة كبيرة ، وهناك أنواع عديدة من الرأس البرجي تسمى الرأس وصغره وسيتم شرحها بالتفصيل .

تسم الرأس : Oxycephaly

وهو ينتج عن انغلاق مبكر للدروز الإكليلية والسهمية ، الذي يمنع التمدد الطبيعي في الاتجاهات المستعرضة والأمامية الخلفية . وفي حالات تسم الرأس لا بالضرورة ارتفاع الأصابع ولكنها قد تشاهد في بعض الحالات كما يوجد وصفها أبرت في عام ١٩٠٧ . ويختلف شكل الرأس تبعاً للدرجة انغلقات الدروز . وبشكل عام يكون الرأس أقصر من الأمام إلى الخلف ويكون أعلى

ما يكون عند الهامة كما هو الحال في البرج . يكون التجويف الحجري سطحياً مما يؤدي إلى جحوض العيني ، وعدم تناست عظام الفكين وضيق سقف الحلق وارتفاعه ونتوء ضعيف لعظام الفك الأعلى والعظم الوجني وأنف يشبه الببغاء . ولا يحصل تسم الرأس في كل الأعمار ، وعادة يحصل في فترة نمو الدماغ . وقد قسم جريج (Greig, 1926) تسم الرأس إلى ثلاثة أنواع :

أ - تسم الرأس الحقيقي ، ويكون عادةً ولادياً مع وجود تشوهات أخرى كارتفاق الأصابع .

ب - تسم الرأس المتأخر ، وقد يظهر في أي وقت عند مرحلة الطفولة ولا تصاحبه تشوهات .

ج - تسم الرأس الكاذب ، وهو عبارة عن تعظم درزي محلّي وليس ولادياً وعادة ما يكون له سبب محدد وقد ذكر كوهين (1945) أن التعظم في النوع الكاذب محصور بدرز أو دروز قليلة .

وفي تسم الرأس الحقيقي فإن قمة الرأس تكون عند الهامة ، بينما في التسم الكاذب فإن قمة الرأس قد تكون في أمكنة أخرى تكون عادةً في القسم الخلفي من الجمجمة . وحتى الآن لم يتوصل الباحثون إلى طريقة محددة لتوريث هذه الصفة . وقد ذكر بروثويل (Brothwell, 1972) أن هناك نمواً غير طبيعي في الدرز الإكليلي ولكن بقية الدروز قد تكون مصابة أيضاً . والنمو الطبيعي من الأمام إلى الخلف يمنع بسبب التعظم المبكر للدرز الإكليلي مما يؤدي إلى نمو تعويضي إلى الأعلى .

صغر الرأس : Microcephaly (Small Headedness)

وهو يعني عدم نمو جزئي للدماغ مصحوباً بعدم انتظام سifik عظام الرأس مما يؤدي إلى جمجمة جوبية ، وقد صنف شولر (Shuller, 1918) صغر الرأس كالآتي :-

- ضالة التطور الولادى للدماغ والذى يزن عادةً ربع الوزن العادى -

وتوقف تطور الأنسجة الدماغية بسبب مرض أولي في الدماغ. وقد عرف مارتن (Martin, 1970) الحالة على أن: محيط الرأس فيها يكون أقل من المتوسط باثنين أو ثلاثة انحرافات قياسية نسبة إلى العمر والجنس، وينتتج صغر الرأس من خلال تطور في الدماغ من الممكن تشخيصه عند الولادة أو ربما لا يلاحظ إلا فيما بعد. ويذكر برشفيلد و وايات (Brushfield and Wyatt, 1926) خصائص الحالة على أنها: تراجع كبير في العظام الجبهية والجدارية وتسطح القحف وأنف كبير بارز وذقن متراجع وسعة الجوف القحفى أقل من 1000 مم³ ، وكل قياسات الرأس تكون أقل من الطبيعي. وعادةً ما يكون عظم الرأس سميك وانغلاق مبكر للبابونج وكل الدروز، ووجه كبير مقارنة بالرأس وكفان وقدمان كبيران. وكل أصحاب صغر الرأس تكون لديهم درجة من التخلف العقلي ، قد تكون ضئيلة أو شديدة ، كما أن قابليتهم البدنية أقل من الطبيعي وكذلك يكونون معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالأمراض والالتهابات .

وقد أجريت بحوث كثيرة لتفسير سبب حدوث صغر الرأس حيث يعتقد زابرت (Zappert, 1926) أنها نتيجة لتأثير الإشعاع على الجنين أثناء الحمل وفايروسات الحصبة الألمانية والهربس والحمى المضخمة للخلايا . وقد أرجع ووتني (Whitney, 1932) سبب الحالة إلى توقف التطور الحاصل عند الشهر الرابع أو الخامس من العمل وإن الأسباب الوراثية بدون شك تلعب دوراً ، حيث ثبت هذا بدراسة عدة حالات في عوائل متعددة . والحالات الوراثية لصغر الرأس تشمل التوريث المتختلي وبعضاً كان بسبب تشوهات الصبغيات وخاصة الصبغيات رقم 5 ورقم 18 . وهذا النوع لا يصاحبه تشوهات أخرى ما عدا التخلف العقلي رغم أن بعض صغار الرؤوس كانوا طبيعيين من هذه الناحية أيضاً . وقد لاحظ دانييل (Daniel, 1971) وجود تشوهات صبغية في ثلاثة أطفال صغار الرؤوس فاعتتقد أن صغار الرؤوس لديهم تشوهات خلوية وحيوية أكثر من غيرهم .

الرأس المنحرف أو الوارب Plagiocephaly (Lop-Sided Head)

ويتتج عن تعظم التداريز الباكر في جهة واحدة ويكون الدرز الصدغي الجداري أكثرها عرضة للتعظم حيث تبدو الججمحة غير متساوية النصفين . كما أن سوء عمل المفصل الصدغي الفكي الحاصل خلال فترة الطفولة قد يؤدي إلى نتيجة مماثلة .

وفي جنوب غرب أمريكا تنتج الحالة بسبب السرير الذي يكون على شكل لوح يوضع فيه الطفل . ولكن في هذه الحالة بالطبع لا يوجد دليل على تعظم مبكر فالسبب الحقيقي غير معروف ، وربما كان السبب هو اختلاف معدل النمو في عظام الرأس المختلفة .

انعدام الرأس : Anencephaly

وهذه حالة ولادية مميتة ، يكون الدماغ فيها عديم الشكل وقمة الرأس غير موجودة . وحوالي ثلاثة أربع الحالات تموت عند الولادة وبافي الحالات تموت خلال أسبوع . وتتراوح نسبة وجود الحالات بين ٥،٢٩ - ٥،٩٣ لكل ١٠٠٠ ولادة . وتكون النسبة منخفضة في الزنوج الأميركيان والأفارقة وعند الأسيويين ما عدا الهنود السيخ .

وتحدث هذه الحالة عند القوقازيين ٦ مرات أكثر منها عند الزنوج وهناك نسبة حدوث عالية عند الإيرلنديين .

النقب (إزالة عظيمات من الججمحة) Trehphining Or Trepanning

طبقاً لبروثول (Brothwell, 1972) فقد عرف النقب منذ زمن بعيد في أوروبا ومنطقة الباسيفيك وجنوب أمريكا وشمال أمريكا وإفريقيا وأسيا . وفي بعض مناطق العالم ما زال النقب يتم طبقاً للوسائل البدائية على يد الحكماء والأطباء الشعبيين . ويعتقد مودي (Moodie, 1923) بأن النقب الأوروبي الأولى «الابتدائي» موثق منذ الأحقب الرمنية السابقة . أما رفر (Ruffer, 1919 - 1918) فيوضح أن عمليات النقب كانت تتم في الأحقب الوسطى والأحقب الحديثة . وقد وصف الباحثون طرقاً مختلفة لعمليات النقب .

ويعتقد برووكا (Broca, 1876) أن النقب كان يتم لإزالة آلام الأمراض داخل الدماغ. أما مودي (Moodie, 1923) وستيوارت (Stewart, 1958) وروسو وبولوجا (Russo and Bologa, 1961) فيرون أن الأغلبية العظمى من العمليات كانت تتم كجراحات علاجية إما لإصلاح الكسور في الجمجمة وإما لإزالة الصداع.

أما السبب في إجراء هذا النوع من العمليات لجثث الأشخاص (أي بعد الوفاة) فهو الحصول على قطع عظمية مستديرة من جمجمة الإنسان لاستخدامها في الطقوس الدينية - العلاجية المختلفة (Brothwell, 1972). وهذا النوع من النقب أخذ به في أوروبا في عصور ما قبل التاريخ وما زالت تمارس في إفريقيا (Oakley, Brooke, Akester, and Brothwell, 1969) حيث إن القطع العظمية مثقوبة وملمعة من أجل اللبس كحلقان وعقود.

ويصف الباحثون في هذا المجال من الدراسات الأنثروبولوجية عدة طرق وصفت لإنجاز هذه العملية ومثال ذلك :

١ - السحق أو الكشط، حيث يتم فيها سحق العظام تدريجياً . Scraping

٢ - عمل شفوق ملتوية بواسطة أداة حادة حتى يصبح العظم بين الشفين هش ويمكن إزالته - Grooving .

٣ - القطع أو الثقب حيث يتم قطع العظم ما بين فتحتين دائرتين على عظام الجمجمة . Boring and Cutting

٤ - تقاطع الشفوق المستقيمة عند زوايا حادة والقطعة العظمية بينهما . Straight Incision

وأفضل مكان لإجراء هذا النوع من العمليات هو عظمة الجبهة الأمامية وبعد ذلك العظام الجانبي للجمجمة وفي بعض الأحيان تكون مؤخرة الجمجمة. وعدد الثقوب متغير، فهناك سبع فتحات كانت قد الشمت حسب ما

ورد في أحد التقارير (Oakley. 1059). وربما يحدث هناك بعض الأخطاء في تشخيص بعض الحالات مثل الفتحات التي تتم أثناء عمليات الحفر والضغط المتواصل لآلية حادة ، وجروح أو كسور نتيجة حجارة سقطت على الجمجمة من مرتفع وترسب مواد جديدة على الجمجمة وفي حالة أمراض ما قبل الوفاة مثل حالات الإصابة بزهري الجمجمة ، والالتهابات والتخلخلات . (Brothwell. 1972)

ال العمود الفقري The Vertebral Column

أ - السنستة المشقوقة Spina Bifida

إن السنستة المشقوقة من عظام الفقرة تعبر عن نمو غير طبيعي أو تشوّه في فقرات العمود الفقري ينبع عن اندماج (تراكم) غير مكتمل في القوس العصبي العلوي . ويستخدمه ديتريش (Dittrich. 1938) للدلالة على خلل خلقي في عظام الفقرات العجزية . والشكل المتتطور (المتقدم) للسنستة المشقوقة يتميز بغياب السويقات والصفائح (العظمية) ويعرف بانشقاق السياء . والسنستة المشقوقة عبارة عن خلل في النمو يعود إلى فشل اندماج الجدار الخلفي للقناة العصبية الابتدائية بالأويم الظاهري . وبكثر شيوخ هذه الحالة في الفقرة العظمية الخامسة والفقريتين الأولى والثانية في المنطقة العجزية . وطبقاً لديتريش فإن تطبيق مصطلح السنستة المشقوقة يجب أن لا يقتصر على ظهور الاندماج غير المكتمل ، أو الانشقاق في القوس العصبي للقفة ، ولكن أيضاً على الاختلالات ذات الخصائص التطورية والتركيبية ، والتي تتوافق مع الفلج الشوكي ولها تسمى بالسنستة المشقوقة . ويدرك ديتريش (1931) أن الفلج الشوكي عبارة عن ظاهرة وراثية في الطبيعة ، ويبدو أن هناك ظاهرة وراثية لهذا الخلل كما رأى من قبل البرز وواجنز (Alpers and Waggoner. 1929) اللذان وجداً أن الخلل يظهر في سبعة إلى

تسعة من أفراد العائلة . ويعطي ميكستر (Mixter, 1945) وصفاً رائعاً للسنستة المشقوقة والتي اعتبرها تشهو خلقي يتكون من خلل في إغلاق أقواس الفقرة مع خلل يحدث عادةً في الأغشية المخية والأنسجة العصبية .

ب - انحلال الفقرات

Spondylosis

إن انحلال الفقرة عبارة عن نمو غير طبيعي في الفقرات القطنية (الظهرية) والتي تنتج عن فشل في التعظم بين البروز العظمي المفصلي العلوي والسفلي للفقرة . وهذا الانفصال يقسم الفقرة إلى جسم وفجوة مفصالية علوية وقوس عصبي وبروز مفصلي سفلي . وعملياً، فهذا يسمح للفقرة المختلة بالانزلاق إلى الأمام لأن أثر الفجوة المفصالية السفلية مفقود مما قد ينبع عنه انحلال الفقرة . ونقول بحذر إن مصطلح انحلال الفقرة يرجع إلى تحرك أو إزاحة جسم الفقرة والبروز المستفرض والسوكيات والبروز المفصلي العلوي إضافة إلى الجزء المجاور من الفقرة .

وبالإمكان إرجاع الانحلال الفكري إلى أنه خلل مكتسب من طبيعة الكسر الناتج عن الضغط والذي قد يؤثر على الواح مفصالية متداخلة مفردة أو متعددة . يرى أبستين (Epstein, 1968) . إن هذا الانحلال قد يظهر بعد رضوض متعددة ذات طبيعة باقية ومن هذه الرضوض ما يحدث عند الرياضيين والرافضين . وانحلال الفقرة عادةً ما يكون متماثل الحدوث على الجانبين ويحدث غالباً في الفقرات الظهرية القطنية الرابعة والخامسة . وقد لاحظ موريتون (Moreton, 1966) بعد مراجعته لـ ٣٢,٦٠٠ حالة أن الخلل متماثل (موجود) على الجانبين في ٧٢٪ إلى ٨٨٪ ويحدث في الفقرة الخامسة في ٩١,٢٪ من الحالات .

وانحلال الفقرات موجود في كل الجماعات الإنسانية التي خضعت

للدراسة. وقد وجد ستیوارت (Stewart, 1931) عند اختباره لـ ٣٥٠ من الأسكيمو الذين يعيشون في ولاية الأسكا الأمريكية أن نسبة حدوث انفصال القوس العصبي لل الفقرة بلغت ٢٧٪ . وأثناء اختبار ٤٢٠٠ عينة عظمية لاحظ رو وروش (Rowe and Roche, 1953) أن أعلى نسبة لحدوث انحلال الفقرة توجد في الذكور القوقازيين حيث بلغت ٦٤٪ وأقل نسبة حدوث في الإناث (الإناث) حيث بلغت ١١٪ . أما ستیوارت (Stewart, 1953) فقد أورد في تقريره أن انحلال الفقرة موجود في ٢٦٪ من أصل ٧٨٦ هيكل من هياكل الأسكيمو التي فحصها في متحف التاريخ الطبيعي بواشنطن. وفي دراسة أخرى وجد ليستر وشapiro (Lester and Shapiro, 1968) أن نسبة انحلال الفقرات يقل إلى ٢١٪ (٤٧٪ / ١٠٪) من الأسكيمو الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ / و ٤٥٪ (٤٨٪ / ١١٪) في جماعة أخرى تدعى تيجاراً. أما مورس (Morse, 1969) فقد أورد في تقريره أن نسبة حدوث انحلال الفقرة تصل إلى ٣١٪ من الهياكل العظمية في أحد المواقع الأثرية الهندية. ولم يلاحظ الباحثون أثر اختلافات الجنس بين الذكور والإناث ولكنهم وجدوا زيادة ملحوظة لانحلال الفقرة مع تقدم السن.

وليس هناك أية أدلة تبين ظهور انحلال الفقرات عند الولادة (Morse, 1969) وفي دراسته لمائة جنين لم يجد باتس (Batts, 1939) أي خلل في الأقواس العصبية. كما لاحظ رو وروش (Rowe and Roche, 1953) نفس النتائج عند فحصهم لـ ٥٠٠ من الأطفال حديثي الولادة وبحث الأجنة. وبمراجعة الدوريات العلمية التي نشرت في القرن الماضي وجدت دلائل تشير إلى أن انحلال الفقرة عبارة عن إصابة أو خلل مكتسب في الطبيعة نتيجة الكسور أو بفعل الضغوط أكثر من أن تكون بسبب عدم التحام مركري العظم (Epstein, 1968) . ويعتقد ستیوارت (Stewart, 1953) أن طريقة الجلوس في زوارق الصيد الصغيرة قد تعرض الفقرات القطنية للإجهاد. أما جارلند وتوماس (Garland and Thomas, 1946) فإنهما يعتقدان أن الخلل ربما يكون نتيجة لضغط وزن الجسم للشخص نفسه إضافة إلى الحوادث وضعف

العضلات والأربطة نتيجة التقدم في السن أو أمراض معينة . وبالنسبة للنساء فربما كان الخلل نتيجة ضعف الأنسجة من أعباء الولادة المتكررة . ويرى ويلتس (Wiltse. 1962) من جانب آخر أن الخلل في الأجزاء المفصليّة وتدهور تركيبة العظم راجع إلى مرض وراثي يتميز بنقص في القدرة الطبيعية على إصلاح نفسه .

ابابُ الثاني

أمراض العظام

Bone Pathology

الفصل التاسع

مَرْضُ العِظَامِ الْأَيْضِي

Metabolic Bone Disease

تعزى الأمراض الأيضية (الاستقلابية) في العظام إلى الاعلال الذي يسبب نقصاً في كتلة العظام بسبب عدم كفاية الإنتاج العظمي ، والتمعدن العظمي ، أو نقص العظام المفترط في أنسجة العظام الطبيعية . ويمكن القول إن العوامل التي تحافظ على التوازن العظمي الطبيعي معقدة وعسيرة الفهم (Sissons. 1963) ، وسوف يتم التركيز الخاص على النقص الغذائي ، المسبب للاضطراب في الاستقلاب الطبيعي للعظام؛ كالأمراض ذات التأثيرات المهمة في «علم أمراض العظام القديمة».

أ - داء الأسفربوط : Osteopenia

إن الأمراض التي تحدث بسبب عدم كفاية التركيب العظمي هي الأستيوبينا أو داء الأسفربوط ذو العلاقة بنظام الأكل . الأستيوبيد (العظمي) هي المنتج العضوي والتي تستقر فيها المواد المعدنية غير العضوية في العظام . ويشكل «الكولاجين» الذي يتكون من البروتين ذي البنية الليفية حوالي ٩٥ - ٩٠٪ من وزن المنتج العضوي - الجاف والخالي من الدهن (Mclean and Urist. 1968) . كما يعتبر كلاً من البرولين والهيدروكسىبرولين من الأحماض الأمينية المهمة في تركيب اللولبي الثلاثي للكولاجين ، مع أن البرولين هو فقط الذي يندمج في جزء البروتوكولاجين . ويطلب هيدروكسيليشن البرولين إلى هيدروكسىبرولين فيتامين جـ (حامض الأسكوربيك) . ولذا فالناس الذين ينقصهم فيتامين جـ لا يستطيعون تركيب كميات مناسبة من الأستيوبيد والنتيجة إصابتهم بداء الأسفربوط.

ومن الملاحظ توفر المصادر الطبيعية لفيتامين ج في العديد من الأطعمة المختلفة وتعتبر الحمضيات من أغنى المصادر الطبيعية لفيتامين ج، وكذلك الخضار الخضراء غير المطبوخة. أما البطاطا فتحتوي على كميات أقل من فيتامين ج ولكنها تعتبر مصدراً مهماً عندما تؤكل بكميات كبيرة كما يحدث في أجزاء من أوربا ، وينعدم وجود فيتامين ج في الحبوبيات ، أما اللحوم فلا تحتوي إلا على القليل منها. أما في الأسكتلند ، حيث يكون الغذاء الرئيسي تقريباً اللحم ، فإن الكبد والأنسجة الغدية الأخرى من الحيوانات التي يأكلونها توفر لهم كميات كافية من فيتامين ج، (Davidson and Passmore. 1969).

وال تاريخ يقول بأن داء الأسقربوط كان هو البلاء الذي يصيب البحارة في الرحلات الطويلة والجنود في الميدان وأولئك الذين يعيشون تحت الحصار ، ولذا فلم يكن مستغرباً أن يموت ٥٠ إلى ٨٠ بالمائة من الطاقم كله بسبب داء الأسقربوط خلال رحلة طويلة واحدة (Hess. 1920) . ولقد مات الكثيرون في سنوات المجاعة منذ ١٨٤٦ إلى ١٨٤٧ في إيرلندا بسبب الأسقربوط (هنريتشن ١٩٦١). كما انتشر داء الأسقربوط بين البدائيين الأستراليين خلال فترات الجفاف الطويلة (بيسد ١٩٣٢) ، هذا ، ويعزى وجود التزيف تحت السمحاقى إلى داء الأسقربوط والذي تم اكتشافه في ٢٧٪ من الهياكل العظمية لستة وثلاثين من البالغين في حضارة مايا القديمة وهذا يشير إلى أن المجاعة والمرض هما العاملان البارزان في سقوط الحضارة الماياوية (Saul. 1972. 1973) .

الأسقربوط الطفولي : Infantile Scurvy

وبسبب التشابه في بداية الأعراض والعمر معاً فقد خُصّ داء الأسقربوط الطفولي إلى ك صالح الأطفال حتى تم فصلهما مرضىًّا بواسطة بارلو الذي أوضح علاقة الأسقربوط الطفولي الوثيقة بالأسقربوط الذي يصيب البالغين (Barlow.

(1883) . تُصيب معظم هذه الحالات الأطفال في الشهر السادس من السنة الأولى من العمر . ويكون الأطفال المصابين بالداء الأسقريبوطي معرضين بدرجة عالية إلى عدوٍ معتَرَضٌ قد تعرّضهم للهلاك .

ويعتبر التزيف تحت السمحaci الإشارة الوحيدة الأكثر أهمية للأسقريبوط (Kato, 1932) . وفي طور الالئام ، في الحالات المعتدلة لداء الأسقريبوط ، فإن حدوث التعظم أو التكليس الورمي الدموي تحت السمحaci يوفر دليلاً قوياً على المرض في الهياكل العظمية . ففي عينات العظام العجافة قد تشاهد على مدى السيقان للعظام الطويلة كمناطق غير سوية ، النمو التراكيبي للعظم تحت السمحaci وفي المقدمة ، والساقي برمتها يظهر عليها الانفاس نتيجة لهذا النمو التراكيبي للعظم تحت السمحaci وغالباً ما تكون الساق السفلية للعظام الطويلة هي الأكثر تعرضاً . (انظر شكل ٢٨) .

إذا امتص التزيف تحت السمحaci بدلاً من أن تكمله ، فإن التبخر والنّشاط المتزايد المتعلّق بكسر العظم يتسبّب في إضعاف العظم المتتكلّس خاصة في أطراف قصبة العظم . وتعتبر الكسور في أطراف قصبة العظم مألفة بالقرب من الوصلة بين طرف قصبة العظم والكردوس (الماشة) . وقد تبرز نتوءات عظيمة متتكلّسة صغيرة من الطرف الجانبي في هذه الأماكن مما يدل على تشكيل دشيد عظمي نتيجة لامتصاص العظام ولنقص السمحaci لتشكيل العظام الجديدة ، فإن اللحاء تصبح رفيعة جداً ، وقد تبدو الحويجزات الخفيفة «زجاج الأرض» مرئية في الصورة الرентيجينية .

وفي حالات الأسقريبوط الشديدة فإن الهيكل العظمي بكماله يقاوم بنقص العظام بسبب الضمور الناتج عن عدم الاستعمال في حالة الطفل المقعد .

ويحدث التخرز الأسقريبوطي للأصلع في الوصلات الضلعية الغضروفية ، ويكون التخرز (التحب) مشابهاً لخصائص كساح الأطفال



(شكل ٢٨)

صورة بالأشعة لعظم العضد والكعبرة والزند
لطفل يشكو من مرض الأسقربوط


ولكنها أكثر بروزاً وأقل عقدة ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن التزيف الواقع تحت السمحاق غالباً ما يقع على طول ساق الصلع .

ولكن لا توجد معلومات كثيرة عن التغيرات القمحية في الأسقربوط . ويوجد في بعض الحالات تزيف واقع تحت السمحاق على السطح العيني للجزء الدائري من العظام الأمامية (Jaffe. 1972) ، وربما يتتج عن تعفن وامتصاص التزيف أضراراً غربالية ووقبية (كريبرا أورباتاليا) ولكن هذا الشيء ليس معلوماً حتى وقتنا هذا .


ومن الجدير باللحظة أن القرود التي تمت تغذيتها بالغذاء الخاص بالأسقربوط ظهرت عليها تغيرات غربالية الشكل معلومة في السطوح الوقية التي استشهد بها هاو (انظر Hooton. 1930) .

ب - داء الأسقربوط الذي يصيب البالغين :

يعتبر داء الأسقربوط الخاص بالبالغين مشابهاً في المظهر للشكل الطفولي ما عدا غياب تداخل مراكز تعظم الكروموس المغلقة . وإصابات الكسور المرضية شائعة في سيقان العظام عنها في أطراف قصبة العظم وهي تحدث بسبب نقص التعظم الشامل بدون تشكيل عظام جديدة (انظر أشكال . ٢٩ ، ٣٠) .



A




B

(٢٩)

B, A



(شكل ٢٩) C



(شكل : ٣٠)

المراجع

BIBLIOGRAPHY

- Bass, W. M.: Human Osteology. Columbia, Missouri Archeological Society, 1971.
- Bolk, L.: Problems of Human dentition. Am J Anat, 19: 91 - 148, 1916.
- Boucher, B. J.: Sex differences in the fetal sciatic notch. J Forensic Med, 2: 51 - 54, 1955.
- Boucher, B. J.: Sex differences in the fetal pelvis. Am J Phys Anthropol, 15: 581, 600, 1957.
- Bourne, G. H.: The Biochemistry and Physiology of Bone. New - York, Acad Pr, 1972.
- Boyd, W. C. and Li, C. C.: Rates of Selective action on Unifactorial and Multifac.
- Boyle, P. E.: Manifestations of Vitamin A Deficiency in a Human tooth germ. J Dent Res, 13: 39 - 50, 1933.
- Braur, J. D. and Blackstone, C. H.: Congenital Syphillis association with enamel Hypoplasia. J Am Dent Assoc, 28: 1633, 1924.
- Brooks, S. T.: Skeletal age at death: The Reliability of Cranial and public age indicators. Am J Phys Anthropol, 13: 567 - 597, 1955.
- Brothwell, D. R.: Digging Up Bones, 2nd ed. London, the British Museum of Natural History, 1972.
- Butting, R. W.: Textbook of Oral Pathology. Philadelphia, Lea & Febiger, 1929.
- Dahlberg, A. A.: The Changing dentiton of man. JAMA, 32: 676 - 690, 1945.
- Dahlberg, A. A.: The dentition of the American Indian. In Laughlin, W. S. Ed.): Papers of the physical Anthropology of the American

- Indian. New - Yok, the Viking Fund Inc., 1949.
- Dwight, T.: The Size of the articular surfaces of the long bones as characteristic of Sex: an anthropological Study. Am J Anat, 4: 19 - 31, 1904 - 1905.
- El - Najjar, M. Y.: People of Canyon de Chelly. A Study of their biology and culture. Ph. D. Dissertation. Arizona State University, Tempe, Arizona, 1974.
- Fisher, A., Kuhm, G., and Adami, G.: The Dental Pathology of the Prehistoric Indians of Wisconsin. Bulletin of the Public Museum of the City of Milwaukee, 1931.
- Fully, G.: Une nouvelle Methode de determination de la taille. Ann Med Legale Criminol, 36: 266 - 273, 1956.
- Genovés, S.: Introduction al diagnostico de la edad y del sexo en restos óseos prehistóricos. Universidad Nacional Autónoma de México Publicaciones del Instituto de Historia, Primera Serie, Número, 75, Mexico, 1962.
- Genovés, S.: La Proporcionalidad entre los huesos largos y su relación con la estatura en restos mesoamericanos. Cuadernos del Instituto de Historia, Serie Anthropologica, Número 19 Universidad de Mexico, Mexico, 1966.
- Genovés, S.: Proportionality of the long bones and their relation to stature among Mesoamericans. Am J Phys Anthropol, 26: 67 - 77, 1967.
- Gilbert, B. M.: Misapplication to females of the standard for aging the male Os.
- Gilbert, B. M. and McKern, T. W.: A Method for aging the female Os pubis. Am J Phys Anthropol, 38: 31 - 38, 1973.
- Gill, G. W.: The Glendo Skeleton and its meaning in light of post - contact racial dynamics in the Great Plains. Plains anthropol, 21: 81- 88, 1976.
- Goldstein, M. S.: Dentition of the Indian crania Texas. Am J Phys Anthropol, 6: 63 - 84, 1948.
- Gottlieb, B.: Rachitis and enamel Hypoplasia. Dental Cosmos, 62: 1209 - 1221, 1920.
- Grahnén, H., Sjolin, S.. and Stenstrom, A.: Mineralization defects of

- Primary teeth in Children born pre - term. Scan J Dent Res. 82: 396-400, 1974.
- Gregory, H. E.: The Navajo Country. U. S. Geographical Survey, Water Supply Paper 380. Washington, D. C., Government Printing Office, 1916.
 - Hanna, B. L.: The Biological relationships among Indian groups of the South West. Am J Phys Anthropol, 20: 499 - 508, 1962.
 - Hellman, M.: Racial characters in human dentition. Proc Am Phil Soc, 67: 157 - 174, 1928.
 - Houghton, P.: The relationship of the pre-auricular groove of the ilium to pregnancy. Am J Phys Anthropol, 41: 381 - 389, 1974.
 - Hrdlicka, A.: Human dentition and teeth from the evolutionary and racial stand-point. Dominion Dent J, 23: 403 - 417, 1911.
 - Hrdlicka, A.: Shovel Shaped teeth. Am J Phys Anthropol, 3: 429 - 465, 1920.
 - Hrdlicka, A.: Further Studies of Tooth morphology. Am J Phys Anthropol, 4: 141 - 176, 1921.
 - Jit, I. and Singh, S.: The Sexing of the adult Clavicles. Indian J Med Res, 54: 1 - 121, 1966.
 - Kerely, E. R.: The microscopic determination of age in human bones. Am J Phys Anthropol, 23: 149 - 163, 1965.
 - Kereley, E. R.: Forensic anthropology. In Legal Medicine Annual 1973, New - York, Appleton, 1973.
 - Keer, D. A.: Relations between periodontal diseases and systematic diseases. J Dent Res, 41: 302 - 304, 1962.
 - Kraus, B. S.: Carabelli's anomaly of the maxillary molar teeth. Observations on Mexican and Papago Indians and an interpretation of the inheritance. Am j Hum Genet, 3: 348-355, 1951.
 - Krogman, W. M.: The Human Skeleton in Forensic Medicine. Springfield, Thomas, 1962.
 - Leigh, R. W.: Dental Pathology of the Eskimo. Dental Cosmos, 67: 884 - 898, 1925.
 - Lester, C. W. and Shapiro, H. I.: Vertebral arch defect in the lumbar vertebrae.

- Levine, R. S.: Neonatal enamel hypoplasia in association with symmetric neonatal Hypocalcemia. *Br Dent J*, 137: 429 - 433, 1974.
- Manouvrier, L.: La détermination de la taille d'après les grands os des membres. *Mem Soc Anthropol*, Paris, 4: 347 - 402, 1892.
- McKern, T. W. and Stewart, T. D.: Skeletal Age Changes in Young American Males. Technical Report EP - 45. Natik, Mass. Headquarters Quartermaster Research and Development Command, 1957.
- Miller, W.: Der Einfluss der Mikroorganismen auf die Caries der menschlichen Zahne. *Arch Exp Pathol Pharmakol*, 16: 291 - 304, 1883 a.
- Miller, W.: Agency of Micro-Organisms in decay of human teeth. *Dental Cosmos*, 25: 1 - 12, 1883 b.
- Moorrees, C. F. A.: The Aleut Dentition. Cambridge, Harvard U pr., 1957.
- Morrey, L. W. and Nelson, R. J.: Dental Science Handbook. DHEW Publication no. (NIH) 72 - 336, Washington, D. C., 1970.
- Muhlreiter, E.: Anatomie des Menschlichen Gebisses. Leipzig, Arthur Felix, Ltd., 1870.
- Nelson, C. T.: The teeth of the Indians of Pecos Pueblo. *Am J Phys Anthropol*, 23: 261 - 293, 1938.
- Nemeskeri, J.: Die archaologischen und anthropologischen Voraussetzungen palaodemographischer forschungen. *Praehistorische Acitschrift*, 47: 5-46, 1972.
- Pearson, K.: On the reconstruction of stature of prehistoric races. *Philos Trans Soc*, A, 192: 169 - 244, 1899.
- Pearson, K.: A Study of the long bones of the English skeleton. I. The femur. In Draper's Co.: Research Memoir. University of London. Biometric Series X. 1917/19.
- Pedersen, P. O.: The East Greenland Eskimo Dentition. Copenhagen, Meddeleser om Groland, 142, 1 - 256, 1949.
- Pendergrass, E. P.: Schaeffer, J. P., and Hodes, P. J.: The Head and Neck in Roentgen Diagnosis. Springfield, Thomas, 1956.
- Oliver, G. and Pineau, H Biométrie du Scapulum. *Arch Anat*, 5: 67 - 88, 1957.

- Robinson, J. T.: Some hominid features of the ape - man denition. *J Dent Assoc S Africa*, 7: 102 - 133, 1952.
- Schour, I. and Massler, M.: Studies in tooth development: The growth pattern of Human teeth. Part II. *J Am Dent Assoc*, 27: 1918 - 1931, 1940.
- Shaw, J. H.: The relation of nutrition to periodontal disease. *J Dent Res*, 41: 264 - 271, 1962.
- Snyder, R. G., Burdi, A., and Gaul, G.: A rapid technique for preparation fo human fetal and adult skeletal material. *J Forensic Sci*, 20: 576 - 580, 1975.
- Sognnaes, R. F.: Caries - Conducive effect of a purified diet when fed to rodents during teeth development. *J Am Dent Assoc*, 37: 676, 696, 1948 a.
- Sognnaes, R. F.: Analysis of Wartime reduction of dental caries in European children with special regards to Observations in Norway *Am J Dis Child*, 75: 792 - 821, 1948 b.
- Stewart, T. D. (ed): *Hrdlicka's Practical Anthropometry*. Philadelphia, the Wistar Institute, 1947.
- Telkka, A: on the prediktion of hyamanstature from the long bones. *Acta Anat*, 9: 103 - 117, 1950.
- Thieme, F. P.: Sex in Negro Skeletons. *J Forensic Med*, 4: 72 - 81, 1957.
- Todd, T. W.: Age Changes in the pubic bone. I. The male white pubis. *Am J Phys Anthropol*, 3: 285 - 334, 1920.
- Trotter, M.: Estimation of Stature from intact long bones. In Stewart, T. D. (Ed): *Personal Identification in Mass Disasters*. Washington, Nat Museum Nat Hist, 1970.
- Trotter, M. and Gleser, G. C.: The effect of aging on Stature. *Am J Phys Anthropol*, 9: 311 - 324, 1951.
- Trotter, M. and Gleser, C. G: Estimation of Stature from long Bones of American Whites and Negroes. *Am J Phys Anthropol*, 10: 463 - 514, 1952.
- Trotter, M. and Gleser, G.C.: A re-evaluation of estimation of stature taken during life and of long bones after death. *Am J Phys Anthropol*, 16: 79 - 123, 1958.

- Van Arsdell, P.: Maternal Hyperparathyroidism as a cause of neonatal tetany. *J Clin Endocrinol Metab*, 15: 680 - 684, 1955.
- Watson, A. W., Massler, M. and Perlstein, M. A.: Tooth ring analysis in cerebral palsy. *Am J Dis Child*, 107: 370 - 382, 1964.
- Weiss, K. M.: On the Systematic bias on Skeletal sexing. *Am J Phys Anthropol*, 37: 239 - 249, 1972.
- Wheeler, R. C.: *A Textbook of Dental Anatomy and Physiology*. Philadelphia, Saunders, 1968.

الأسيوبنيا الداخلي الأفراز - الشيخوخة - وترقق العظام بعد سن اليأس :

Endocrine Osteopenia - Senile and Post Mena Pausal Osteoporosis

تعتبر الهرمونات الجنسية (الاستروجين ، والأندروجين) ضرورية للنشاط الباني للعظام الطبيعي . ومع بداية التقدم بالسن وإنقطاع الطمث لدى الإناث ينبع عدم التوازن الهرموني عن طريق ازدياد الهرمونات ضد البنائية (الجلوكورتيكون) المجاورة للكلية متناسبة مع الهرمونات الجنسية البنائية . وينبع عن كل هذا عدم توازن الترقق العظمي والذي يعتبر نقصاً في كمية النسج العظمي لكل وحدة من وحدات حجم العظم . كما تتدخل عوامل أخرى ، ولكن ما زالت توجد هناك مجموعة كبيرة من حالات التخلخل (الترقق) العظمي التلقائي (انظر Mclean and Urist. 1968).

أ - ظاهرة العمر Age Incidence

لا يؤثر الترقق العظمي على كبار السن أو على النساء في فترة ما بعد الطمث ، ولكن حدوث الترقق العظمي يرتفع تدريجياً في فترة ما بعد سن الأربعين . وتبيّن إحدى الدراسات التي أجريت على ٢١٨ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن من ٤٥ سنة إلى ٧٩ سنة ولا يشكون من أية أعراض مرضية للترقق العظمي فكرة عن التردد الحقيقي للترقق العظمي لدى النساء . ففي الفئة ما بين ٤٥ سنة إلى ٤٩ سنة اتضح أن ٣٪ منها يشكون من الترقق العظمي بدليل التصوير الشعاعي .

وقد ارتفعت هذه الظاهرة إلى ٤٦٪ في اللائني تبلغ أعمارهن من ٦٠ سنة إلى ٦٤ سنة من العمر وإلى ٦٨٪ من النساء اللواتي يبلغن أكثر من ٧٥

سنة من العمر (Smith et al. 1960). وفي دراسة لظاهره كسور العظام بسبب الترقق العظمامي بفعل الشيخوخة، اتضح أن الأفراد الذين يستمرون في المشاركة في النشاط البدني حتى سن متأخرة من العمر كانوا أقل تعرضاً لترقق العظام من الأفراد الذين لا يمارسون التمارين البدنية (Chalmers and Ho. 1970).

ب - تغيرات العظام : Bone Changes

يظهر الترقق العظمامي المرتبط بالشيخوخة أولاً في العمود الفقري وأنفصال والصلوة والوحوض. وتبرز هذه التغيرات في الأجسام الفقرية مع وفرتها في العظم الإسنجي (المسامي) والهوماشن القشرية الرفيعة. وتتصبح الحويجزات المسامية رفيعة ، خاصة في المناطق المستعرضة. وتضخط أو تثبت الفقرات الصعيفية عادة بواسطة ضغط وزن الجسم وقد تحدث الكسور وهنا يجب أن يكون تشكيل الدشيد العظمي متواجداً في مثل تلك الفقرات.

وكلما تطور الترقق أو التخلخل العظمامي ، فإن العظام الطويلة قد تتأثر ، وتتصبح الحويجزات في البداية خفيفة وأخيراً تصبح القشرة (اللحاء) نفسها رفيعة من السطح النخاعي نحو الخارجي (Jaffe. 1972). وتشيع الكسور في العظام الهشة خاصة في عنق عظم الفخذ (Chalmers and Ho. 1972). ومع أن الجمجمة نادراً ما تتأثر نتيجة للترقق العظمامي المتعلق بالشيخوخة ، إلا أنه يعتقد أن النخالة الجدارية الموجودة في الجمجمة المحفورة أحياناً تكون دليلاً على هذا الاحتلال (Epstein. 1953. Ladge. 1967)، كما تكون النخالة الواقعية بين اللوحتين في القحف (الجمجمة) دليلاً آخر تاركاً فقط الصفائح العظمية الداخلية على شكل انخفاضات سطحية (ضحلة) على جانبي العقد. ومعظم الحالات الجيولوجية التي درست كانت قد حدثت في الأفراد الكبار في السن . وقد استخلصت أكثر هذه العينات من قدماء المصريين ويلاحظ قلة وجودها في القارة الأوروبية (Smith. 1906 - 07).

ويجب استخدام الفحص الخاص بصور الأشعة للبقاءايا الجمجمية

لتحديد فيما إذا كان الترقق العظامي موجوداً . ويمكننا حينئذ أن نفترض بشكل صحيح وجود علاقة بين الترقق العظامي المتعلق بالشيخوخة والخالدة الجدارية الثانية ، وعلاوة على ذلك ، يجب أن تكون حذرین تجاه الظروف المتعلقة بالتراب والتي ترشح العظام الجمجمية وتجعلها خفيفة جداً وهشة كما هو الحال في الترقق العظامي .

Osteogenesis Imperfecta Congenital Osteopenia

ترقق العظام

مرض ترقق العظام مرض غير شائع ويورث بصفة جين سائد وربما يظهر بالصدفة عن طريق الطفرات الوراثية . وأكثر المناطق عرضة لهذا المرض هي النسيج الأوسط أو الضام المولد للأوعية الدموية واللمفية . وهناك في العادة خلل في التكوين والتركيب الكيميائي للكولاجين في هذه الأنسجة وظهور الأعراض على شكل نقص في نمو وتركيب العظام من حيث الكمية والنوعية . (Jaffe. 1972)

وتكون العظام في بعض حالات الترقق العظامي هشة لدرجة أن فرصة بقائها تعتبر ضئيلة مع أنه قد تم ذكر حالتين فقط . ويعطي الطفل المولود حديثاً في حقبة الأسرة الحادية والعشرين في العصر الفرعوني المصري (حوالي ١٠٠٠ قبل الميلاد) نتائج حقيقة للترقق العظمي والنقص في تكوين نسيج العاج (Gray. 1969) . ويكون عقد الجمجمة من عدد كبير من العظام الصغيرة كما يتكون للسن جذور قصيرة ، ويتبlix من الفحص الميكروسكوبى (المجهري) وجود بنية أنبوبية الشكل غير سوية . كما أن كافة العظام الهيكلية الموجودة تكون مشوهه وخاصة الأطراف السفلية مع وجود تقوس مقدمي جانبي بارز لعظم الفخذ . وتبيّن صورة الأشعة تحولاً لحاوياً ، ونقصاً شديداً في كميات الأنسجة الإسفنجية في كل العظام ويتبيّن ذلك من عينة عظمة الفخذ الأيسر المأخوذة من مقبرة ساكون (٨٥٠ - ٦٥٠ قبل الميلاد) .

إن المميزات الخاصة لنقص الترقق العظمي (Wells. 1965) وعينة عظم الفخذ الأيسر هذه هي لشخص يبلغ من العمر ١٧ - ١٨ سنة، والثلاثين الأبعدين للعظم تكون زاوية بـ ٧٥ درجة مع الثالث الأقرب. وهناك دليل وهو أن الكسور السابقة العديدة في المنطقة ذات تزور كبير، كما أن الساق تكون ضعيفة جداً وطرف قصبة العظم تكون ممتدة، وتبين الصورة الرентгенية القشرة النحيلة والأنسجة الإسفنجية المختفية ويمكن اعتبار الكساح سبباً محتملاً أيضاً مع أن التغيرات الكساحية لم تكن موجودة في المئات من الهياكل العظمية لساكسون في نفس الحقبة (انظر شكل ٣١).



صورة تبين ترقق العظام (الفخذ الأيسر)
لأحد الساكسونيين القدماء

(شكل ٣١)

التمعدن العظمي غير الكافي Inadequate Osteoid Mineralization

الكساح (كساح الأطفال) Rickets

يعتبر الكساح اضطراباً في تشكيل العظام النامية في الهيكل العظمي والذي يحدث بسبب عدم القدرة على حزن الكالسيوم والفوسفور ضمن المنيب العضوي للغضروف والعظم. وعلاوة على ذلك ، وللمحافظة على مستويات بلازما الكالسيوم الطبيعية ، فإنه يتم إفراز هرمون الباراثيروكين لتحريك حركة الكالسيوم والفوسفور في العظام مما يؤدي إلى إنتاج أضعافاً من نسيج العظام الذي كان في السابق طبيعياً. ومن الأسباب الشائعة لحدوث الكساح نقص فيتامين د الذي يسبب الامتصاص غير الكافي للكالسيوم والفوسفور من المعى . ومن الأسباب الأخرى لهذا المرض الأمراض المعاوية المزمنة وقلة كميات الكالسيوم والفوسفور في الغذاء وسوء الوظيفة الكلوية الأنوية المزمنة (Mankin, 1974).

التاريخ History

يوجد فيتامين د بصورة طبيعية في بعض الدهون المنتجة من منشأ حيواني . ويكون فيتامين د في الجسم عندما تحول الأشعة فوق البنفسجية المنعمة من ضوء الشمس الأيرجوسترول في الجلد إلى فيتامين د . وغالباً ما يعرف الكساح «بمرض المدينة» حيث أصبح شائعاً خلال الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وذلك لأن الكثريين من العمال وعوائلهم كانوا يأكلون غذاء رديئاً ويتعرضون للقليل من أشعة الشمس . وينطبق هذا الوضع على المناطق

المعتدلة مثل بريطانيا وشمال أوروبا (Hess, 1929). وقد تكون العادات الاجتماعية سبباً رئيساً في حدوثكساح الأطفال. ففي الهند، تغطي الكثيرات من الهنديات المسلمات وجوههن وأجسادهن وقليلًا ما يتجلون في الخارج. ومن معاينة ١٤٨٢ فتاة مسلمة تبلغ أعمارهن ما بين الخامسة والسبعين عشرة تبين وجود الأمراض الكساحية العظمية في ٤٠٪ منها (Wilson, 1931).

ومع أن الدليل الآخر للكساح نادر، إلا أنها لا يمكن أن تعتبره سمة الإنسان العصري ولا توجد حالات واضحة للكساح في الأعداد الكبيرة من المواد العظمية الخاصة بالمصريين القدماء مع أن هناك القليل من العظام الطويلة تبين أن فيها تقوسات مشوهة مما يدل على حدوث الكساح (Smith and Jones, 1910) . ويمكن ملاحظة ندرة العظام الكساحية في مناطق أخرى حيث يكون ضوء الشمس وفيراً ويامكانه تصحح أي نقص في فيتامين د في الغذاء. أما في المناطق الأكثر اعتدالاً، فإن حالات الكساح تكون عديدة، ولذا فإن ٩ أفراد من مجموعة ٨٠٠ من الهايكل العظمية من العصور الوسطى في الدانمارك قد وضحت عليها الأعراض الكساحية (Moller - Christensen, 1958) وهناك حالتان ذكرتا من قبور العصور الوسطى في السويد (Gejvall, 1960).

والعينات الأولية للكساح أخذت من العنصر الحديدى النبوليسي للدانمرك والترويج (Sigerist, 1961) . وقد وجدت دلائل أدبية عديدة لا لبس فيها في الصين تعود إلى ٣٠٠ سنة قبل الميلاد (Lee, 1940). كما أن هناك دلائل مشابهة تستخلص من أوروبا منذ حوالي القرن الثاني بعد الميلاد (Foote, 1927 b).

والنقص في وجود البرهان العظمي للكساح في المناطق الشمالية البعيدة مثل الأسكندرية يعود بشكل كبير إلى عادة أكل اللحم الغني بفيتامين د. ولم يكن الكساح موجوداً في عصر ما قبل كولومبس في أمريكا الشمالية والجنوبية (Hrdlicka, 1907) ، فقد تم اكتشاف حالين للهنود القدماء من

وتبقى إلى الأبد كدليل على الإصابة بالكساح (لاك، ١٩٥٠).

العظم الطويلة Long Bones

وتحتفل التغيرات الكساحية في العظام الطويلة حسب كمية الامتصاص للمادة العظامية ونزع معدنيات العظام التي تحدث لها. إن نزع معدنيات العظام المفرطة لأجل المحافظة على المستويات الطبيعية لبلازما الكالسيوم يسبب رقة القشرة، وتصبح الحويجزات المسامية رقيقة ودقيقة. وفي محمل الحالات، فإن مثل هذا النزع لمعدنيات العظام لا يحدث ويكون بالإمكان رؤية النوع «المتضخم» من الكساح. وتسبب الكميات الزائدة من المادة العظامية والغضروف تمدداً معلوماً في أطراف قصبات العظم وغالباً ما توصف بأنها البواق (شكل ٣٢). وهناك أيضاً النمو التراكمي للمادة العظامية تحت السمحاق على طول ساق العظم وتصبح طبقة القشرة (اللحاء) غليظة وبضيق التجويف النخاعي. وقد تحدث تغيرات مشابهة في عظام مشط اليد وكذلك العظام المشطية.



(شكل ٣٢)

صورة بالأشعة لطفل مصاب بالكساح بين إلتهاب وتضخم أطراف العظام

وغالباً ما تقع الكسور في قصبات العظام الطويلة الضعيفة وكذلك في الضلع ، ونادراً ما يكون هناك أي ترhzج للنهايات العظامية المكسورة . ويتشكل الدشيد العظمي ، ولكن المادة العظامية لن تعطي دعماً قوياً ولذا ينتج التواء (تقوس) للعظم الطويلة بشكل رئيسي يسبب هذه الكسور والوزن الواقع على هذه القصبات (السيقان) الضعيفة . وعادة ما تكون العظام الطويلة في الأيدي أقل تأثيراً من عظام الأرجل وتصبح القشرة عريضة أكثر

ولاية كنتاكي حوالي سنة ٣٣٠٠ قبل الميلاد (Foote. 1927. Snow. 1948)، وأحد هؤلاء الهند طفل يبلغ ١٥ شهراً من العمر لوحظ فيه وجود تحبب في الحوض في الوصلات الصلعية الغضروفية، وتبعد الأجزاء القريبة والبعيدة من عظم الترقوة وكذلك الأجزاء البعيدة من الفخذ والزنود متفرعة ومسامية، ويبعدوا هذا جلياً خاصة في عظم الترقوة. ويعتبر دليل التصخيم في عظام الساقان خاصية لكساح المستشري عند الطفولة. وهناك حالات لكساح الأطفال أبلغ منها تعود لرفات البقايا العظمية للهنود الأميركيين الحالين من ولاية نيومكسيكو وولاية يوتا (هورتون ، ١٩٣٠ ، بروز ، ١٩٤٦).

ويجدر باللحظة أن الآفات المرضية الكاذبة المحاكية لمرض كساح الأطفال قد تظهر حين تؤدي الظروف الحمضية في التربة إلى عدم التكلس في العظام الطويلة، وهذه العظام الطويلة يمكن أن تشتد بفعل ضغط الأرض، وتتشبه التقوس الكساحي (Wells. 1967). كما أن هناك أعراض أخرى تكون غير موجودة في كساح الأطفال مثل التقوس الجمجمي (اضطرام بأطراف قصبة العظم)، وتحبب الحوض في الوصلات الصلعية الغضروفية.

العمر Age

تحدث حالات الكساح ما بين ٦ أشهر وستين وهي الفترة التي يكون فيها نمو العظام سريعاً والتعرض لضوء الشمس قليلاً، والغذاء سيئاً أو في السنوات التي تسبق سن البلوغ، فإن هناك فرصة كبيرة لحدوث الكساح. إن نقص فيتامين د يعرف بمرض الكساح المتأخر عندما يحدث في السنوات ما بين ٦ - ١٥ سنة، وخلال فترة ما بعد البلوغ وبعدما يتم انفلاقي مراكز التعظم الكرودي، فإن هناك استجابة متباعدة للعظام الناضجة تجاه نقص فيتامين د وهذا الاختلال أو المرض يسمى لين العظام وسيتم شرحها لاحقاً.

التغيرات العظامية Bone Changes

إن تشكيل المثبت العضوي (العظم) لا يتوقف بواسطة الخلية البنائية لعظم في مرض كساح الأطفال ولا يحدث التمعدن لهذا المثبت بسبب نقص

فيتامين د. وتقاوم الخلية الابانية للعظم الامتصاص ولهذا تتوارد بكميات زائدة. واعتماداً على فترة الإصابة بالكساح عند الموت ، فإن المادة العظامية قد تكون أولاً تكون ظاهرة في البقايا الهيكلية ، وفي الكساح النشط أو المترورد ، فإن المادة العظامية لا تتمعدن ولذا لا تحفظ «الجمجمة» مع وجود أطراف قصبة العظم الممتدة. أما في حالات الكساح الملشمة جزئياً ، فإن المادة العظمية قد تكون متعدنة تماماً على نحو معتدل مع أن محيط العظام لا يزال غير سوي. وفي كلتا الحالتين تمتاز العظام باللخفة وبالنسيج الهش على نحو استثنائي.


أ - الجمجمة The Skull

وغالباً ما تتأثر الجمجمة بالكساح والتغيرات الحادثة هي الرقة (رخاوة الجمجمة) أو الشخين ، أو العمليتان معاً في مناطق مختلفة من العقد. وتحدث رخاوة الجمجمة خلال الفترة السريعة المميزة لكبر المخ ، والنمو المتابع له في العقد الجمجي . وتخفي في الشهر التاسع عندما يقل النمو.

ونادراً ما تتوزع الرقة الجمجمية (الفعفية) على نحو مناسب ، ولكن غالباً ما توجد على جانب الرأس الذي يضطجع عليه الطفل عادة . ولذا ، فإن المناطق الرقيقة غالباً ما توجد في الأجزاء الخلفية من العظام الجدارية والجزء العلوي من العظام القحفية ، وقد يبلغ قطر هذه المناطق الرقيقة من ٢ إلى ٤ سم (Weinmann and Sicher. 1947. Jaffe. 1972).

ويحدث الشخين للعقد أيضاً في الكساح وخاصة في السنين إلى الثلاث سنوات الأولى من العمر. ولا يتوزع الشخين بالتساوي ولكنه يكون أكثر وضوحاً في نتوءات العظام الجبهية والجدارية ، ويقع التربس المفرط للعظم الجديد (والمادة العظامية) غالباً على السطح الخارجي من العقد بشكل كلي ، ففي الكساح المتقدم في النمو ، تكون النتيجة «الرأس المربع» بسبب التربس العظامي على الأحياء (الحدبات) الجبهية والجدارية . ويتميز جزءاً من المادة العظامية الزائدة عند الالتصام ، ولكن معظمها تعظم

على الجانب المقرر استجابة لل الحاجة إلى التقوية الميكانيكية . وقد يثنى عنق عظم الفخذ إلى الأسفل حتى تشكل الزاوية الصحيحة مع الساق وينتج عنه المذبح (حرفة فحشاء) . (شكل ٣٣) .



صورة بالأشعة لطفل مصاب بالكساح تبين إلتواء عظم الفخذ


وتحني عظمة الترقوة والقصبة الصغرى أمامياً، وتكون عادةً منحنية جانبياً على نحو ملحوظ (مما ينبع عنه أرجل متقوسة) وقد تظهر تقوسات أخرى في بعض الأحيان وقد تطل من قبل العادات الوضعية (شكل ٣٤) (وضع الجسم) (Knaggs, 1926).



(شكل ٣٤)

إلتواء العظام في مرض كساح الأطفال

وفي حالات الكساح المتفاقمة فإن تشوهات اليد تحدث عند الأطفال الذين يستخدمون أيديهم كأسناد لمساعدة رأس العمود الفقري وتحني الأجزاء البعيدة من الكعبة والزند (شكل ٣٥) داخلياً ويشتري العضد نحو الخارج بالقرب من المرتكز الذالي (المثلث الشكل).



(شكل ٣٥)

صورة بالأشعة لطفل مصاب بالكساح تووضح انتفاخ أطراف عظام الزند والكعبة

الضلوع، العمود الفقري والوحوض Ribs, Spine and Pelvis

ويحدث تحبب الضلوع في الوصلات الضلعية والغضروفية بنفس الطريقة التي يتسبب بها توهج أطراف قصبة العظم في العظام الطويلة . وعادةً ما يكون التحبب (سبحة الكساح) أكثر وضوحاً على السطح الداخلي في أطراف الضلوع ، غالباً ما يكون الضلع الخامس والسادس أكثر تعرضاً ، أما الضلوع الرقيقة فتف gioص إلى الصدر مشكلة تخدداً على جانبي القص (الجنجن) وهذا ما يعرف باسم تحدد أو ثلم هاريسون.

ويحدث الانحناء والجفن الجنبي مراراً في الكساح ، وهو ينبع عن نزع معدنيات العظام للأجسام الفقرارية انضغاطاً ويكون التحدب والجفن موجوداً أيضاً . وقد ينضغط الحوض أيضاً بواسطة الضغط (الجهد) بفعل وزن الجذع الأعلى والضغط الناتج عن ضغط الفخذ على الحقن الحرقفي . وتكون النتيجة تضيق قناة الحوض والذي قد يتعارض على نحو خطير مع ولادة الطفل بعد ذلك .

الثنيان Dentition

كما يعوق الكساح اندفاع الأسنان الساقطة مع الاختلاف الكبير في وقت اندفاع الأسنان الساقطة بحيث يجب ملاحظتها . فعندما تتدفع الأسنان بالفعل فإنها عادةً ما تفشل في الظهور بالتسلسل الصحيح وتعتبر اختلالات نقص النمو في بناء الأسنان أكثر أهمية ، خاصة للقواطع العلوية ، وقد تظهر الأسنان الدائمة ضعف التقويم لبنياء الأسنان والذي يحدث كتحدد أفقى أو انخفاضات على طول سطح السن .

قصر الهيكل العظمي (التقرم) Skeletal Dwarfism

يحدث التقرم الدائم في الحالات الشديدة للكساح بشكل رئيسي بسبب الاضطراب في نمو العظم الغضروفي المنشأ للعظام الطويلة ، أو العوامل الأخرى التي ينتج عنها النمو المقصوب أو التقرم الحقيقي فهي التشوهات القوسية للعظام الطويلة للأرجل والجفن الواضح للعمود الفقري .

مدة الإِصابات : Duration of Lesions

إذا عولج الكساح قبل تطور التشوّهات الشديدة ، فإن إعادة التركيب الهيكلـي بعد مرور فترة تبلغ شهوراً أو حتى سنوات قد تمحو آية إشارة أو علامة للمرض ، ولكن عند التقوس المعلوم في العظام الطويلة ، فإن التقوس القحفـي (الجمجمـي) وضعف التقويم الأسـنـاني لا بد أن يحدث ومثل هذه الأعراض (الإِصـابـاتـ) قد تلـشمـ جزئـياً ولكنـها لا تمـحـىـ تماماً بل تـبـقـىـ كـعـلامـةـ دائـمةـ لهذاـ المـرـضـ .

لين العظام Osteo Malacia


يعتبر لين العظام في الكبار تتمة للكساح عند الأطفال والمراهقين. وكما في الكساح ، فإن العوامل الرئيسية هي نقص الكالسيوم والأمراض المعدية وقلة كمية ضوء الشمس . ويبدو أن هذا يشكل أهمية إضافية بالنسبة للإناث اللواتي لديهن حالات حمل مضاعفة في تعاقب سريع وإرتفاع مطول ، ويكون الحمل والإرتفاع سبباً في استنزاف (تجفف) المخزون الهيكلي على نحو شديد للكالسيوم والفوسفور .

وفي الواقع ، فإنه من بين ١٣١ حالة وهي الحالات التي جمعت من الدراسات في هذا الموضوع ، فإن ٨٥ حالة من العدد الكلي حدثت في النساء الحوامل أو النساء ، و ٣٥ في النساء غير الحوامل ، و ١١ في الرجال (Litzman, 1861). وتعرض النساء الشابات الحوامل خاصةً لظاهرة لين العظام بسبب ارتفاع المستلزمات المعدنية الخاصة بهن . ففي الثقافات القديمة حيث يكون الزواج خلال فترة المراهقة وما يتربّ عليه في توفير العديد من فرص الحمل فإنك تتوقع إيجاد الكثير من الأفراد المعرضين إلى التشوهات الهيكلية العظمية للين العظام . ويعتبر التباين بين الكساح ولين العظام ناتجاً من الاستجابات المختلفة للنمو والهيكل العظمي الناضج إلى نقص فيتامين د أو الكالسيوم أو الفوسفور . ويكون تشكيل المادة العظامية في الكساح أكثر نشاطاً في أطراف قصبة العظم وفي الطبقات الخارجية من القرحة المشاشية . وفي ظاهرة لين العظام تنتشر العملية في كل موضع من العظام ، وتتشكل المادة

العظمية لتحمل محل العظم الممتص ثانية بفعل الانحلال التبددي . وتكون الشوهات الناتجة في العظام الرقيقة أكثر خطورة في العمود الفقري والحوض والضلع والقص والفحذ ونادراً ما تتأثر الجمجمة . ويتميز التأثير الناتج عن لين العظام بوجود التحدب ، وخاصة في الموضع الصدري الأسفل والجنب ، كما في الكساح . ولذا فإن الاندفاع الأمامي للعجز البارز والانضغاط الظهري للحق الحرقفي ينتج عنهما تشوهاً خطيراً في الحوض . ويشيع التشوه الحوضي في لين العظام المتعلق بالتنفس ويكون خطراً جداً عند الحمل (انظر شكل (٣٦) .

ولا تتأثر العظام الطويلة على نحو بارز إلا في الحالات الخطيرة . ذلك أن توهج أطراف قصبة العظم تكون غير حاضرة لأن مراكز التعظم الكردوسية قد تتغلق عند البالغين مع أن هذا التوسيع قد يكون موجوداً في الحالات المتأخرة من الكساح عند المراهقين . وقد يحدث تقوساً للعظم الطويلة الضعيفة وتسقط الضلوع ، وتظهر الحويجزات المكتنزة والقشع الغليظة على الجانب المقرع لحمى الوزن في حين يقاس الجانب المحدب بالضمور بسبب عدم الاستعمال ، وتكون الكسور في هذه العظام شائعة ويتشكل الدشيد العظمي بكميات زائدة .

وفي حالات لين العظام الخطيرة مع تشوه العمود الفقري والحوض والعظام الطويلة ، فإن سطح الغضروف المفصلي يكون خاصعاً لضغط خطير . وتنتج التغيرات الانحلالية نتيجة التهاب عظمي مفصلي جرحي (Aegerter 1968 and Kirk Patrick) وقد يحدث ذلك تعطيلاً للنشاط الشخصي بسبب ألم التهاب المفاصل والكسر وعدم التحرك من التشوه الهيكلي . ويقود هذا التشوه إلى عدم استعمال «الأستيوبينا» ، هذا الخلل الذي يتعلّق بإنتاج المادة العظامية وهذا الترافق العظمي سوف يكون جلياً في المراحل النهائية من لين العظام الخطير .



صورة لحالة كساح شديدة لأمرأة بالغة توضح تقوس عظام
الحوض والفخذ والقصبة وميلان جانبي في العمود الفقري

BIBLIOGRAPHY

- Aegerter, E. and J. Kirkpatrick: Orthopedic Diseases, W. B. Saunders, Philadelphia, 2nd ed., 1968.
- Barlow, T.: "On Cases Described as "acute rickets" Which are probably a Combination of Scurvy and rickets, the scurvy being an essential, and the rickets a variable, element". Med.-Chir. Trans.. 66: 159 - 184, 1883.
- Basedow, H.: "Diseases of the Australian aborigines". J. Trop. Med. Hyg., 35: 247 - 250, 1932.
- Brues, A.: "Alkali Ridge Skeletons, Pathology and anomaly". Appendix B in J. O. Brew: Archaeology of Alkali Ridge. Southeastern Utah, Papers of the Peabody Museum, 21: 327 - 329. 1946.
- Chalmers, J. and K. C. Ho.: "Geographical variations in senile osteoporosis", J. Bone Joint Surg., 52 B: 667 - 675, 1970.
- Davidson, S. and R. Passmore: Human Nutrition and Dietetics. Williams and Wilkins, Baltimore, 4th ed., 1969.
- Epstein, B. S.: "The Concurrence of parietal thinness with postmenopausal, senile, or idiopathic osteoporosis", Radiology, 60: 29 - 35, 1953.
- Foote, J. A.: Disease of Bones, Joints, Muscles, and Tendons. Appleton, New-York, 1927 a.
- -----: "Evidence of rickets prior to 1650", Amer. J. Dis. Child., 34: 443 - 452, 1927 b.
- Frost, H. M.: Orthopaedic Biomechanics, Thomas, Springfield, 1973.

- Gejvall, N - G.: Westerhus: Medieval Population and Church in the Light of Skeletal Remains, Boktryckeri, Lund, 1960.
- Gray, P. H.: "A Case of Osteogenesis imperfecta, associated with dentinogenesis imperfecta, dating from antiquity", Clin. Radiol., 21: 106-108, 1969.
- Henschen, F.: The History and Geography of Diseases, Delacorte Press, New-York, 1966.
- Hess, A. F.: Scurvy Past and Present, Lippincott, Philadelphia, 1920.
- -----: Rickets Including Osteomalacia and Tetany, Lea and Febiger, Philadelphia, 1929.
- Hooton, E. A.: Indians of Pecos Pueblo, Yale Univ. Press, New Haven, 1930.
- Hrdlička, A.: Handbook of American Indians, Bureau of American Ethnology Bulletin 30, pt. 1, 1907.
- Jaffe, H. L.: Metabolic, Degenerative, and Inflammatory Diseases of Bones and Joints, Lea and Febiger, Philadelphia, 1972.
- Kato, K.: "A critique of the roentgen signs of infantile scurvy", Radiology, 18: 1096 - 1110, 1932.
- Knaggs, R. L.: Diseases of Bone, William Wood and Co., New-York, 1926.
- Lee, T.: "Historical notes on some vitamin deficiency diseases in China", Chinese Med. J., 58: 314 - 323, 1940. (Also in D. R. Brothwell and A. T. Sandison (ed.): Diseases in Antiquity, Thomas, Springfield, 1967).
- Litzmann, C.: Die formen des Beckens nebst einem Anhange über Osteomalacie, Berlin, 1861.
- Lodge, T.: "Thinning of the parietal bones in early Egyptian populations and its etiology in the light of modern observations", in D. R. Brothwell and A. T. Sandison (ed.): Diseases in Antiquity, Thomas, Springfield, 1967.
- Luck, J. V.: Bone and joint Disease, Thomas, Springfield, 1950.
- Mankin, H. J.: "Rickets, Osteomalacia, and renal Osteodystrophy, part I", J. Bone Joint Surg., 56 A: 101 - 128, 1974.
- McLean, F. C. and M. R. Urist: Bone: Fundamentals of the Physiology of Skeletal Tissue, Univ. Chicago Press, Chicago, 1968.

- Møller - Christensen, V.: *Bogen om Aebelholt Kloster*, Dansk Videnskabs Forlag, Copenhaegn, 1958.
- Ruffer, M. A.: "On the diseases of the Sudan and Nubia in ancient times", *Mit. Zur Geschichte der Medizin u. der Naturwissenschaften*, 13: 453, 1914.
- Sandison, A. T. and C. Wells: "Endocrine diseases", in D. R. Brothwell and A. T. Sandison (ed.): *Diseases in Antiquity*, Thomas, Springfield, 1967.
- Saul, F.: "The human Skeletal remains from Altar de Sacrificios", *Papers of the Peabody Mus. of Arch. and Ethnol.*, vol. 63, no. 2, Harvard University, 1972.
- -----: "Disease in the Maya area: The pre-Columbian evidence", in T. P. Culbert (ed.): *The Classic Maya Collapse*, Univ. of New Mexico Press, Albuquerque, 1973.
- Sigerist, H. E.: *A History of Medicine*, I. Primitive and Archaic Medicine, Oxford Univ. Press, London, 2nd ed., 1961.
- Sissons, H. A. (ed.): *Bone Metabolism*, Pitman Med. Publ. London, 1963.
- Smith, E. G.: "The causation of the Symmetrical thinning of the parietal bones in ancient Egyptians", *J. Anat. Physiol.* London, 41: 232 - 233, 1906 - 07.
- Smith, E. G. and W. Jones: "Report on the human remains", *Archaeological Survey of Nubia, report of 1907 - 1908*, Cairo, Ministry of Finance, 1910.
- Smith, R. W. R. Eyler, and R. C. Mellinger: "On the incidence of senile Osteoporosis", *Ann. Int. Med.*, 52: 773 - 781, 1960.
- Snow, C. E.: "Indian Knoll Skeletons of site Oh 2, Ohio County, Kentucky", *Univ. Kentucky Reports in Anthropology*, 4: 371 - 554, 1948.
- Weinmann, J. P. and H. Sicher: *Bone and Bones. Fundamentals of Bone Biology*, Mosby, St. Louis, 1947.
- Wells, C.: "Osteogenesis imperfecta from an Anglo-Saxon burial ground at Burgh Castle, Suffolk", *Med. Hist.*, 9: 88 - 89, 1965.
- -----: "Pseudopathology", in D. R. Brothwell and A. T. Sandison (ed.): *Diseases in Antiquity*, Thomas, Springfield, 1967.

- Wilson, D. C.: "Osteomalacia (Late Rickets) Studies", Indian J. Med. Res., 18: 951 - 978, 1931.
- Wolff, J.: Das Gesetz der Transformation der Knocken, Berlin, 1892.

الفصل العاشر


أمراض الدم - الأنيميا

Hematologic Disorders

في عام ١٩١٣ اكتشف العالم الأمريكي الشهير أليس هردىلشكا Ales Hrdlicka أعداداً كبيرة من هنود أمريكا الحمر الذين عاشوا في فترة ما قبل الاكتشاف Pre-Columbian وعلى جماجمهم تقرحات غريبة الشكل أو غير مألوفة لعلماء الأنثروبولوجيا الطبيعية. وقد تميزت هذه التقرحات بتماثل توزيعها على العظام الجدارية للجمجمة والعظم القذالي (شكل ٣٧).

أما عظام الوجه ومنطقة الدروز الفاصلة في الجمجمة فكانت سليمة (Hrdlicka, 1914). وفي فترة لاحقة لاحظ هردىلشكا أيضاً وجود مثل هذه الأعراض في عظام محجر العين، ولكن علاقة هذه الظواهر بعضها (انظر Henschen, 1961) وشكل (٣٧) ما زالت غير واضحة وقد أطلق هردىلشكا على هذه التغيرات في الجمجمة اسم مسامية العظم «المتجانس» (Symmetrical Osteoporosis).


ولسوء الحظ فإن مرض العظام المسامي المتجانس قد سبب بعض الجدل في الحلقات العلمية واحتلّ الأمر على الباحثين لصعوبة التمييز بين مرض التزايد العظمي الأولى Primary Hyperostosis ومرض فقدان أنسجة العظم المسمى بالشقّيب العظمي نتيجة للتقدم في العمر Osteoporosis. ولهذا فقد اقترح بعض علماء الأمراض القديمة أن الاسم الأفضل لهذا المرض هو العظم الإسفنجي Spongy Hyperostosis (Hamperel and Weiss, 1955) أو العظم المثقب Porotic Hyperostosis. ومن أهم أعراض هذا المرض:



(شكل ٣٧)

صورة توضح أعراض مرض مسامية العظم المتجلانس
في العظم الجداري والقذالي

ضمور ودمار الطبقة الخارجية لعظام الجمجمة نتيجة ازدياد الضغط داخل طبقة إنتاج الخلايا الدموية الحمراء The Diploe الواقعة بين الطبقة العظمية الخارجية والطبقة العظمية الداخلية. والمظهر الغربالي أو الإسفنجي للمنطقة المصابة ينتج عن التدمير الكامل لطبقة العظم الخارجية وبالتالي تعريه المنطقة الوسطى (The Diploe) (شكل ٣٨). وتكون عظام الجمجمة في المنطقة المصابة أسمك بكثير




(شكل ٣٨)

منظر لقمة الجمجمة لطفل هندي أحمر عمره ستان
يوضح دمار الطبقة الخارجية للعظام نتيجة ازدياد الضغط داخل
منطقة إنتاج الخلايا الدموية الحمراء

من العظام الطبيعية نتيجة تضخم أو انفاخ العظم الداخلي تجاه طبقة العظم
الخارجية (شكل ٣٩).

وكان الكثير من الباحثين قد وضعوا نظريات وافتراضات لمعرفة الطبيعة
البايولوجية وأسباب مرض العظم الإسفنجي خصوصاً وأن مثل هذا المرض قد
لوحظ في حالات الكساح (Williams, 1929) وحالات نقص الكالسيوم وفي



(شكل ٣٩)


صورة توضح انفاخ العظم (اليمين)

نتيجة الزيادة في إنتاج الخلايا الحمراء . . الصورة لطفل مات من مرض الشلاسيميا الذي يسبب فقر دم شديد.

حالات اضطرابات الغدد الهرمونية (الغدد الصماء) (Hrdlicka, 1914) . ويرى بعض الباحثين أن لهذا المرض علاقة بمرض الزهري الوراثي (Virchow Cited by Parrotcit by Williams, 1929) أو الدرن (السل) (Henschen, 1961) . حتى إن بعضهم اعتقد أن هذه التغيرات في عظام الرأس ما هي إلا نتيجة لحمل أواني الماء على الرأس (Smith and Jones, 1908) ، وكذلك عادة ربط رأس الطفل للألواح الخشبية عند قبائل الهنود الحمر من سكان الأمريكتين (Williams, 1929) .


وقد بدأت الأبحاث العلمية لتشخيص أسباب مرض العظم الإسفنجي

تظهر منذ بداية عام ١٩٣٠ من خلال تقرير الباحث هوتون (Hooton 1930) على بعض القبائل الهندية. وقد لاحظ هوتون أن المرض متشر في جماجم الأطفال لبعض هذه القبائل التي عاشت في الفترة من ٩٠٠ - ١٢٠٠ م). ويقول هوتون في تقريره أن هذا المرض موجود في ١٤ جمجمة من ضمن واحد وعشرون أي بنسبة ٦٦٪. كما وجد هوتون هذه الأعراض المرضية في الأفراد الأكبر سنًا في هنود قرية Sacred Cenote في دولة المكسيك وهنود بيكوس بجنوب ولاية مكسيكو الجديدة في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قام هوتون بمقارنة صور الأشعة لهذه الجماجم مع صور أشعة أطفال أحياء يعانون من مرض الثلاسيميا (أنيميا كولي) ووجد تشابهاً كبيراً بين المجموعتين حيث أظهرت الجماجم نمواً زائداً في نخاع عظم الجمجمة أدى إلى توسيع المنطقة الوسطى في هذه العظام. وكانت الصفائح الخارجية خشنة ومرتبة عمودياً على الصفائح الداخلية على شكل ما يسمى بالشعيرات الواقفة في صور الأشعة والذي يميز مرض الثلاسيميا (شكل ٤٠). ومنذ ذلك



(شكل : ٤٠)

منظر يبين ما يسمى بالشعيرات الواقفة
في مرض الثلاسيميا



(شكل ٤٠ ب)

صورة لأعلى الجمجمة بالأشعة توضح التجانس في
وجود أعراض مرض العظم الإسفنجي

الحين لم تضف أشياء كثيرة لحل هذه المشكلة للذين يعانون من مرض
الثلاسيميا ومرض تكسير الدم المنجلبي.

إن التقدم الحديث في أبحاث أمراض الدم والأشعة قد أظهر بأن كثيراً
من أمراض الدم تعطي نفس الصورة الشعاعية للجمجمة وبالتالي فإنه
بالإضافة إلى الثلاسيميا وتكسير الدم المنجلبي وجد أن العظم الإسفنجي
موجوداً في مرض تكسير الخلايا الكروية الوراثي Hereditary
Hemolytic Anemia ، الثلاسيميا البسيطة Thalassemia Minor ومرض الأنيميا

الأهليجية الوراثي Hereditary Elliptocytosis وغيرها من أمراض الدم . وبالنسبة للأمراض غير الوراثية فقد لوحظت هذه الحالة في مرض الأنيميا الناتج عن نقص الحديد Iron Deficiency Anemia . ويوضح الجدول أدناه بعض الأمراض التي يجب أن تؤخذ بالاعتبار حين التحدث عن مسببات مرض العظم الإسفنجي .

١ - تكسير الدم الوراثي Cogenital Hemolytic Anemia :

أ - الثلاسيمية وتشمل :

- الثلاسيمية العظمى (أنيميا كولي) ، داء البحر الأبيض المتوسط وأرومة الكرينة الحمراء .
- الثلاسيمية المتوسطة .
- الثلاسيمية البسيطة .

ب - مرض الدم المنجلبي : Sickle Cell Disease

- ويشمل . الأنيميا المنجلية .
- هيموجلوبين C .
- هيموجلوبين E .
- هيموجلوبين S .
- هيموجلوبين S - تلاسيميا .

ج - تكسر الدم الوراثي للخلايا غير الكروية

Hereditary Nonspherocytic Hemolytic anemia.


Glncose - 6 - Phosphat Dehydrogenase Deficiency

Pyruvate Kinase Deficiency.

- د - تكورة الكريات الحمراء الوراثية Hereditary Spherocytosis
- هـ - الأنيميا الأهليجية الوراثية Hereditary Elliptocytosis
- ٢ - أنيميا نقص الحديد Iron Deficiency Anemia
- ٣ - أمراض القلب الخلقية التي تسبب الزرقة Cyanotic Congenital Heart Disease


٤ - مرض ازدياد الكريات الدم الحمراء عند الأطفال Polycythemia Vera In Childhood

إن العملية المرضية التي تشمل كل هذه الأمراض تمثل في ازدياد نمو نخاع العظم في سن الطفولة والذي يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج كريات الدم الحمراء لتعويض أو مواجهة الزيادة في أعداد كريات الدم الحمراء غير السوية أو الشاذة، وهذا النشاط الزائد لنخاع العظم يؤدي إلى الانساع بين عظام الجمجمة الداخلية والخارجية وبالتالي إلى نقص سمك الطبقة الخارجية. والعظم المتكлон الزائد يكون في درجة موازية للأوعية الدموية لنخاع العظم والتي هي عمودية بالنسبة للعظمي الداخلي. وظهور هذه الأعراض في الأشعة كشعيرات على عظم الجمجمة (شكل ٤١ أ، ب). ولكن المظهر الخارجي للجمجمة لا يوفر الطريقة المثلث في تشخيص المرض حيث إن نمط التغيير في العظام متشابه في كل الأمراض الموضحة في الجدول السابق على المرض المسبب من جملة ردود فعل العظام نتيجة للمرض الدموي. وبالتالي سوف نبحث في أمراض الدم الرئيسية ومرض أنيميا نقص الحديد كل على حدة وبالتفصيل.



(شكل ٤١ أ)

صورة بالأشعة تبين زيادة النمو بين الطبقتين العظميتين
و خاصة في منطقة الجبهة في ثلاثيسيا العظمى



(شكل ٤١ ب)

منظر يوضح ما يعرف بالشعيرات
الواقفة في مرض الثلاسيميا العظمي

الثلاسيميا العظمى والبسيطة Thalassemia Major and Minor

الثلاسيميا أو أنيميا البحر الأبيض المتوسط مرض وراثي واسع الانتشار يتعلق بتكوين الهيموجلوبين. وهناك أنواع عديدة من الثلاسيميا ولكن يمكن جمعها تحت اسم واحد. والثلاسيميا مرض وراثي يتعلّق بتغيير أحد الأحماض الأمينية في سلسلة الأحماض الأمينية (Cavali-Sforza and Bodmer, 1971 Alpha or Beta) وهناك نوعان من الثلاسيميا: البسيطة لدى الأشخاص حاملي الجينات غير المتماثلة والمركبة لحاملي الجينات المتماثلة وهي الأخطر. ويتفاوت النوعان في درجة الخطورة والحدة.

الجمجمة The Skull

والثلاسيميا العظمى عادةً ما تظهر في السنتين الأوليتين من عمر الإنسان، وتكون التغيرات في الججمة واضحة خاصة في عظام الجبهة (Caffey, 1937). ولا يمتد تأثير هذا المرض إلى عظام المنطقة الخلفية من الججمة. وتظهر التغيرات المميزة لهذا المرض في عظام الصدغ والعظم الإسفيني وعظمة سقف الأنف. كما يؤدي ازدياد نمو النخاع في هذه العظام إلى إعاقة أو توقف الغيوب الهوائية عن القيام بوظيفتها بشكل تام ومع تقدم السن قد يؤدي إلى عدم قفل الفكين (Moseley, 1963). وفي مرض الخلية المنجلية فإن عظام الغيوب الأنفية والحلمية أو عظام الوجه قليلاً ما تتأثر وكذلك الحال في حالة الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد. وهكذا فإن ازدياد كثافة العظام هذه تمثل نقطة اختلاف هامة في التشخيص بين مختلف حالات فقر الدم.

عظام أسفل الجمجمة Post - Cranial Skeletan

في الثلاسيمية العظمي يظهر ثقب العظم في العمود الفقري لكن بلا أي ازدياد في انضغاط الفقرات العظمية ، وهذا مهم في تشخيص هذا المرض لأن هذه التغيرات تحدث أيضاً في الأنيميا المجلية(Carrol 1957).

التغيرات المبكرة Early Diagnosis

وهذه أول ما يلاحظ في العظام الصغيرة خاصة في عظام أصابع القدمين واليدين (شكل ٤٢) وهي أكثر ما تكون وضوحاً في حالات الثلاسيمية العظمي . أما العظام الطويلة فيلاحظ فيها ازدياد تضخم نخاع العظم مع فقدان شكل العظم الخارجي حيث تتسع المنطقة الداخلية في العظم وتتصبح العظام الخارجية رقيقة أو أقل سمكاً منها في العظام العاديّة (شكل ٤٢) . وهناك أيضاً ثقب في العظم لكنه غير منتظم في عظام القدمين واليدين وفي الداخل تعطي مظهراً يشبه خلية النحل ، وأيضاً من الجائز أن تتأثر الأضلاع بالثلاسيمية بحيث تتضخم المنطقة الداخلية ويصبح العظم الخارجي أقل كثافة خاصة في المنطقة الخلفية للأضلاع .

التغيرات المتأخرة Late Diagnosis

قليلون هم الأطفال المرضى بالثلاسيمية العظمي الذين يعيشون إلى ما بعد فترة المراهقة . وعموماً في الأفراد الذين يبقون أحياء هناك تراجع في عمليات التغيير العظمي خصوصاً في الأطراف مع انتقال نشاط نخاع العظم من العظام الطرفية إلى منطقة الجذع . وقد لوحظ أيضاً أن التغيرات المذكورة في عظام القدمين واليدين تراجع وتبدأ في الاختفاء (Moseley 1963) ، لكن العملية المرضية تصبح أكثر حدة في العظام المركزية . وبالتالي ففي فترة الشباب نلاحظ تغيرات مرضية عن طريق الأشعة في عظام الجمجمة والرقبة والوحوض بينما العظام الطويلة تظهر طبيعية .

ولعظام اليدين أهمية كبرى في تشخيص مرض الثلاسيمية العظمي في الرضع والأطفال ولكنها ذات أهمية قليلة في التشخيص عند الأطفال الكبار



(شكل ٤٢)
الثلاسيميا العظمي - صورة توضح ازدياد
تضخم نخاع العظم مع فقدان (ترقق) العظام الخارجية
في عظام اليدين

والشباب الصغار ويلاحظ أيضاً اتحاد كراديس العظام الطويلة في وقت مبكر. ويحدث هذا بعد سن العاشرة خاصة في رأس عظمة العضد وأسفل عظمة الفخذ (Curranino and Erlandson 1964) بينما في الثلاسيميا البسيطة لا تكون التغيرات العظمية واضحة وبالتالي فإن تشخيصها أصعب خصوصاً وأنها تشبه التغيرات العظمية في الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد، على أنه إذا كانت التغيرات في الججمحة نتيجة للثلاسيميا البسيطة فإننا سنلاحظ أيضاً تغيرات في الهيكل العظمي تشبه تغيرات الثلاسيميا الكبيرة.

أنيميا الخلية المنجلية Sickle Cell Anemia


إن التغيرات العظمية في الأنيميا المنجلية قد لوحظت في كثير من الأفراد الذين يحملون الجينات المتماثلة في هيموجلوبين S الوراثي. ويشمل مرض الأنيميا المنجلية أيضاً الأفراد الذين يحملون الجينات الشاذة في الهيموجلوبين C و E الوراثية (Cavali - Sforza and Bodmer, 1971). ويوجد الجين الوراثي للهيموجلوبين S فقط في الزنوج بينما توجد الجينات الأخرى في غيرهم من الأجناس البشرية. ومن الناحية الأكلينيكية فإنهم جميعاً يعانون من نفس المشكلات الباثولوجية. كما أن جزءاً كبيراً من المصابين بأمراض الهيموجلوبين E. C. S. يموتون في السنة الأولى من العمر، أما الناجون فيموتون قبل سن العاشرة.

والتغيرات العظمية في الجمجمة وبقية عظام الهيكل العظمي تنتج عن سببين: أولهما ، ازدياد نشاط نخاع العظم لإنتاج كمية أكبر من كريات الدم الحمراء ، وثانيهما ، تكون الجلطة في الوعاء الدموي في العظام الطويلة ، وعندما تظهر الكريات الحمراء غير الطبيعية في الدورة الدموية فإنها تأخذ شكلأً طويلاً صلباً وتجد صعوبة في التحرك داخل الشعيرات الدموية وبالتالي وقف تيار الدم في هذه الأماكن مما يؤدي إلى ظهور مواد تؤدي إلى تجلط الدم وينتج عن هذه العملية عدم وصول التغذية إلى العظم مؤدية بذلك إلى موته .

الجمجمة : The Skull

وتنتج التغيرات العظمية في الجمجمة من ازدياد نشاط نخاع العظم حيث ينتج عنه إعادة تركيب صفائح العظم بطريقة عمودية (شكل ٤٣). كما أن شكل الشعيرات الواقفة في صور الأشعة نادراً ما تكون واضحة مثل ثلاثيما العظمي وفي حالات لا تتعدي ٥٪ فقط (Loiaca na and Recder, 1969).

وكما هو الحال في مرض الثلاسيميا فإن أول العظام المتأثرة هي عظام الجبهة . وعلى عكس الثلاسيميا فإن عظام الوجه والجيوب الهوائية لا تتأثر . والتغيرات العظمية الناتجة عن تجلط الدم تظهر في الجمجمة وداخل العظام الطويلة ولكن ليس بنفس الكمية وهي تشبه تلك التغيرات في مرض لين عظام



(شكل ٤٣)
مرض الخلية المنجلية وتوضح الصورة إعادة
تركيب صفات العظيم والشعيرات الواقفة

الجمجمة المايلوما (Myeloma) بنسبة ٣٪ . وللتفرقة بين هذا المرض والأنيميا المنجلية فإن الأول (المايلوما) يحدث فقط في أناس جاؤوا

الخمسين من العمر بينما الثاني يظهر فقط في الأطفال الصغار.


العظام أسفل الجمجمة Postcranial Skeleton

تفتقر التغيرات التي تظهر على شكل تضخم في النخاع الشوكي في عظام ما تحت الجمجمة على العمود الفقري والخوض. ويظهر انضغاط فقرات العمود الفقري في حوالي ٣٠٪ من حالات الأنميما المنجلية (Carrol, 1957) وذلك لأن ازدياد نشاط نخاع العظم يؤثر أصلاً في الفقرات وعظام الخوض وهذه الظاهرة تمثل نقطة اختلاف بين الأمراض المختلفة التي تؤدي إلى ازدياد كثافة العظام الإسفنجية. كما أن شكل الفقرات في الأشعة يختلف بين الأنميما المنجلية وذلك ناتج عن التقدم في السن حيث تسمى ظاهرة فقرة السمكة. أما أسباب التغيرات العظمية في الأنميما المنجلية فهي بطيء الدورة الدموية وفقر تغذية العظم.

وما يسمى بمرض اليد والقدم في أنميما الخلية المنجلية لا يمثل نقطة خلاف بين هذا المرض والثلاثيبيا بينما يعتبر تجلط الدم خاصاً بمرض الأنميما المنجلية. وهناك أدلة قوية تبين وجود تجلط الدم في حوالي ٥٠٪ من الأشخاص المصابون بهذا المرض. ويظهر رد فعل العظام الطويلة بازدياد كثافة قشرة العظم مصحوباً بضيق مجاري العظام الداخلي وهذا عكس ما يحدث بالثلاثيبيا (شكل ٤٤).

والتجلط في حالات أنميما الخلية المنجلية يؤدي إلى موت العظم في مراكز التعظم وهذا يحدث في ٧٣٪ من الحالات. وتزداد هذه النسبة بازدياد مراكز التعظم المصابة إلى حوالي ١٦٪. بالإضافة إلى هذا، فإن الأفراد المصابين بالأنميما المنجلية يكونون عرضة لالتهاب العظام نتيجة للتجلط الحاصل في الأماكن القريبة كما أن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالتهاب نقص العظام والسبب في هذا هو التجلط الكامل في جدار الأمعاء وهو ما يفتح الطريق للميكروبات المعاوية مثل السالمونيلا للدخول في تيار الدم. وبالتالي الدخول في بعض الأنسجة في القدم خاصة منطقة الكاحل

ما يؤدي إلى التهاب العظم وانتشاره في طول العظام ولكن في حالات الخلية المنجلية فإن مراكز التعظم (الكراديس) هي الأكثر عرضة للالتهابات . وهكذا فإن الباحث البيأثولوجي عندما يجد ازيداد كثافة العظم الإسفنجية في الجمجمة يجب عليه أن يفحص عظام أسفل الجمجمة ليميز بين الثلاسيما والأنيميا المنجلية وأيضاً أنيميا نقص الحديد في المواد الغذائية .



(شكل ٤٤)

الخلية المنجلية - صورة بالأشعة تبين ازيداد كثافة قشرة العظم
مصحوباً بضيق النخاع الشوكي وهذا عكس ما يحدث
في مرض الثلاسيما العظمى

أنيميا نقص الحديد

Iron Deficiency Anemia

أنيميا نقص الحديد هي أكثر أنواع الأنيميا انتشاراً في العالم

(Davidson and Passmore, 1969) ولكن التغيرات العظمية نادرة ولا تدل على حدة المرض . وأنيميا نقص الحديد تشبه الثلاسيميا في كثير من الوجوه (شكل ٤٥) عدا أسباب المرض ، وكما يوحى الاسم فإن أنيميا نقص الحديد تنتج عن نقص الحديد في الطعام وعدم القدرة على امتصاص الحديد من الأمعاء وفقدان الحديد في الجسم أو الاختurbations في تمثيل الحديد الغذائي الناتج عن الإصابة بالميکروبات المعدية . كما أن النقص في بعض المواد الغذائية مثل البروتينات والأملاح المعدنية الضرورية لتكون الطعام يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض .



(شكل ٤٥)


صورة لرضيع في الشهر التاسع يقاوم من مرض أنيميا فقر الحديد - لاحظ مظهر الشعيرات الواقفة المشابهة لحالات الثلاسيميا والخلية المنجلية

لم يذكر الباحثون الأوائل مدى التغييرات التي تحدث في العظام الطويلة ، والمسطحة والقصيرة واقتصرت في تقاريرهم على التغيرات العظمية في الجمجمة فقط (Moseley, 1963) . والمتغيرات في عظام أسفل الجمجمة تشبه تلك الموجودة في الثلاسيميا ولكن لوحظ مؤخراً أن هذه التغيرات عادةً ما تحدث في الطفولة المبكرة نتيجة نقص الحديد في العظام أو لأمراض الجهاز الهضمي ، كما أنها تحدث في فترة الشباب نتيجة للإصابة ببعض الديدان المعاوية أو لفقدان الدم المزمن (Eng, 1959) . وقد لاحظ أكسوي ومساعدوه (Aksoy, et al, 1966) وجود العظم الإسفنجي في ٥٠٪ من حالات نقص الحديد الشديد في العظام القذالية بدلاً من عظام الجمجمة ولكن ليس بنفس الحدة الموجودة في المصابين بمرض الثلاسيميا (شكل ٤٦) وخاصة فيما يتعلق بالجيوب الأنفية . ونقطة الاختلاف هذه مهمة في عمليات التشخيص .

عظام أسفل الجمجمة : Post - Cranial Skeleton

وهذه العظام عادةً لا تتأثر بأنيميا نقص الحديد إلا أن عظام الكوع تكون في العادة مثقبة والصفائح الداخلية خشنة وخاصة في عظام الزند والساعد . وفي بعض الأحيان تتأثر عظام اليد والقدمين ولكن ليس بالحدة الملاحظة في الثلاسيميا العظمي . كما أن عدم تجلط الدم في العظم يفرقها عن أنيميا الخلية المنجلية ، وكذلك فإن تنفس العظم ليس شديداً بالفقرات العظمية ، كما أن انضغاطها ليس موجوداً (Aksoy et al, 1966) . ويجب أن تؤكّد أن نقص (سوء) التغذية لا يشمل عنصراً غذائياً واحداً فقط بل يشمل عناصر غذائية متعددة فمثلاً في دراسة قام بها لانزكوسكي (Lanzkowsky, 1968) على خمسة عشر طفلاً يتراوح أعمارهم ما بين سن ١٤ شهراً و ٣ سنوات وجد بأنه بالإضافة إلى أعراض نقص الحديد كان هناك ستة أطفال مصابون بمرض الكساح .

إن تحدب عظام الجمجمة في حالات الكساح المصاحب لفقدان الدم



(شكل ٤٦)

صورة بالأشعة لطفل هندي من سكان الولايات المتحدة - لاحظ تضخم العظام وخاصة عظم الجبهة

يختلف عن ذلك الناتج عن فقر الدم لوحده ، ففي الحالة الأولى نجد أن العظام تبرز أو تنتفخ للأمام في منطقة الجبهة أكثر من الحالة الثانية . وهذا ناتج عن وجود كمية أكبر من النسيج العظمي في عظم الججمحة الخارجي بينما تضخم المنطقة الوسطى فقط في العظم في مرض فقر الدم ، ويمتد هذا الانتفاخ من الجبهة حتى عظام الججمحة الخلفية عند المصابين بمرض أنيميا نقص الدم . أما في حالات مرض الكساح فإن الانتفاخ في عظام الجبهة والعظام والتأثير الجذري في التحام عظام الجبهة يؤدي إلى توسيع غير منتظم في منطقة العظم الوسطى .

الملاريا والأنيميا الوراثية Malaria and The Hereditary Anemias

أثبتت دراسات الأشروبولوجيا الوراثية أن الجينات المصابة والتي تسبب أمراض الثلاسيميا وأنيميا الخلية المنجلية وغيرها من أمراض الدم الوراثية موزعة جغرافياً بنسب معروفة وثابتة. ولكن كيف لهذه الجينات المهدلة أن تحافظ على وجودها في الجماعات الإنسانية؟ هذا السؤال حير الباحثين لعقود من الزمان، حتى أثبتت الباحثون الوراثيون أن المصابون بأنيميا البحر المتوسط أو أنيميا الخلية المنجلية يملكون حصانة أكثر من غيرهم ضد مرض الملاريا (Allison, 1954, 1961) وهذه الحصانة تعود إلى قصر حياة كريات الدم الحمراء لحاملي الجينات غير المتماثلة مما يؤدي إلى موت طفيلييات الملاريا في مجرى الدم، وعليه فإن التغيرات العظمية في فقر الدم الوراثي توفر المعلومات بطريق غير مباشر في مرض الملاريا عبر التاريخ. وقد عثر الباحثون في علم الأمراض القديمة على تغيرات عظمية في بعض الهياكل البشرية التي يعود تاريخها إلى بداية العصر الحجري الحديث تشبه إلى حد ما مرض الثلاسيميا وتؤيد فرضية وجود ملاريا متوطنة في تلك المنطقة (Angel, 1964, 1971 a, b, 1971). ونود القول هنا بأن كلا المرضى لا يزالان موطنان في اليونان وكذلك في مناطق إيطاليا الشمالية.

وفي إفريقيا عثر على بعض الجماجم التي تميز بوجود العظم الإسفنجي في النوبة وجنوب مصر في اثنين في المومياوات التي يعود تاريخهما إلى ٣٢٢ سنة و ٢٠٠ سنة قبل الميلاد. ويعتقد بعض الباحثين أن هناك أمراضًا أخرى كثيرة ربما تكون مسؤولة عن هذه التغيرات العظمية ويفترضون أنيميا نقص الحديد حيث إن الثلاسيميا وأنيميا الخلية المنجلية نادرة الحدوث في هذه المنطقة (Carleson et al, 1974).

وفي أوروبا تعود أقدم حالات العظم الإسفنجي إلى العصر البرونزي في مقاطعة ويلز في سنة (١٥٥٠ - ١٦٥٠ ق. م)، حيث لاحظ الباحثون وجود انفصال في جهتي عظام الجبهة في جمجمة طفل في السادسة ربما كان يعاني

من أنيميا نقص الحديد (Cule and Evans, 1968). وفي جمجمة طفل عمره ستان في السويد لوحظت تغيرات متشابهة للتغيرات التي عثر عليها في ويلز (Gejvall, 1960). وبالرغم من ذلك فيجب أن تكون حذرین عند تشخيص الثلاثيما العظمي استناداً إلى التغيرات العظمية وحدها. ففي العالم الجديد أدت الحفريات الأركيولوجية إلى العثور على العديد من الجماجم ذات العظم الإسفنجي، ويرى بعض الباحثين أن الثلاثيما هي السبب في وجود هذه التغيرات العظمية (Zaino, 1967)، إلا أن أبحاث أخرى للمترجم (انظر El - Najjar, 1978) برهنت على عدم صحة وجود هذا القول حيث إن الأحياء من هنود أمريكا الحمر لا توجد عندهم أبداً من أنواع الأنيميا الوراثية.

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بين الهنود الأمريكيين Iron Deficiency Anemia and American Indians

في دراسة قام بها عالم الأنثروبولوجيا الطبيعية الأمريكي أرنست هوتون (Hooton, 1930) على جماجم الأطفال من مقاطعة يوكاتان المكسيكية لاحظ وجود تغيرات عظمية إسفنجية في أربعة عشر طفلاً بين السادسة والثانية عشرة من قام بفحصهم أي بنسبة ٦٦٪. أما سول (Saul, 1972) فقد حصل على نسبة ٣٦٪ من جملة تسعين جمجمة من سكان دولة جواتيمالا في أمريكا اللاتينية. وفي دراسات أخرى عن سكان هذه المنطقة المعاصررين وجد شاتوك (Scrimshaw and Tejadce, 1933) وسکرمشاو وتجادا (Statistics Annual, 1973) وأنه بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من أنيميا نقص الحديد بينهم فإن هؤلاء السكان مصابون بنقص في فيتامين B₁₂ وأنهما نقص حامض الفوليك وأنيميا نقص البروتينات ونقص في فيتامين C. ويعتقد الدكتور سول (Saul, 1972, 1973) أن نفس مسببات هذه الأمراض كانت موجودة لدى السكان القدماء المصايبين بمرض العظام الإسفنجية، وهذا ربما يعود إلى عدم توفر كمية الحديد اللازمة لنمو الأطفال نمواً طبيعياً عند الأمهات. ويزداد هذا النقص خلال فترة الرضاعة الطويلة من حليب الأم الذي ينقصه الحديد اللازم

للنمو الطبيعي . ومما زاد من صعوبة امتصاص جسم الرضع لكمية الحديد القليلة المتوفرة في حليب الأم وجود الأمراض المعدية بنسبة عالية عند هؤلاء الأطفال . وفي هذا يقول شاتوك أن ٣٩٪ من جميع من ماتوا من الأطفال دون سن الخامسة في مقاطعة يوكاتان المكسيكية كانوا مصابين بالأمراض المعدية . وحتى في هذا الوقت فإن الأمراض والالتهابات المعدية متمثلة بوجود البكتيريا والديدان المعدية ما زالت شائعة (Samuels, 1965; Moore et al., 1969) (Alison et al., 1974) . كما لاحظ الباحثون أن غالبية طعام الهندباء قديماً وحديثاً يتكون من البقوف والذرة مع كميات قليلة جداً من الفواكه الأخرى واللحوم (Gann, 1918; Shattuck, 1933) ، وهذا الطعام غني بالنشويات وفقير في البروتينات وفيتامين C . ومع أن الذرة تحتوي على كميات لا بأس بها من الحديد إلا أنه غير قابل للامتصاص من الأمعاء لوجود كميات كبيرة من مادة حامض الفيتيك التي تمنع امتصاص الحديد بالإضافة إلى أن طهي هذه المواد بالماء لفترات طويلة يجردها من حامض الفوليك وفيتامين B₁₂ اللازمين لتكون كريات الدم الحمراء ، إضافة إلى أن فيتامين C مفقود في هذه الأطعمة وهو الذي يحتاجه الجسم لامتصاص الحديد من الأمعاء حيث يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض الأسقربوط (Lyrassse et al., 1969) . ولو جمعنا كل هذه العوامل لأدت إلى فقر الدم الشديد نتيجة نقص الحديد ، وهذا يوضح لنا أنه لحدوث فقر الدم الحديدي تتضافر عوامل عديدة منها الإصابة بالديدان المعدية ، وطرق الطهي التي تدمر ما يزيد على ٩٠٪ من حامض الفوليك وفيتامين B₁₂ ، والنقص في البروتينات وفيتامين C وسوء التغذية بشكل عام (Steibock, 1976) .

مرض العظام الإسفنجي في العيون

Cribra Orbitalia

هذا المرض غالباً ما يحدث في محجر العينين الاثنين في نفس الوقت ، وفيه يكون العظم مثقباً بثقوب كثيرة في سقف عظمة العين وعند حدوث هذا المرض يحدث تحلل وتكون عظم جديد - حيث إن ازدياد كثافة العظم في المنطقة الوسطى يؤدي إلى ظهور هذه الطبقة في سقف العين مما ينبع عنه ازدياد في كثافة عظم العين عدة مرات عن حجمها الطبيعي (شكل ٤٧ ، أ و ب) (Hengen, 1971).

التصنيف : Classification

وتقسم أعراض هذا المرض إلى ثلاثة أقسام حسب مظهر العظام الخارجي وهي تمثل ثلاثة مراحل للمرض (Nathan and Heas, 1966).


أولاً: التخدير ويتميز بوجود ثقوب أو فتحات صغيرة .

ثانياً: الغربالي ، وفيه تكبر هذه الفتحات وتتحد.


ثالثاً: المتسع . وفيه تكون كل الفتحات توحدت في فتحة واحدة كبيرة غير منتظمة بشكل شعاعي من منطقة أو اثنتين في عظمة العين وفيه يحدث امتصاص لنسخ العظم وازدياد في كثافة المنطقة الوسطى .

وهذه المراحل الثلاث تتشابه في الصغير والكبير وغالباً ما تكون الإصابة في كلتا العينين متشابهة .

ووصف هذا المرض لأول مرة العالم «ويلكر» (Welcker, 1888) حيث




A



B

(شكل ٤٧ أ)

صورة توضح مرض العظم الإسفنجي في محجر
العين - لاحظ الثقوب المسامية



(شكل ٤٧ ب)
صورة لطفل من كورنث باليونان
توضح مرض العظم الإسفنجي

وُجده في ٣,٧٪ من الجماجم الألمانية واعتقد أن هذا المرض منتشر في بعض الأجناس البشرية دون غيرها كما وجد أن المرض أكثر شيوعاً بين الأولاد الصغار السن حيث اكتشف حدوثه في ٥٢٪ من الأولاد مقابل ٦٪ بين البالغين (Moller Christenson and Sandison, 1963). وكثيراً من الإصابات بين الأولاد صغار السن تشفى مع تقدم العمر أو تؤدي إلى الوفاة المبكرة وهذا يفسر قلة حدوث المرض بين البالغين.

ولو فرضنا أن هذا المرض ومرض العظم الإسفنجي يحدثان نتيجة لفقر الدم الحاد أو المزمن فإن التغيرات في محجر العين تعتبر من المراحل الأولى لهذا المرض. وقد تسأله بعض الباحثين عن سبب ازدياد نشاط عظم العين أكثر من مراكز تكون الدم الأخرى. وفي الواقع فإن هذا النشاط يحدث في عظام كثيرة في نفس الوقت ولكنه لا يظهر إلا في العين بسبب رقة العظم هناك . (El - Najjar, et al 1976)

أسباب المرض Possible Cause of the Disease

وضعت فرضيات كثيرة لشرح أسباب هذا المرض نذكر منها:

١ - تهيج الغدة الدمعية Lacrimal Gland Irritation مما يؤدي إلى تهيج غشاء العظم . ومن الممكن أن تلعب هذه الغدة دوراً نتيجة الإصابة بمرض الجذام (Hogan and Zimmerman, 1962) ، وهذا يفسر سبب انتشار هذا المرض بين المصابين بالجذام . ومن الممكن أن يحدث هذا التهيج نتيجة الإصابة بالتهاب الغدة النكفية (Moller - Christensen and Sandison, 1963) ولكن ليس كل الحالات تحدث نتيجة لهذا التهيج حيث أن انتشار هذا المرض واسع ومتفرق في جميع أنحاء العالم (Steinbock, 1976) .

٢ - التراخوما Trachoma

لقد وجد الباحثون نسبة كبيرة من المصابين بهذا المرض يعانون من التراخوما التي تكثر بين الناس الذين يعيشون في ظروف بدائية حيث قدر أن ٥٪ من سكان العالم الذين يعيشون في ظروف صحية متدينة يصابون بالتراخوما خاصة في آسيا وإفريقيا (Henschen, 1966) . وهذه الإصابة مزدوجة في كل من العينين ، ولكن بالرغم من ذلك لا نستطيع اعتبار التراخوما من الأسباب الرئيسية لهذا المرض .

٣ - إصابة الحيوانات Comparative Primatology

وجد أن هذا المرض يصيب ١٤٪ من الغوريلا والشمبانزي والأورانجوثان وقرد مكاكيس . وتقع أهمية هذه الملاحظات في إمكانية استخدام هذه الحيوانات القريبة في تكوينها البيولوجي من الإنسان في التجارب العلمية لمعرفة سبب هذا المرض .

٤ - نقص التغذية Nutritional Deficiency

تشير معظم المعلومات المتوفرة إلى أن نقص التغذية قد يكون أحد الأسباب الرئيسية لهذا المرض حيث إن الاضطراب في التغذية يتاسب مع

حدوث هذا المرض في جميع الأعمار والأماكن ، ويفسر لماذا يصاب الأطفال أكثر من غيرهم نتيجة سوء التغذية ، كما أن تلازم حدوثه مع مرض الجذام يعود إلى سوء التغذية ونتائجها العكسية على البيولوجيا الإنسانية ككل (Henschen, 1956, 1961). وفي الهياكل العظمية اليونانية يرجع إنجل (Angel, 1964) هذا المرض إلى الثلاسيميا أو أنيميا نقص الحديد أو إلى كلتيهما. ومن الجدير باللاحظة عدم ملاحظة هذا المرض في أكثر من ٢٠٠٠ جثة مشرحة من السويد نظراً للظروف المعيشية الممتازة لذلك البلد (Henschen, 1961).

ولقد أثبتت بعض الدراسات (Nathan and Hass, 1966) أن هذا المرض يتزايد بين الناس الذين يعانون من سوء التغذية حيث لوحظ انتشار هذا المرض بين اليهود القدماء من سنة ١٣٢ - ١٣٥ قبل الميلاد وبنسبة ٩٥٪ بين الأطفال الذين عاشوا في تلك الفترة نتيجة للحصار الروماني . ولا يمثل نقص البروتين فقط في الغذاء سبباً لهذا المرض (Steinbock, 1976).

٥ - نقص الحديد

كما أسلفنا من قبل فإن نقص الحديد يعد من الأسباب الرئيسية لازدياد كثافة عظم الججمحة وتحrir عظم العين وهذا يفسر ازدياد نسبة هذا المرض في المناطق الاستوائية حيث يتناقص الحديد في العظام نتيجة لسوء التغذية أو الإصابة بالديدان المعاوية المختلفة مثل الأنكلستوما . ومن أسباب نقص الحديد أيضاً ندرته في الطعام أو وجود مواد تمنع امتصاصه من الأمعاء أو اقتصار تغذية الأطفال لفترات طويلة على الحليب فقط. من هنا يسهل علينا تفسير حدوث هذا المرض في المصابين بنقص الحديد وسوء التغذية ، حيث إن تحسين نوع الغذاء أدى إلى اختفاء هذا المرض . وقد دلت الحفريات بمنطقة النوبة القديمة على وجود هذا المرض في ٤٪ - ٢١٪ من ٢٨٥ شخصاً ربما نتيجة لاعتمادهم على الحبوب فقط كمورد أساسي للطعام وأيضاً لانتشار

الأمراض المعدية وخاصة وجود الديدان (Carleson et al, 1974) وبمقارنة
الجماعات البشرية لأناس يعانون من سوء التغذية اتضح أن نقص الحديد أهم
سبب لهذا المرض (Saul, 1972).

\

BIBLIOGRAPHY

- Aksoy, M., N. Camli, and S. Erdem: "Roentgenographic bone changes in chronic iron deficiency anemia"; *Blood*, 27: 677 - 685, 1966.
- Allison, A. D.: "Protection afforded by the Sickle - Cell trait against subtetian malarial infection", *Brit. Med. J.*, 1: 1187 - 1190, 1954.
- -----: Genetic factors in resistance to malaria", *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 91: 710 - 724, 1961.
- Allison, M. J., A. Pezzia, I. Hasegawa, and E. Gerszten: "A case of hookworm infestation in a pre-Columbian American", *Amer. J. Phys. Anthropol.*, 41: 103 - 106, 1974.
- Anderson, J. E.: "Late Paleolithic Skeletal remains from Nubia", pp. 996 - 1040 in F. Wendorf (ed.): *The Prehistory of Nubia*, vol. 2, Southern Methodist Univ. Press, Dallas, 1968.
- Angel, J. L.: "Osteoporosis: Thalassemia? *Amer. J. Phys. Anthropol.*, 22: 369 - 374, 1964.
- -----: "Porotic Hyperostosis, Anemias, Malaria, and marshes in the Prehistoric eastern Mediterranean", *Science*, 153: 760 - 763, 1966.
- -----: "Porotic Hyperostosis or Osteoporosis Symmetrica", in D. R. Brothwell and A. T. Sandison (ed.): *Diseases in Antiquity*, Thomas, Springfield, 1967.
- -----: "Early Neolithic Skeletons from Catal Huyuk: Demography and Pathology::: *Anatolian Studies*, 21: 77 - 98, 1971 a.
- -----: *Lerna, the People*, vol. 2, American School of Classical

- Studies at Athens and Smithsonian Institution Press, Washington, 1971 b.
- Armelagos, G. J.: "Future Work in Paleopathology", in W. D. Wade (ed.): *Miscellaneous Papers in Paleopathology*, Museum of Northern Arizona Technical Series, 7: 1 - 8, 1967.
 - Bohrer, S. P. and G. E. Connah: "Pathology in 700 Year old Nigerian bones", *Radiology*, 98: 581 - 584, 1971.
 - Boyd, M. F. (ed.): *Malariaiology*, 2 Vols., Saunders, Philadelphia, 1949.
 - Blumberg, J. M. and E. R. Kerley: "A Critical Consideration of Roentgenology and Microscopy in Paleopathology", in S. Jarcho (ed.): *Human Palaeopathology*, Yale Univ. Press, New Haven, 1966.
 - Bruce - Chwatt, L. J.: "Paleogenesis and Paleo-Epidemiology of Primate Malaria", *Bull. World Health Org.*, 32: 363 - 387, 1965.
 - Caffey, J.: "The Skeletal Changes in the Chronic Hemolytic anemias", *Amer. J. Roentgenol.*, 37: 293 - 324, 1937.
 - : "Cooley's erythroblastic anemia: Some Skeletal Findings in Adolescents and Young adults", *Amer. J. Roentgenol.*, 65: 547, 1951.
 - Carlson, D. S., D. P. Van Gerven, and G. J. Armelagos: "Factors influencing the etiology of Cribal Orbitalia in prehistoric Nubia", *J. Hum. Evol.*, 3: 405 - 410, 1974.
 - Carroll, D. S.: "Roentgen manifestations of Sickle Cell Disease". *Southern Med. J.*, 50: 1486 - 1490, 1957.
 - Cavalli - Sforza, L. L. and W. F. Bodmer: *The Genetics of Human Populations*, W. E. Freeman, San Francisco, 1971.
 - Chatterjee, S. and D. S. Chaudhury: "Pattern of eye diseases in Leprosy patients of North Ghana", *Internat. J. Leprosy*, 32: 53 - 63, 1964.
 - Cooley, T. B., E. R. Witwer and P. Lee: "Anemia in Children With Splenomegaly and Peculiar Changes in the bones", *Amer. J. Dis Child.*, 34: 347 - 363, 1927.
 - Cule, J. and I. L. Evans: "Porotic Hyperostosis and the Gelligaer Skull", *J. Clin. Path.*, 21: 753 - 758, 1968.

- Currarino, G. and M. E. Erlandson: "Premature fusion of the Epiphyses in Cooley's anemia", Radiology, 83: 656 - 664, 1964.
- Davidson, S. and R. Passmore: Human Nutrition and Dietetics, Williams and Wilkins, Baltipore, 4th ed., 1969.
- Dunn, F. L.: "On the antiquity of malaria in the Western Hemisphere", Hum. Biol., 37: 385 - 393, 1965.
- Eng, L. L.: "Chronic iron deficiency anemia with bone Changes resembling Cooley's anemia", Acta Haemat., 19: 263 - 268, 1958.
- Gann, T. W. F.: "The Maya Indians of Southern Yucatan and Southern British Honduras", Bur. Amer. Ethnol. Bull., 64, 1918.
- Gejvall, N - G.: Westerhus: Medieval population and Church in the Light of Skeletal Remains, Boktryckeri, Lund, 1960.
- Gray, P. H.: "Bone infarction in Antiquity", Clin. Radiol., 19: 436 - 437, 1968.
- Hamperl, H. and P. Weiss: "Über die Spongiosa Hyperostose an Schadeln aus Alt-Peru" Arch. Path. Anat., 327: 629 - 642, 1955.
- Hengen, O. P.: "Criba Orbitalia: Pathogenesis and Probable etiology", Homo, 22: 57 - 75, 1971.
- Henschen, F.: "Zur Palaopathologie des Schadels - Uber die sog. Criba Cranii, Verch. Dtsch. Ges. Path., 39 Tag, Stuttgart, 1956.
- -----: Criba Cranii, a Skull condition said to be of racial or geographical nature, "Path. Microbiol., 24: 724 - 729, 1961.
- Hogan, M. J. and L. E. Zimmermann: Ophthalmic Pathology, Saunders, Philadelphia, 1962.
- Hoooton, E. A.: Indians of Pecos Pueblo, Yale Univ. Press, New-Haven, 1930.
- -----: "Skeletons from the Cenote of Sacrifice at Chichen Itza", in: the Maya and Their Neighbors, Appleton-Century, New-York, 1940.
- Hrdlicka, A.: "Anthropological Work in Peru in 1913, With notes on Pathology of the ancient Peruvians", Smithson. Misc. Coll., 61: 57 - 59, 1914.
- Jarcho, S., N. Simon, and H. L. Jaffe: "Symmetrical Osteoporosis in a prehistoric Skull from New-Mexico", El Palacio, 72: 26 - 30, 1965.

- Johnson, L. C. and E. R. Kerley: "Report on Pathological Specimens from Mokapu", Appendix B in C. E. Snow: Early Hawaiians. an Initial Study of Skeletal Remains from Mokapu, Univ. Ky. Press, Lexington, 1974.
- Koganei, Y.: "Cibra cranii und Cibra Orbitalia", Mitt. Med. Fak. Tokyo, 10: 113 - 154, 1912.
- Lanzkowsky, P.: "Radiological Features of iron deficiency anemia", Amer. J. Dis. Child., 116: 16 - 29, 1968.
- Lawson, J. B. and D. B. Stewart: Obstetrics and Gynecology in the Tropics and Developing Countries, Arnold, London, 1967.
- Layrisse, M., J. D. Cook, C. Martinez, M. Roche, I. N. Kuhn, R. B. Walker, and C. A. Finch: "Food iron absorption: A Comparison of Vegetable and animal foods", Blood, 33: 430 - 443, 1969.
- Layrisse, M. and M. Roche: "The Relationship Between anemia and hookworm infection". Amer. J. Hyg., 79: 279 - 301, 1964.
- Livingstone, F.: Abnormal Hemoglobins in Human Populations, Aldine, Chicago, 1967.
- Loiacono, P. L. and M. M. Receder: "An Exercise in Radiologic-Pathologic Correlation", Radiology, 92: 385 - 394, 1969.
- May, J. M.: The Ecology of Human Disease, Md Publ., New-York, 1958.
- McLaren, D. S.: Malnutrition and the Eye, Academic Press, New-York, 1963.
- Møller - Christensen, V.: Bone Changes in Leprosy, Munksgaard, Copenhagen, 1961.
- Moller-Christensen, V. and A. T. Sandison: "Usura Orbitae (Cibra Orbitalia) in the Collection of the University of Glasgow", Path. Microbiol., 26: 175 - 183, 1963.
- Moore, J. G., G. F. Fry, and E. Englert: "Thorny-Headed Worm infection in North American Prehistoric man, Science, 163: 1324 - 1325, 1969.
- Moore, S.: "Bone Changes in Sickle anemia with a note on Similar changes in Skulls of ancient Mayan Indians", J. Missouri Med. Assn., 26: 561 - 564, 1929.

- Moseley, J. E.: *Bone Changes in Hematologic Disorders*, Grune and Stratton, New-York, 1963.
- -----: "The Paleopathological riddle of (symmetrical Osteoporosis)", Amer. J. Roentgenol., 95: 135 - 142, 1965.
- -----: "Radiographic Studies in hematologic bone disease: Implications for Paleopathology", in S. Jarcho (ed.): *Human Palaeopathology*, Yale Univ. Press, New-Haven, 1966.
- Motulsky, A. G.: "Metabolic Polymorphisms and the role of Infectious disease in human evolution", Hum. Biol., 32: 28 - 61, 1960.
- Nathan, H. and N. Hass: "Anthropological data on the Judean Desert Skeletons", in E. Goldschmidt (ed.): *Genetics of Migrant and Isolate Populations*, Williams and Wilkins, Baltimore, 1963.
- -----: "Criba Orbitalia. a bone Condition of the orbit of Unknown nature", Israel J. Med Sci., 2: 171 - 191, 1966 a.
- -----: "On the Presence of criba Orbitalia in apes and Monkeys", Amer. J. Phys. Anthropol., 24: 351 - 360, 1966 b.
- Pizzi, T. and H. Schenone: "Hallazo de heuvos de Trichuris Trichiura en contenido intestinal de un Cuerpo Arqueologico incaico", Boletin Chileno de Parasitologia, 9: 73 - 75, 1954.
- Reynolds, J.: "A re-evaluation of the 'Fish vertebra' sign", Amer. J. Roentgeol., 97: 696 - 707, 1966.
- Rodger, F. C. and H. M. Sinclair: *Metabolic and Nutritional Eye Diseases*, Thomas, Springfield, 1969.
- Samuels, R.: "Parasitological Study of Long-dried fecal Samples", Mem. Soc. Amer. Arch., 19: 175 - 179, 1965.
- Saul, F.: "The Human Skeletal remains of Altar de Sacrificios", Papers of the Peabody Mus. of Arch. and Ethnol., Vol. 63. No. 2, Harvard University, 1972.
- -----: "Disease in the Maya area: The Pre-Columbian evidence", in T. P. Culbert (ed.): *The Classic Maya Collapse*, Univ. Of New-Mexico Press, Albuquerque, 1973.
- -----: Personal Communication, 1974.
- Scrimshaw, N. S.: "An Epidemiologic approach to the causes and control of the Nutritional anemias", Vitamins and Hormones: Advances in Research and Applications, 26: 705 - 716, Academic

- Press, New-York, 1968.
- Scrimshaw, N. S. and C. Tejada, C.: "Pathology of Living Indians as Seen in Guatemala", in T. D. Stewart (ed.): *Physical Anthropology*, Vol. 9, of *Handbook of Middle American Indians*, Univ. of Texas Press, Austin, 1972.
 - Shattuck, G. G.: *The Peninsula of Yucatan; Medical, Biological, Meteorological, and Sociological Studies*, Carnegie Institution, Washington, D. C., 1933.
 - Smith, E. G. and W. Jones: "Report on the Human Remains", *Archaeological Survey of Nubia, Report of 1907 - 1908*, Cairo, Ministry of Finance, 1910.
 - Snow, C. E.: "Indian Burials from St. Petersburg, Florida", *Contrib. of the Florida State Museum*, 8, 1962.
 - Still, G. F.: *Common Disorders and Diseases of Childhood*, Oxford Univ. Press, London, 1915.
 - Toldt, C.: "Über Welcker's cribs Orbitalia", *Mitt. Anthropol. Ges. Wien.*, 16: 20, 1886.
 - Trowell, H. C. and D. B. Jelliffe: *Diseases of Children in the Subtropics and Tropics*, E. Arnold, London, 1958.
 - Virchow, R.: "Über die Puerperalen Krankheiten", *Verb. Ges. Geburtsh.*, 3: 151, 1848; Cited by Henschen, 1961.
 - Viteri, F. E., J. Alvarado, D. G. Luthringer, and R. P. Wood: "Hematological Changes in Protein calorie malnutrition", *Vitamins and Hormones: Advances in Research and Applications*, 26: 573 - 615, Academic Press, New-York, 1968.
 - Wakefield, E. G., S. C. Dellinger, and J. D. Camp: "Study of Osseous remains of mound builders of eastern Arkansas", *Amer. J. Med. Sci.*, 193: 488 - 495, 1937.
 - Welcker, H.: "Cibra Orbitalia, ein ethnologisch-Diagnostisches Merkmal am Schädel Mehrerer Menschenrassen", *Arch. Anthropol.*, 17: 1 - 18, 1888.
 - Williams, H. U.: "Human Paleopathology with some original observations on symmetrical osteoporosis of the Skull", *Arch. Path.*, 7: 839 - 902, 1929.

- Wolff, E.: **The Anatomy of the Eye and Orbit**, H. K. Lewis, London, 1954.
- World Health Organization Technical Report Series, No. 405: "Nutritional anemias: Report of a WHO scientific group", Geneva, 1968.
- World Health Statistics Annual for the year 1970, World Health Organization, Genava, 1973.
- Zaino, D. E. and E. C. Zaino: "Cribra Orbitalia in the aborigines of Hawaii and Australia", Amer. J. Phys. Anthropol., 42: 91 - 94, 1975.
- Zaino, E. C.: "Paleontologic Thalassemia", Ann. N. Y. acad. Sci., 119: 402 - 412, 1964.
- -----: "Symmetrical Osteoporosis, a Sign of Severe anemia in the pre-historic Indians of the Southwest", in W. D. Wade (ed.): **Miscellaneous Papers in Paleopathology: Museum of Northern Arizona Technical Series**, 7: 40 - 47, 1967.
- Zilva, S. S. and G. S. Still: "Orbital Hemorrhage with Proptosis", Lancet, I: 1008, 1920.

الفصل الحادي عشر

الذرة والمalaria والأنيميا في سكان العالم الجديد

Maize, Malaria and Anemias in the pre-Columbian New-World

المقدمة : Introduction

يبحث هذا التقرير وجود وانتشار مرض ازدياد نمو العظام المعروف باسم العظام الإسفنجية Porotic Hyperostsis في عصور ما قبل وبعد التاريخ لدى سكان العالم الجديد . والعظم الإسفنجية هي مصطلح وصفي يعني تغيراً غير طبيعي في عظام جمجمة الرأس تجعلها تظهر بصورة إسفنجية أو غربالية مسامية ، ومن خلال أشعة أكس تظهر هذه الحالة مشابهة للحالة الوراثية لتحلل الدم الناجم عن نقص الحديد El - Najjar, Lozoff and Ryan and El-Najjar and Robertson(1976) 1975; El-Najjar Ryan, turner and Lozoff, 1976;

هناك دلائل من العالم القديم تشير إلى أن وجود هذا المرض يتلازم مع وجود مرض الخلية المنجلية ومرض الثلاسيميا (Angel. 1966) ، كما يتطابق وجود هذه الأمراض مع وجود المalaria. أما في مجتمع الهندوamerican المختلقة فلم تسجل أية حالة ، وبما أن النجار ومساعديه قد أوضحاوا لنا في سلسلة المقالات المذكورة أعلاه عدم وجود أي من هذين المرضين الوراثيين في جماعات الهندوamericanيين الذين عاشوا في عصور ما قبل التاريخ ، فإننا لا نستطيع إثبات وجود مرض العظام الإسفنجية في أحفاد هذه الجماعات كنتيجة لهذه الأمراض الوراثية ذلك أن الاعتماد الكلي على نوع غذائي واحد مثل الذرة قد يكون هو المسؤول عن حدوث مثل هذه الحالة المرضية. وفي هذه الدراسة سوف نبين أن الخواص الغذائية للذرة ، وطرق طحنها وتصنيعها تعتبر هي الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض

العظام الإسفنجية في الجماعات الإنسانية التي يقتصر غذائها الرئيسي على الذرة.

طرق ومواد البحث : Materials and Methods

أجريت هذه الدراسة على ٣٣٦١ جمجمة من جماجم الأطفال والبالغين تمثل سبع مناطق جغرافية في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا الجنوبية، وقد فحصت هذه الجمجم لمعرفة ما إذا كانت مصابة بمرض العظام الإسفنجية أم لا.

وت تكون مجموعة الهياكل العظمية في الدراسة من العينات التالية: ٧٩٢ أسكيمو و٤٩٨ من شرق الولايات المتحدة و٣٢ من جنوب غرب الولايات المتحدة في متحف التاريخ الطبيعي بواشطن، ١٧٧ من جنوب غرب الولايات المتحدة في قسم الأثربولوجيا بجامعة ولاية أريزونا، ٥٤ من جنوب غرب الولايات المتحدة في متحف شمال أريزونا، ٤٧٨ من هندوبورو و٢٩٥ من هندوب ساحل شرق غرب الولايات المتحدة و٧١ هندوبول و١٨٩ هندوبولي في متحف الفيلد بمدينة شيكاجو و٤٨٣ هندوريكارا في جامعة تينيسي. وقد استخدم الباحث معادلة $\times 2$ لاختبار فيما إذا كان الاختلافات تعود إلى أصل بيولوجي أو أنها اختلافات عارضة.

النتائج : Results

بنت نتائج هذه الدراسة وجود هذا المرض في ٣٩٧ جمجمة أي بما يوازي (١١٪) من الجماجم المدرستة. كما لوحظت أعراض المرض في ١٨٠ حالة أي بما يوازي (٤٥٪) في العظام الجدارية والجبهوي و٩٨ أي ما يوازي (٢٤٪) في محجر العينين و١١٩ أي بما يوازي (٣٠٪) في محجر العينين والعظام الجدارية. كما بنت النتائج أن نسبة هذا المرض كانت أعلى بكثير لدى الذين يعتمدون على الذرة كغذاء رئيسي بالمقارنة مع من كانوا يعتمدون على مواد غذائية غنية بالحديد والبروتين والمعادن والفيتامينات. ولم تبين النتائج آية فروق بين الذكور والإإناث ولكن النسبة كانت دائمًا أعلى بكثير لدى الأطفال منها لدى البالغين.

جدول يوضح الفنات المعاصرة والجنبية للمصاين بعرض النظام الإسقنجي من خلال ١٤ عينة مخصوصة.

		مجموع الإناث		مجموع الذكور		مجموع البالغين		الأطفال		مجموع على الذرة	
		١٠/٤٨٣	٢.١	٨/١٦٣	٤.٩	٢/٣٢٠	٠.٦	٠/١٦٠	٠.٠	٢/١٦٠	١.٢
Eastern U. S.		١٨/٤٩٨	٣.٦	٥/٦	٠.٠	١٨/٤٩٢	٣.٧	٢/٢٣٨	٠.٨	١٦/٢٥٤	٦.٣
Eskimos		٤٨/٧٩٢	٦.١	١٢/٤٢	٢٨.٦	٣٦/٧٥٠	١.٨	١٥/٤١١	٣.٦	٢١/٣٣٩	٦.٢
Gran Quivira		٥/١٧٧	١٣.٨	٥/٦٦	١٨.٢	٥/١١١	١٣.٥	٥/٤٧	١٥.٥	٥/٦٤	١٢.٥
Hopwell Indians		٢/٧١	٢.٨	٢/١١	١٨.٢	٥/٦٠	٠.٠	٥/٤٠	٠.٠	٥/٢٠	٠.٠
Mexico/ Historic		١/٥٢	١.٩	٥/٠	٠.٠	١/٥٢	١.٩	٥/٢٣	٠.٠	١/٢٩	٣.٤
Navajo Reservoir		١١/٩٢	١٢.٢	٧/٤٤	١٥.٩	٥/٤٨	١٠.٤	٣/٢٨	١٠.٧	٤/٢٠	١٠.٠
Northwest											
Coast Indians		١٠/٢٣٩	٢.٩	١/١٧	٥.٩	٩/٢٤٢	٣.٧	٢/١٤١	١.٤	٧/١٠١	٦.٩
Canyon de Chelly											
a. Basketmakers		٦٧/١٣٦	٤٩.٣	٣٦.٥٠	٧٢.٠	٣١/٨٦	٣٦.٠	٩/٣٤	٢٦.٥	٢٢/٥٢	٤٢.٣
b. Pueblos		١٣/٧٨	٥٥.١	١٥/١٧	٨٨.٠	٢٨.٦١	٤٥.٩	١٦/٣٩	٤١.٠	١٢/٢٢	٥٤.٥
Chaco Canyon		٢٣/٣٢	٧١.٨	١٠/١٢	٨٣.٣	١٣/٢٠	٦٥.٠	٤/٧	٥٧.١	٩/١٣	٦٩.٢
Hopi Indian		١٢/١٨٩	٦.٣	٣/٥	٦٠.٩	٩/١٨٤	١.٩	٤/٩٦	٤.٢	٥/٨٨	٥.٧
Inscription House		١٣/٢٤	٥٤.٢	٧/١١	٦٣.٦	٦.١٤	٤٦.٢	٢/٤	٥٠.٠	٤/٩	٤٤.٤
Peruvian Indian		١٤٠/٤٧٨	٢٩.٣	٤٤/٥٧	٧٧.٢	٩٦/١٢١	٢٢.٨	٥٧/٢٤٦	٢٣.٢	٣٩/١٧٥	٢٢.٣

مناقشة Discussion

قبل أن نفسر أسباب وطبيعة مرض العظام الإسفنجية سوف نعطي فكرة مبسطة عن دور الملاриا والأنيميا والذرة في وجود وانتشار هذا المرض.

New World Malaria مalaria العالم الجديد

الملاриا مرض معد يتميز بالحمى الشديدة المتقطعة التي يتبعها حالة من برودة الأطراف والعرق الشديد. وفي الحالات المزمنة نجد تضخماً في الطحال وهزازاً ونقصاً حاداً في الوزن. وقد كانت الملاриا سبباً في وفاة الكثير من الناس خلال عصور التاريخ المختلفة. ويقول دن ولامبرشت (Dunn and Lambrecht. 1963) إن مرض الملاриا في العالم الجديد يصيب فقط الإنسان وبعض أنواع القرود. كما أن هناك أربعة أنواع من الملاриا من الممكن أن تؤدي إلى الإنسان وهي P. Ovale, P. V., P. Malaria, P. Falciparum . وفي رأي كوبرن (Cockburn. 1967) فإن الأنواع الثلاثة الأولى فقط توجد في العالم الجديد.

وهناك سؤال يطرح نفسه وهو: هل وصلت الملاриا إلى أمريكا قبل كولومبس؟ والإجابة على هذا السؤال تعتمد على أدلة قليلة وغير مباشرة تقول بأن بعوضة الملاриا Anopheles كانت موجودة في العصور القديمة وذلك نظراً لوجود المستنقعات والمياه الراكدة في مناطق كثيرة من العالم الجديد كمنطقة الجنوب الغربي للولايات المتحدة والتي تعتبر بيئه مناسبة لتكاثر البعوض. ولكن هذه ليست أسباباً كافية لوجود مرض الملاриا وذلك لأن وجود مسبب المرض لا يعني بالضرورة وجود المرض نفسه.

وفيما يتعلق بوجود مرض الملاриا في العالم الجديد سوف نناقش أربعة افتراضات ربما تفسر وجود هذا المرض في العالم الجديد.

١ - إن نوعي الملاриا P. simium, P. brasiliandum تطوراً في قردة العالم الجديد فيماأخذ النوعين الآخرين P. malaria, P. vivax شكلهما الجديد في العالم القديم.

٢ - إن *P. simium*, *P. brasiliandum* المتوطنين في قرود العالم الجديد انتقلا إلى جماعة الهنود الحمر عندما وصلا إلى المناطق الاستوائية في العالم الجديد ثم انتشرتا تحت اسم *P. vivax* و *P. malaria*. عند اتصالهما مع الأوروبيين.

٣ - هناك من يفترض وصول جرثومة الملاريا *Plasmodia* إلى أمريكا عبر المحيط الهادئ بواسطة البولينيزيين *Polynesians* أو الفايكنج *Vikings* عبر المحيط الأطلسي.

٤ - إن جرثومة الملاريا دخلت العالم الجديد بعد عام ١٤٩٢ م بواسطة الأوروبيين.

والافتراض الأول والثاني مرفوضان (Dunn, 1965) وذلك لنقص الأدلة وأيضاً لعدم وجود أية أدلة تبين انتقال مرض الملاريا من القرود إلى الإنسان بواسطة البعض حتى في ظروف مخبرية دقيقة. وكذلك فإن هذين الافتراضين يقترحان وجود تطورين وليس تطوراً واحداً في مجمل التطور البروتوزوي يتسببان في هذا المرض في ظروف بيئية واحدة في نصف الكرة الكروي وهذا الافتراض أيضاً مرفوض حسب سجلات التاريخ التطوري (Dunn, 1965).

أما الافتراض الثالث فهو غير مقبول أيضاً وذلك لأنه لا يمكن أن تهاجر جرثومة الملاريا عن طريق البولينيزيين أو الفايكنج، لأن البولينيزيين شعوب لا تحمل مرض الملاريا وفي الوقت الحاضر لا يوجد أي دليل تاريخي على أن المرض كان موجوداً في عصور ما قبل التاريخ. أما الفايكنج فكانوا قد نزحوا إلى العالم الجديد قبل خمسة سنتين من وصول كولمبس، وفي وقت كانت أوروبا فيه حالة من الملاريا (Ingsted, 1964).

أما الاحتمال الذي يفترض أن الملاريا وصلت مع الشعوب الهندية التي قدمت من آسيا عبر مضيق بريغ من سيريريا فقد أبعد بواسطة كل من (Jancho, 1964) و (Cokburn, 1963) و (Angel, 1966) (Dun, 1965).

لأن المناخ البارد في الشمال الغربي لشمال أمريكا غير مناسب للانتقال أو المحافظة على حياة البعوض الذي يحتاج لدرجة حرارة تتراوح ما بين ٧٢ إلى ٨٦ درجة فهرنهايتية. ويقول كوبرن إن المسيرة البطيئة عبر مناطق البرد القارس قضت على سجل جرائم الملاريا التي يحتمل أن يكون قد حملها مستوطنو العالم الجديد من سيبيريا. وقد صاحب نزوح الأوربيين الذين أتوا من جنوب إنجلترا حيث كانت الملاريا موطنة هناك وبعد ذلك أصبحت الملاريا موطنة في العالم الجديد.

افتراض الأنيميا والملاريا The Anemia Malaria Hypothesis

هناك أربعة أنواع من جرثومة الملاريا المسئولة عن إصابة الإنسان منتشرة في العالم ، لكن الأنيميا الوراثية المتواجدة مع الملاريا مقتصرة جغرافياً على مناطق معينة . ففي العالم القديم وجد أن أنيميا الخلية المنجلية والثلاثيمية وغيرها من أمراض فقر الدم الوراثية تصاحب وجود الملاريا وهذا يعود إلى مقاومة من يحملون الجينات غير المتماثلة لمرض الملاريا (Ceppellini, 1955, Dunn, 1965) وحسب رأي كل من (Angel Chernoff, 1955) فإن الملاريا انتشرت في منطقة تواجد البعوض في العالم القديم في نفس وقت انتشار مرض العظام الإسفنجية لكنها لم تتفذ إلى العالم الجديد . في الأناضول وقبرص واليونان ، ومنذ القرن السابع حتى القرن الثاني قبل الميلاد كان مرض العظام الإسفنجية منتشرًا بين المزارعين الذين يعيشون حول المستنقعات ولكن نادرًا ما تنتشر بين الصيادين في الأرض الجافة والصخرية (Angel, 1966) من العصور الملتوية حتى العصور الرومانية فإن حدوث مرض العظام الإسفنجية يزداد مع ازدياد وجود الملاريا في البيئات الزراعية الفقيرة (Angel, 1966) .

أنيميا العالم الجديد New World Anemia

يرى بعض العلماء أنه من الممكن إثبات عدم وجود الملاريا خلال فترة ما قبل الاكتشاف وذلك بعدم وجود بعض الأمراض الوراثية المرتبطة

بالملاриا في الهنود الحمر الأميركيتين ، كما أن توزيع وانتشار هذه الأمراض ، كالأنيميا والخلية المتجلبة والثلاثيميا وبعض الأنزيمات الوراثية يتفق مع الفرضية التي تشرح كيفية ظهور الملاриا في العالم الجديد . ولا توجد أية دلائل على وجود الهيموجلوبينات غير الطبيعية (الشاذة) في الهنود الحمر الخلص . (Blumberg. 1961, Motulsky. 1960, Lisker, Loria and Cordova. 1965).

غير أن هناك بعض الهيموجلوبينات الشاذة في بعض الجماعات الهندية الأمريكية (Livingstone. 1967) . فعلى سبيل المثال فإن وجود الهيموجلوبين S في الهند السيمانول في جنوب الولايات الجنوبية وفي بعض قبائل الأوكاكا في المكسيك جاء نتيجة التزاوج (الاختلاط) بين هذه الجماعات والأمريكان النزوح الذين هم من أصل إفريقي (Livingstone. 1967) . وفي أمريكا الجنوبية فإن المجموعات الهندية الوحيدة التي تظهر فيها الأمراض الوراثية السابق ذكرها هي غيانا حيث اكتشف كاباناس (Cabannes. 1965) هيموجلوبين S والثلاثيميا في قبائل الهند في غينيا الفرنسية . أما الهند في سورينام Surinam فلديهم نسبة ضئيلة توازي ٥٪ تقريباً من الهيموجلوبين S (Jonxis 1959) . ومرة أخرى ثبت أن اختلاط (تزاوج) هذه الجماعات مع جماعات من أصل أوروبي أو إفريقي هو السبب .

بالنسبة لافتراض زينو (Zaino, 1964) بأن مرض العظام الإسفنجية في جماجم الهند الحمر يعود إلى مرض الثلاثيميا الذي وصل إلى سكان العالم الجديد مع المهاجرين الأصليين ، لا يوجد أي دليل قاطع يؤكد هذه الفرضية عند جماعات الهند الحمر الأمريكية والتي وجدت فيهم أعلى نسبة من مرض العظام الإسفنجية في الجمجمة لأنه لا يوجد لديهم أي نوع من أمراض الهيموجلوبين الشاذة المذكورة . ولهذا فإن الفرضية مرفوضة وذلك لأن احتمال وجود هذه الأمراض لدى الهند القدماء بعيد حيث إن هناك نسباً عالية جداً من هذا المرض لدى العديد من القبائل الهندية في أجزاء مختلفة من العالم الجديد . ومع أن هناك بعض أمراض الدم مثل Cyanotic Congenital

Oisease Hereditary Spherocytosis. Vera و Heart مشابهة للتغيرات التي تصاحب أمراض أنيميا الخلية المنجلية والثلاثيميا وأنيميا نقص الحديد (انظر 1975 Najjar et al. EL) فإن الأنيميا التي تحصل بسبب Severe Hereditary Amebiasis Dysentary نقص الأكسجين قد تسبب تغيرات بالعظام مشابهة للعظام الإسفنجية ذلك أن نسبتها ضئيلة جداً ولا تفسر كمية توزيع مرض العظام الإسفنجية في العالم الجديد.

الذرة Maize

تشير الدلائل النباتية والتاريخية والأثرية إلى أن موطن الذرة هو المكسيك (Weaver, 1972) ، وأن أقدم تاريخ عرفت فيه الذرة كان ٥٢٠٠ قبل الميلاد تقريباً بوادي تهوكان بالمكسيك (Wilkes, 1972) . كما عثر في شمال أمريكا على أقدم أنواع الذرة التي وجدت في كهف بات Bat Cave في ولاية نيومكسيكو الأمريكية. ويقول الدكتور دك (Dick, 1965) أنه لا يوجد أي دليل على أن الذرة ظهرت لأول مرة في كهف بات ويعتقد أن الذرة استقدمت إلى شمال أمريكا كنبات مزروع.

وتعتبر الذرة أحد مصادر الغذاء الرئيسية لدى سكان العالم الجديد، ولكنها في نفس الوقت تعتبر فقيرة في المواد الغذائية هذا لأن الذرة، إذا لم تضاف إلى مواد غذائية أخرى، فإنها تعتبر سلعة فقيرة غذائياً. على سبيل المثال يحتوي لب الذرة المجفف على العناصر الغذائية التالية: من ٦,٨٪ إلى ١٢٪ بروتين، ٥٪ نشاء، ١٪ ماء، ٤٪ دهنيات، ١٪ ألياف (Heinz, 1966) . وهناك أربعة أنواع من البروتينات موجودة بالذرة هي البيومين Albumin والجلوبولين Globulin والزيون Zein والجلوتيلين Glutelin . وتفتقذ الذرة إلى الحمضين الأمينيين الضروريين وهما اللايسين Lysine ، والتربيوفان Tryptophane والناسايسين Niacin من مجموعة فيتامينات B . إضافة إلى ذلك ، فإن بروتين الذرة يعتبر غير كامل وأهميته الحيوية ضئيلة (Behar, 1968) و (Catz, Hediger and Vallery 1974).

والقيمة الغذائية للذرة محدودة بعاملين : أولهما ، المعالجة القلوية وأثارها على نوعية وكمية البروتين والمعادن ، والثاني ، وجود بعض المركبات وخصوصاً حمض الفايتك Phytic acid الذي يمنع امتصاص الجسم للحديد . كما أن المعالجة القلوية للذرة تؤدي إلى الإقلال من قيمتها الغذائية ، هذا وقد نوقشت هذه النقطة من قبل العديد من العلماء من أمثال Cravioto. Anderson, Lockhart, De Miranda and Harris, 1945. Bressani, Paz and Scrimshaw (1958)

يقول كرافيوتو ومساعدوه أن خبز الذرة يخضع في العادة للنظام التالي : توضع الذرة في محلول جيري وتسخن لدرجة ٨٠° مئوية لمدة ٤٥ - ٢٠ دقيقة وترك إلى اليوم التالي حيث ينفصل السائل عن الذرة ، ثم تغسل الذرة بالماء عدة مرات ، وبعد ذلك تطحن وتشكل على هيئة كعك وتطبخ في أوعية حديدية حارة . وتقع أهمية محلول الجيري في أنه ينبغي أن يكون محلول هيدروأكسيد الكالسيوم المخفف الذي هو محلول قلوي .

وقد لوحظ أن المعالجة بالمحلول الجيري وعملية الطبخ تقلل من النوعية الغذائية للذرة . وقد أشار كرافيوتو ومساعدوه في تقريرهم عن آثار المعالجة القلوية إلى التغيرات التالية : ازدياد تركيز الكالسيوم إلى نحو ٢٠٪ والفسفور بنسبة ١٥٪ والحديد بنسبة ٣٧٪ كما لوحظ أيضاً فقدان القليل من الثiamين Thiamin والناسايسين Niacin . ويوضح بريسانى ومساعدوه أن فقدان الكلي قد يصل إلى ٦٥٪ للثiamين Thiamin و ٣٢٪ للرايبوفليفين Riboflavin و ٣١٪ للناسايسين Niacin و ٢١٪ للكاروتين Carotene و ١٠٪ للنيتروجين Nitrogen ، بالإضافة إلى كمية قليلة من الدهون والألياف . كما أوضح بريسانى ومساعدوه أن المعالجة القلوية للذرة تقلل الأحماض الأمينية الضرورية عدا اللايسين Lysine بالإضافة إلى زيادة كبيرة في تركيز الكالسيوم .

دور عنصر الحديد : The Role of Iron

لقد بين الباحثون (Layrisse et al, 1969) أن نسبة الحديد في الذرة قليلة

وكذلك نسبة امتصاص الحديد حيث تقدر بما يقارب ٥٪ ، وبعض أنواع الذرة لا يوجد فيها حديد على الإطلاق (Garreston and Convad, 1967) . وإذا استفيد من الحديد الموجود في الذرة بواسطة تناول الطعام فإن كميته القابلة للامتصاص تقل أيضاً على عكس الحديد الذي يوجد في مصادر حيوانية (Layrisse et al, 1969) والموجود بكميات كبيرة بالإضافة إلى أن مقدرة الجسم على امتصاص الحديد تزداد بحيث يستفيد الجسم منه في بناء الهيموجلوبين -Torres and Torres and Layrisse, 1974)

هذا وقد لاحظ الباحثون أيضاً أن وجود عنصر الكالسيوم يمنع امتصاص الحديد (Wintrobe, 1967) نظراً لتنافسهما خلال عمليات النقل النشطة Hegsted, Fish and Kenny (1949) وقد لاحظ (Mannis and Schacter, 1962) أن امتصاص الحديد من قبل فئران أعطيت وجة ذرة قد نقص عند إضافة أملاح الفوسفور إلى الوجة ، كما بين أندرسون (Anderson, 1939) أن وجود أملاح الفوسفور لا تنقص امتصاص الحديد فقط ولكنها تقلل من تكون الهيموجلوبين أيضاً . وقد أكدت تجارب أمين وهجستد (Aumin and Hegsted 1971) هذه النتيجة . كما لوحظ أيضاً أن حمض الفيتيك Phytic acid يؤثر على امتصاص الحديد لدى الإنسان (Hussein and Patwardhan 1959) . وبما أن الذرة تفتقد أنزيم الفايتيز Phytase الذي يحلل حمض الفيتيك فإن الحديد الموجود في الذرة ، حتى ولو كان بنسبة قليلة ، لا يتمتصه الجسم ولا يستفيد منه (Mollgard et al, 1946, Moore, 1968) . وتعتبر الوجبات النشوية بشكل عام من الأسباب التي تمنع امتصاص الحديد (Amin and Hegsted, 1971) والذين يعتمدون على المواد النشوية فقط كمصدر رئيسي للغذاء يعانون من الأنemia بسبب قلة الحديد في هذه المواد ونقص كمية البروتين الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد وقد تسوء الحالة الغذائية الصحية أيضاً بسبب قلة مستوى الـ Tryptophane و Lysine في الذرة .

إن النمو السريع للأطفال والأولاد ينبع عند ازدياد الحاجة إلى الحديد . وخلال العام الأول ، يزداد حجم الدم إلى ثلاثة أضعافه كما

تضاعف كمية الهيموجلbin . والمشكلة عند الأطفال ليس في وجود الحديد بل في بقائه في الجسم ، وخلال السنة أو الشهرين الأولى من حياة الطفل فإن حاجة الجسم إلى النمو تتجاوز الكمية الموجودة في الطعام العادي (Josephs, 1934) وما لم يضاف الحديد من مصادر غذائية أخرى إلى حليب الأطفال فإن كمية الحديد المخزون في الجسم تنقض ، وتكون كمية الحديد غير كافية لسد حاجات النمو الطبيعي للطفل .

وإذا اتفقنا مع ما اعتقاده جرانك (Granick, 1946) ، من أن امتصاص الحديد يوزع حسب حاجة الجسم ، وبما أن الأطفال هم الأكثر حاجة إلى النمو ، فإنهم أيضاً الأكثر عرضة إلى نقص الحديد. إضافة إلى هذا فإن هناك بعض الأمراض التي تصيب الأطفال وتتسبب أيضاً عن نقص الحديد ونذكر منها: Congenital Anomalies و Gastrointestinal Disturbances و Chronic Diarrhea و Celia Disease و Ulcerative Colitis . ولأن الهندوسيون الأmericans ، اعتمدوا اعتماداً كلياً على نوع واحد من الطعام وهو الذرة ، فإنهم أصبحوا عرضة لحالة نقص شديد في المواد الغذائية مما أدى إلى إصابة أولادهم بحالة من الأنemia الشديدة في سن مبكر جداً ، واضح أن ذلك أدى إلى إصابتهم بنسبة عالية من مرض العظام الإسفنجية Porotic Hypostosis . وهذه الحالة المرضية من المتغيرات العظمية لا توجد في هنود هذه الأيام ، فمن بين ٥٦٠ حالة من أطفال قبائل النافاهو الهندية (Navajo) فحصها المترجم عام ١٩٧٥ وجد ١٨ حالة فقط تعاني من نقص الحديد حسب ما وضحت الأشعة السينية وعينات الدم . وقد اختلفت الحالات من متعددة إلى شديدة ، ومن تلك الحالات وجد طفلين فقط يعانيان من تغيرات في العظام مشابهة لما نراه في مرض الأنemia نقص الحديد أو الأنemia الوراثية .

ويصاحب نقص الحديد في وجبات الأطفال الذين يعتمدون على الذرة نقص في البروتينات الأساسية . ولما كانت خواص الذرة الغذائية تفتقر إلى بعض الأحماض الأمينية فإن هذا النقص يؤثر على الأطفال بصورة أكثر حدة ،

هذا لأن البالغين يستطيعون أخذ كميات كبيرة من الذرة لكي يتم تعويض ذلك النقص ولكن الأطفال لا يستطيعون أخذ مثل هذه الكميات من الذرة. وعلى سبيل المثال ، يحتاج الطفل إلى ٣٦ جرام من البروتين يومياً وللحصول عليها يتوجب عليه استهلاك ٤٥٠ جم من الذرة أو ما يقارب ٨٠٠ جم من الخبر ليسد متطلبات الجسم من البروتين . وهذا بالطبع مستحيل مما يعرض الطفل في هذه المجتمعات إلى التعرض لأنيميا نقص الحديد الشديدة . وبالاطلاع على الجدول السابق يتبين لنا أن الأطفال الذين يعتمدون على الذرة في مأكلهم أكثر إصابة بهذا المرض إذا ما قورنا بأطفال لا يعتمدون على الذرة فقط في مأكلهم . ويلاحظ أيضاً أن الأطفال هم دائمًا أكثر إصابة من البالغين في الحالتين .

النتائج النهائية :

- ١ - لا توجد هناك أية أدلة على وجود أمراض الدم الوراثية (G 6 P Deficiency Talassemia, Sickle Cell) في الشعوب الهندية الأمريكية ، ولكن كل التقارير تؤكد وجودها إما لدى الأوروبيين أو عند الإفريقيين .
- ٢ - تؤكد النتائج أن الإصابة بمرض العظام الإسفنجية يحدث في المجتمعات التي تعتمد على الذرة كمحور أساسى للعظام كما يعتمد ذلك على طريقة تحضيرها .
- ٣ - بسبب حاجة الأطفال الماسة في سنوات نموهم إلى الحديد فإن ذلك يعرضهم إلى الإصابة بمرض العظام الإسفنجية أكثر من البالغين .
- ٤ - نقص الحديد والبروتين من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بمرض العظام الإسفنجية .

BIBLIOGRAPHY

- Ackerknecht, E. H. 1945 Malaria in the Upper Mississippi Valley 1760 - 1900. Bull. Hist. Med. Suppl. 4. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- Amin, E. K. and D. M. Hegsted 1971 Effect of diet on iron absorption in iron-deficient rats. J. Nutrition, 101: 927 - 936.
- Anderson, H. D., K. B. McDonough and C. A. Elvehjem 1939 - 1940 J. Clin. Med., 25: 464 - 471.
- Angel, J. L. 1966 Porotic Hyperostosis, anemias, malarias, and marshes in prehistoric Mediterranean. Science, 153: 750 - 763.
- Behar, M. 1968 a Food and Nutrition in the Maya before the Conquest and at the present time. In: Biomedical Challenges of the American Indian, Pan American Health Organization, Publication 165, Washington, D. C.
- Block, R. J. and H. H. Mitchell 1946 - 47. The Correlataion of the amino acid composition of protein with their nutritive value. Nutr. Abstr. Rev., 16: 249 - 278.
- Blumberg, B. S., ed. 1961 Proceedings of the conference on genetic polymorphisms and geographic variations in disease. Grune and Stratton, New-York.
- Boyd, M. F. 1941 An Historical Sketch of the prevalence of malaria in North America. Am. J. Trop. Med., 21: 223 - 244.
- Bressani, R., R. Paz and N. S. Scrimshaw 1958 Effect of Lime treatment on in vitro availability of essential amino acids and solubility of protein fractions in corn. J. Agric. Food. Chem., 6: 770 - 774.

- Cabannes, R. 1965 Repartitions des hemoglobines anormales dans la partie ouest du continent africain. In: *Abnormal Hemoglobins in Africa*. J. H. P. Jonix, ed, Davis, Philadelphia, pp. 291 - 317.
- Caffey, J. 1957 Cooley's anemia: A review of the roentgenographic findings in the skeleton. *Am. J. Roenting. Rad. Therapy & Nuc. Med.*, 78: 381 - 391.
- Cepellini, R. 1955 Discussion of aspects of polymorphism in man. *Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol.*, 20: 252 - 255.
- Chernoff, A. 1959. The distribution of the thalassemia gene. *Blood*, 14: 899 - 912.
- Cockburn, T. A. 1963. *The Evolution and Eradication of Infectious Diseases*. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore.
- -----: 1967 *Infectious Diseases. Their evolution and eradication*. Thomas, Springfield, III.
- Corbett, T. H. 1968 Iron Deficiency anemia in a Pueblo Indian village. *J. Am. Med. Ass.*, 205: 136.
- Cravioto, B. R., R. Anderson, E. E. Lockhart F. DeMiranda and R. S. Harris 1945 Nutritive value of Mexican tor illas. *Science*, 102: 91 - 93.
- Dick, H. W. 1965 Bat Cave. The School of American Research, Monograph No. 27, Santa Fe, New-Mexico, pp. 1 - 113.
- Dunn, F. L. 1965 On the antiquity of Malaria in the Western Hemisphere. *Hum. Biol.*, 37: 385 - 393.
- Dunn, F. L. Lambrecht 1963. The hosts of *Plasmodium Brasilianum* Gondor and von Berrenberg-Gossler, 1908. *J. Parasitol.*, 49: 316 - 319.
- El - Najjar, M. Y. 1976. *The first Americans: A Study of the Origin, evolution, and variation of the American Indians*. Kirtlandia, in Press.
- El - Najjar, M. Y., B. Lozoff and D. J. Ryan 1975. The Paleopidemiology of porotic hyperostosis in the American SouthWest: Radiological and ecological considerations. *Amer. J. Roentg. Rad. Therapy & Nuc. Med.*, 125: 918 - 924.
- El - Najjar, M. Y. and A. Robertson 1976 Spongy bones in Prehistoric America. *Science*.

- El - Najjar, M. Y., D. J., Ryan, C. G. Turner, II and B. Lozoff 1976. The Etiology of Porotic Hyperostosis among the Prehistoric Anasazi Indians of Southwestern United States. *Am. J. Phys. Anthropol.*, in Press.
- Garretson, F. C. and M. E. Conrad 1967 Starch and iron absorption. *Proc. Soc. Exp. Biol. Med.* 126: 304-308.
- Granick, S. 1946 Ferritin. IX. Increase in the Protein apoferritin in the gastrointestinal mucosa as a direct response to iron feeding. The Function of Ferritin in the regulation of iron absorption. *J. Biol. Chem.*, 164: 737 - 746.
- Hegsted, D. M., C. Fish, and D. Kenny 1949. The influence of diet on Iron absorption. *J. Exp. Med.*, 90: 147 - 156.
- Heinz, H. G. Company 1963. Nutritional Data. H. J. Heinz Company. Pittsburgh, Pennsylvania.
- Hussain, R. and V. N. Patwardhan 1959 Iron content in thermal sweat in iron deficiency anamia. *Lancet*. 1: 1073 - 1074.
- Ingsted, H. 1964 Vinland Ruins prove Vikings found the New-World. *Nat. Geog.*, 126: 708 - 734.
- Jarcho, S. 1964. Some observations on disease in prehistoric North America. *Bull. Hist. Med.*, 38: 1 - 19.
- Jonxis, J. H. P. 1959. The frequency of hemoglobin S and hemoglobin C carriers in Curacao and Surinam. In: *Abnormal Hemoglobins*. J. H. P. Jonxis and J. F. Delafresnaye, eds. Blackwell, Oxford.
- Josephs, H. W. 1934. Iron Metabolism in infancy. *Bull. Johns Hopkins Hosp.*, 55: 259 - 272.
- Katz, S. H., M. L. Hediger and L. A. Vallery 1974. Traditional maize proccessing techniques in the New World. *Science*, 184: 765 - 773.
- Layrisse, M. J. D. Cook, C. Martinez, M. Roche, I. N. Kuhn, R. B. Walker and C. A. Finch 1969 Food Iron Absorption. A comparison of vegetable and animal foods. *Blood*, 33: 430-443.
- Layrisse, M. and C. Martinez - Torres 1971 Iron absorption from food. *Iron Supplementation of foods. Prog. Haemt.*, 6: 137 - 160.
- Lisker, R., A. Loria and M. S. Cordova 1965 Studies on several hematological traits of the Mexican population. VIII. Hemoglobin S,

- Glucose - 6 - Phosphate Dehydrogenase deficiency, and other characteristics in a malarial region. *Am. J. Hum. Genet.*, 17: 179 - 187.
- Livingstone, F. B. 1967. *Abnormal Hemoglobins in Human Populations*. Aldine, Chicago.
- Manis, J. G. and D. Schacter 1962. Active transport of Iron by intestine: Features of a two-Step mechanism. *Am. J. Physiol.*, 203: 73-80.
- Martinez - Torres, C. and M. Layrisse 1974. Interest for the Study of dietary absorption and iron fortification. *World Rev. Nutr. and Diet.*, 19: 51 - 70.
- Mertz, E. T., O. E. Nelson and L. S. Bates 1966. Better Protein Quality in Maize. *Advan. Chem.*, Ser. 57: 228 - 240.
- Møllgaard, H., K. Lorenzen, I. G. Hansen and P. R. Christensen 1946. On Phytic acid, its importance in metabolism and its enzymic cleavage in bread supplemented with calcium. *Biochem. J.*, 40: 589 - 601.
- Moore, C. V. 1968 Iron. In: *Modern Nutrition in Health and Disease*. M. G. Wohl and R. S. Goodhart, eds, Lea and Febiger, Philadelphia, pp. 339 - 364.
- Motulsky, A. G. 1960. Metabolic Polymorphisms and the role of infectious diseases in human evolution. *Hum. Biol.*, 32: 28 - 62.
- Smith, N. J. and S. Rosello 1953. Iron deficiency in Infancy and childhood. *Am. J. Clin. Nut.*, 1: 275 - 286.
- Tragger, W. 1957. The nutrition of an intracellular parasite, avian malaria. *Acta Tropica*, 14: 289 - 301.
- Weaver, M. P. 1972. The Aztecs, Maya and their Predecessors. Seminar Press. New-York.
- Wilkes, H. G. 1972. Maize and its wild relatives. *Science*. 177: 1074 - 1077.
- Wintrobe, M. M. 1967. *Clinical Hematology*. Lea and Febiger, Philadelphia.
- Zaino, E. C. 1964. Paleontologic thalassemia. *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, 119: 402-412.

الفصل الثاني عشر

طبيعة التغيرات العظمية الناتجة عن مرض السل ومميّزات هذا المرض عن غيره من الأمراض

Natural Variation and Differential Diagnosis of Skeletal Changes in Tuberculosis

خلاصة :

أجريت هذه الدراسة على ٢٦ حالة مصابة بسل الهيكل العظمي منها ١٧ حالة من الأميركيان السود وتسعة حالات من الأميركيان البيض . وقد تم تحليل هذه الحالات المؤثقة حسب السجلات الطبية لكل متوفى في متحف التاريخ الطبيعي في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية . وتشكل هذه المجموعة جزءاً مما يزيد على ثلاثة آلاف من الهياكل العظمية لأشخاص أمريكيين توفوا في الفترة ما بين ١٨٩٣ - ١٩٣٨ بمدينة كليفلاند وتم حفظ بقاياهم العظمية في المتحف المذكور بعد تنظيفها . وبعد تحليل هذه البقايا تمت مقارنتها ببعض الأمراض العظمية الأخرى كالتهاب العظام وكسور فقرات العمود الفقري وأورام العظام السرطانية التي تشبه إلى حد ما مرض السل ، كما تم تصوير هذه الحالات ووصفها بدقة من أجل التعرف على سبل التمييز بينها وبين مرض السل . وقد تبين من هذه الدراسة أولاً ، أن هناك تباين كبير في الصورة المرضية لمرض السل العظمي ، ثانياً ، أن هذا المرض يصيب جزئين أو أكثر من الهيكل العظمي في ٣٨٪ (٢٦ / ١٠) من الحالات ، ثالثاً ، أن زيادة تعدد الإصابات وخاصة إصابات العمود الفقري أكثر في المرضى السود عنه في المرضى البيض ورابعاً أن بعض الإصابات المجتمعة للهيكل العظمي كإصابة العمود الفقري والأضلاع معاً أو إصابة العمود الفقري والأضلاع وعظمة القص أو إصابة العمود الفقري وعظم الحوض تكون نافعة في تشخيص مرض سل العظام .

مرض السل مرض معد وخطير ومزمن وينتشر في جميع أنحاء العالم ويصيب مختلف الأعمار وأي عضو من أعضاء الجسم. ويختلف السل في حدته بين مرض كامن بلا أعراض أو علامات مرضية ومرض حاد بأعراض وعلامات مرضية شديدة. وينتقل مرض السل عن طريق إنسان مصاب أو عن طريق شرب حليب البقر المصابة بهذا المرض. ويسبب هذا المرض من الوفيات أكثر من غيره من الأمراض البكتيرية الأخرى ، وفي هذه الأيام يصل عدد الوفيات المتناسبة من مرض السل إلى حوالي ٥ ملايين وفاة في مختلف أنحاء العالم (Robbins, 1974) . ويبدو أن ارتفاع مستوى المعيشة وتحسين وسائل الصحة الوقائية وتوفّر العلاج الفعال في السنوات الأخيرة قد قلل من نسبة انتشار هذا المرض في الدول الاقتصادية المتقدمة.

والغرض من هذه الدراسة ، أولاً ، وصف التغيرات الناتجة عن إصابة الهيكل العظمي بمرض السل ، ثانياً ، وصف الإصابات التي تكرر بكثرة في أماكن مختلفة لدى الأشخاص المصابين بالسل وثالثاً ، تقديم إطار يمكن من خلاله التمييز بين إصابات سل الهيكل العظمي من غيرها من الإصابات العظمية المشابهة لها . وتقع أهمية هذه الدراسة في أنها تزود المهتمين بأمراض العظام الإنسانية بفهم أوسع لطبيعة هذه الأمراض بحيث تعطيهم القدرة في المستقبل على التعرف على الحالات المشتبه بها بصورة أكثر دقة .

العينة وطريقة البحث : Material and Methods

لقد قام كل من الدكتور هامان Hamann والدكتور تود Todd من كلية الطب في جامعة كيس وسترن ريزيرف بين عامي ١٨٩٣ - ١٩٣٨ بتجمیع عدد من الهياكل العظمية للذين توفوا بمدينة كليفلاند عرفت فيما بعد بمجموعة هامان وتود . ويوجد اليوم ما يزيد على ٣٠٠٠ هيكل عظمي مصنفة حسب العمر والجنس والطول والوزن وسيب الوفاة والقياسات الأنثروبومترية . بالإضافة إلى ذلك فقد تم ملاحظة الجثث بدقة عند التشريح

وبعده بواسطة الدكتور تود ومعاونيه للتعرف على الحالات المرضية وتوثيقها حسب كل حالة وفاة. وقد تضمنت هذه المعلومات المؤثقة كل ما يتعلق بالهيكل العظمي من كسور وتشوهات وتغير في عمر العظام، والتغيرات الناتجة عن نقص الغذاء وأمراض العظام بشكل عام. وقد بيّنت هذه الدراسة أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض السل قد تجاوز الـ ٥٠٠ حالة منها ست وعشرون حالة مصابة بسل العظام.

ومصطلح المعلومات المؤثقة يعني معلومات مدونة في ملفات طبية تم الحصول عليها من أحد المصادر التالية :

- ١ - إصابة هيكلية عظمية مدونة في شهادة الوفاة، مثل ذلك مرض الزهري، الأورام الخبيثة، السل . . . إلخ.
- ٢ - سجل مستشفى يحتوي على تشخيص إكلينيكي لمرض سل العظام.
- ٣ - مشاهدات الدكتور تود ومعاونيه لعينات عظمية ونسجية مختلفة مأخوذة من جثث مرضى السل.

وحتى نقف بدقة على مدى انتشار الإصابات العظمية فقد تم تحليل الحالات الوارد ذكرها في الملفات الطبية، وقد جاء بعد الفحص الدقيق أنه في بعض الحالات هناك إصابات مرضية أخرى غير الوارد ذكرها في الملفات الطبية. كما وجدت حالات أخرى كان لا بد من التأكيد من طبيعة إصابتها بمرض السل، ولذلك فقد فحصت العينات ميكروسكوبياً وتم تسجيل الإصابات من حيث أماكن تواجدها ومظاهرها والتغيرات الداخلية الحادثة بها. وقد تراوحت أعمار العينات التي تم إجراء الفحص عليها ما بين ١٥ - ٧٧ سنة منها ١٦ من الأميركيين السود الذكور وواحدة من الإناث السوداويات الأناث وثمانية من الذكور البيض وواحدة من الإناث البيضاوات. وقد بين التحليل المهني أن العينات مأخوذة من جثث الأشخاص مصنفين من الطبقة الاجتماعية الفقيرة سواء البيض أو السود منهم.

جداول رقم ١

جدول يوضح توزيع الإصابة بسل المعلم في العينة قيد البحث

Skel. No.	Sex	Age and Race	Cause of Death	Spine tinc sacrum	Ribs	Sternum	Clavicle	Scapula	Shoulder	Hip	Sacroiliac	Femur	Knee	Elbow	
114	M	77 W	Chronic nephritis												
448	M	31 B	Pulm. Tuberculosis	X	X										
470	M	35 W	Pulm. Tuberculosis	X											
708	M	32 B	Meningeal Tuberculosis	X											
813	M	22 W	Nephritis							X	X				
1014	M	22 B	Pulm. Tuberculosis	X	X	X									
1062	M	35 B	Castric ulcer				X								
1069	M	49 W	Miliary Tuberculosis												
1070	F	42 B	Pulm. Tuberculosis												
1084	M	24 B	Pulm. Tuberculosis	X	X	X									
1091	M	25 B	Pulm. Tuberculosis	X	X										
1116	M	31 B	Pulm. Tuberculosis	X	X										

تاج جدول رقم ۱

1178	M	73 W	Chronic nephritis	X
1184	M	37 W	Pulm. Tuberculosis	X
1204	M	22 B	Pulm. Tuberculosis	X
1271	M	39 B	Chronic Mania	X
1480	M	50 B	Pott's disease	X
1556	M	38 W	Acute Bronchopneumonia	X
1799	M	22 B	Pulm. Tuberculosis	X
1888	M	21 B	Pulm. Tuberculosis	X
2044	M	25 B	Pulm. Tuberculosis	X
2562	M	33 B	Pulm. Tuberculosis	X
3030	M	45 B	Meningeal Tuberculosis	X
3540	M	22 B	Pulm. TB. Pott's disease	X
E 14	F	F W	?	?
F 410	M		?	?

۲۳۹

يوضح الجدول رقم ١ توزيع الإصابات المختلفة لمرض السل ، وقد وجد أن حوالي ٥٧,٧٪ من مجلمل الإصابات تتركز في إصابة فقرة أو أكثر من العمود الفقري . أما بقية الهيكل العظمي فنسبة الإصابة به كما يلي : الأضلاع ٦,٣٪ ، الركبة ٢,١٪ ، عظمة القص ٤,١٪ ، الحوض ٧,٧٪ ، الكتف ٧,٧٪ ، الترقوة ٧,٧٪ ، المفصل الحرقفي العجزي ٧,٧٪ ، الفخذ ٧,٧٪ ، المرفق ٧,٧٪ ، واللوح ٣,٨٪ . لكن الأكثر أهمية من ذلك هو تعدد الإصابات في الحالة الواحدة ، فقد تبين من الجدول أن حوالي ١,٧٪ من الحالات المصابة تتركز في منطقة الصدر (في العمود الفقري ، الأضلاع ، عظام القص والترقوة) وهناك ست من الحالات التسع المصابة بسل الضلوع بها إصابات في العمود الفقري . وحالات إصابة عظم القص الأربع مصابة أيضاً إلى حد ما في الأضلاع . كما أن ثلاثة حالات منها مصابة في العمود الفقري أيضاً ، وحالات إصابة الحوض مصابة أيضاً في العمود الفقري وكذلك الحال بالنسبة لحالتي المفصل الحرقفي العجزي . وتصل نسبة عدد الحالات التي يزيد عدد أماكن الإصابة العظمية في كل حالة منها على اثنين أو أكثر إلى حوالي ٣٨,٥٪ .

الفرقة	C1	عدد الحالات	جدول يوضح إصابة الفقرات العظمية	رقم ٢

C2	I
C3	I
C4	I
C5	I
C6	I
C7	II
T1	III
T2	II
T3	III
T4	III
T5	III
T6	IIII
T7	III
T8	III
T9	III
T10	IIII
T11	IIIIII
T12	IIIIIIII
L1	IIIIII
L2	IIII
L3	IIIIII
L4	IIIIIIII
L5	IIIIII

وفي تحليل آخر للعمود الفقري وكما يبين الجدول رقم ٢ لوحظ الآتي:


- ١ - إن أكثر الإصابات تتركز في الجزء السفلي من الفقرات الظهرية وكذلك في الفقرات القطنية.
- ٢ - إن معدل عدد الفقرات المصابة في كل حالة يساوي ٤,٥ تصل في الأمريكيين السود إلى ٦,٤ وفي الأمريكيين البيض إلى ٢,٥ فقرة.

هذا وقد تمت دراسة مدى الاختلافات في إصابات العمود الفقري، وقد قسم الدكتور تود أماكن العمود الفقري إلى أربعة هي:

- ١ - إصابات على جانبي القرص الفاصل بين فقريتين.
- ٢ - إصابات داخل جسم الفقرة.
- ٣ - إصابات الجزء الخارجي المحيط بجسم الفقرة.
- ٤ - إصابات القوس العصبي.

ومن جملة ١٥ إصابة في العمود الفقري هناك ثلاثة إصابات متواجدة على جانبي القرص الفاصل بين فقريتين وإصابة داخل جسم الفقرة، وعشر إصابات في الجزء الخارجي المحيط بالفقرة.

والحالات المتواجدة على جانبي القرص تختلف أماكن تواجدها ومدى إصابتها، فقد تكون الإصابة دائيرية، أو غير دائيرية وضحلة، أو إصابة شديدة تؤدي إلى تآكل العظام وامتداد التآكل إلى داخل جسم الفقرة (شكل ٤٨).




(شكل ٤٨) الإصابة بالسل

اليمين: تأكل الفقرة وامتداد التأكل إلى داخل جسم الفقرة

الوسط: إصابة غير دائرة وضحلة

اليسار: إصابة دائرة


وفي الحالات جميعها فإن الإصابة تترجم عن تحلل في العظم المكون لل الفقرات يؤدي إلى التغيرات الآنفة الذكر . في الشكل رقم ٤٩ منظرين أماميين لفقرتين تتركز الإصابة في إحداهما في وسط جسم الفقرة والثانية في محيط الفقرة الخارجي . الفقرة على جهة اليسار والتي تتركز الإصابة فيها في الجزء الأوسط تبين وجود مجرى حبيبي يصل إلى داخل جسم الفقرة ، وتميز أيضاً بوجود أجزاء متضخمة من النسيج العظمي بجانب الأجزاء المتآكلة . أما الفقرة التي تقع على الجهة اليمنى فالإصابة محيطة بها ، وهي تشكل النسبة الكبرى بين الإصابات الأخرى وتكون على شكل تأكلات مسطحة متعددة الأحجام وتختلف أماكنه تواجدها فمنها ما هو أمامي ومنها ما هو خلفي .




(شكل ٤٩) : الإصابة بالسل
اليمين - إصابة في محيط الفقرة الخارجية
اليسار - إصابة في مركز (وسط) المحيط الدائري

أما إصابات القوس العصبي فهي نادرة الحدوث . وفي هذه الدراسة فإن عدد مثل هذه الإصابات لم ي تعد الثلاث من خمس عشرة إصابة ، منها اثنان تتركز الإصابة فيما في الزائدة العرضية ، بينما الثالثة تتركز إصابتها في القوس العصبي (شكل ٥٠) . وسبب حصول المرض في هذا الجزء من الفقرة هو انتشاره من مصدره في الجزء المحاط بالفقرة . أما (الشكل رقم ٥١) فيبين حالة واحدة فقط من حالات تقوس العمود الفقري الناتج عن الإصابة بمرض السل والذي ينبع عنه التحام الفقرتين المصابتين السادسة والسابعة .

أما بالنسبة للأضلاع فإن إصاباتها تختلف إلى حد ما عن غيرها من العظام ، فالإصابة تتم إما نتيجة لتلامسها مع أجزاء مصابة في القفص الصدري أو عن طريق الدم الذي يحمل بكتيريا السل من الأجزاء المصابة كالرئتين أو العمود الفقري . ومن الممكن أن يصاب أي جزء من الصلع



(شكل ٥٠)
الإصابة بالسل - الإصابة مرکزة في القوس العصبي



(شكل ٥١)


الإصابة بالسل - حالة من حالات تقوس العمود الفقري - وتوضح
الصورة التحام الفقرتين المصابتين السادسة والسادسة من الفقرات الصدرية

(Sanchis-Olmos, 1948) ، ولكن أكثر الأماكن تعرضاً للإصابة هي الأجزاء الداخلية والأجزاء المفصلية المتصلة مع العمود الفقري .

الصلعان العلويان مصابان بإصابات سطحية محدودة (شكل ٥٢) ، ربما نجمت عن انتقال الإصابة بالاتصال المباشر ، وظهر في الصلع العلوي علامات التئام في الجزء المصاب . والصلع الثاني من الأسفل لشخص مصاب بالسل في الأصلع وفي العمود الفقري وفي عظمة القفص وجميع هذه الإصابات بليرة . وتبدو في الصلع الأول من أسفله إصابة تخترق القشرة العظمية للصلع . ويرجع حدوث الإصابة في هذين الصلعين إلى طريق بكثيريا السل المنتشرة في الدم .


وأكثر المفاصل إصابة بمرض السل بعد العمود الفقري هما مفصلي الركبة والحووض (Cheyne, 1891. LaFond, 1958. Sanchi solmos, 1948) . وتببدأ بؤرة الالتهاب إما في الغشاء المبطن للمفصل أو في عظم المفصل نفسه ، ولكن النتيجة في النهاية تكون واحدة . والأشكال ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٥٣ توضح مدى درجة الإصابة في المفصل مع مرور الوقت ، وفي شكل ٥٣ إلى اليسار صورة مفصل مصاب بإصابة سطحية في الحوض في بداية المرض ، ومفصل الحوض إلى اليمين مصاب بإصابة أشد في مفصل الحوض ، وتبدو فيه رأس عظمة الفخذ متآكلة بشدة وكذلك عظمة الحق وكما هو واضح يبدو في نفس الشكل خلع جزئي والتهاب في الغشاء المحيط بالعظم . والشكل ٥٤ ، ٥٥ يوضحان صورة لمفصل الركبة والتغيرات الناتجة عن المرض . ففي الشكل (٥٤) يتراوح مدى الإصابة بين تغيرات بسيطة في المفصل كما في الشكل على اليسار إلى إصابة تأكلية شديدة كما في المفصل على اليمين . ويظهر في المفصل الذي على يمين الصورة تأكل وتحلل في الجزء الذي يلي المفصل ناتج عن تأثير بكثيريا السل التي تصيب هذا الجزء من العظم . شكل (٥٥) يبين شفاء لحالة سل مفصل الركبة وبين تلاحم عظمتي المفصل وما ينتجه عن ذلك من تغير في شكل المفصل ومكانه .

ومفاصل الكتف والمرافق وعظمة العجز الحرقفي هي أيضاً عرضة



(شكل ٥٢)


الإصابة بالسل - صورة توضح إصابات مختلفة في الأضلاع
لأفراد مختلفين ماتوا جميعاً بمرض السل .



(شكل ٥٣) : الإصابة بالسل
اليمين : إصابة شديدة (متقدمة) في المفصل
الذي يربط عظم الفخذ مع الحوض وتبعد العظام متآكلة
اليسار : إصابة سطحية في بداية المرض



شُكْلٌ ٥٤: الإصابة بالسل
اليمين: إصابة تآكلية شديدة في مفصل الركبة
اليسار: تغيرات بسيطة



(شكل ٥٥) : الإصابة بالسل
الصورة توضح حالة شفاء المصاب بالدرن في مفصل الركبة
وتبين تلاحم عظمي المفصل

للاِصابة بمرض السل تماماً كما هو الحال في مفصلي الحوض والركبة . وفي عظمة الفك المصابة ببكتيريا السل تظهر الإِصابة على شكل التهاب في الفضاء المحيط بهذه العظمة . أما مفصل عظمتي الترقوة والقص فالإِصابة تكون على شكل دائري ومتفاوتة في العمق .

وفي كلتا الحالتين فإن مكان الإِصابة في عظمة الترقوة تكون في الجزء القريب من عظمة القص ويتراوح مدى الإِصابة بين بضعة ملميتات للجزء المصاب إلى تغير كامل في السطح المفصلي للترقوة . من كل الحالات التي ذكرت سابقاً يتضح بأن الإِصابة ببكتيريا السل لا يؤدي إلى تكوين نسيج عظمي جديد في الجزء المصاب ولا يتكون هذا إلا في الحالات التي تم شفاؤها .

المناقشة : Discussion

يعتمد المظهر الخارجي للعظم المصاب بمرض السل على عنف البكتيريا التي سببت الإِصابة وعلى مدى مناعة الجسم ضدها وعلى الجنس وربما على عوامل وراثية أيضاً (Youmans, 1979) . ويقول روبنز (Robbins, 1974) بأن هناك دلائل إكلينيكية وتجريبية تؤكد على وجود عوامل وراثية ذات علاقة بحدوث مرض السل . فالأمريكيون السود، على سبيل المثال ، أكثر احتمالاً للتعرض لمرض السل من الأمريكيين البيض . ومع أن ذلك قد يعود إلى عوامل اجتماعية واقتصادية إلا أن لورى (Lourie, 1950) ما زال يعتقد بوجود علاقة للسلالة في حدوث ذلك . فمرض السل الذي يصيب التوأم المتتشابه يعطي نفس الصورة من حيث أماكن انتشار المرض على العكس من الإِصابة التي تحصل في التوأم الغير متتشابه حيث تقل إمكانية حدوث تشابه في أماكن انتشار المرض (Robbins, 1924) . وكذلك فإن روبنز يقترح أن عوامل أخرى كسوء التغذية والضعف العام والأمراض الأخرى المرافقية كمرض السكري وسل النحاتية وأمراض الغدد الليمفاوية الورمية قد تساعد على حدوث الإِصابة بالسل أكثر من الأشخاص الأصحاء . بالإضافة إلى ذلك فإن هناك عوامل داخلية وأخرى خارجية لها بعض التأثير على الميكروب

وعلى الإنسان المصاب وحسب ما جاء على لسان (مورس 1901) فإن نقص المناعة أو فقدانها في الجسم قد يؤدي إلى التهاب حاد في العظم قد يؤدي إلى الوفاة . وعلى العكس من ذلك ، فإذا كان لدى الشخص المصاب مناعة كافية فإن هناك احتمالاً أن يصبح المرض مزمناً ويعاد بناء النسيج العظمي المصاب وسرعان ما يلشم .

هناك مجموعة لا بأس بها من أمراض العظام تتشابه إلى حد كبير مع مرض السل العظمي ولذلك يتوجب العمل على التمييز بينهما . ومن هذه الأمراض التهاب العظمي الصديدي ، لوكيميا الدم ، أورام عظمية سرطانية ، وكسور الفقرات ، ومرض باجت ، ومرض الروماتيزم ، والبروسيل ، والفطريات بأنواعها والتيفوئيد وغيرها . ونادرًا ما يصيب جزء كبير من هذه الأمراض العظام كالتيفوئيد ، بينما هناك بعض الأمراض يسهل التفريق بينها وبين مرض السل ، وذلك بدراسة أماكن تواجد الإصابة وتعددها كمرض الروماتيزم ومرض باجت وسرطان الدم .

وسنركز حديثنا الآن على أربعة أمراض فقط وذلك لتواجده شبه كبير بينها وبين مرض سل العظام وهي الأورام الخبيثة وكسور الفقرات والتهاب العظم الصديدي والتهاب العظم الفطري .

مع أن الأمراض السرطانية نادرًا ما ترى في البقايا العظمية الإنسانية المتوفرة للدراسة ، إلا أنه لا بد للباحثين في علم الأمراض الإنسانية القديمة من التعرف على طبيعة هذه الأورام وسبباتها وانتشارها وتوزيعها في الجماعات الإنسانية البائدة . وعند التفريق بين هذه الأمراض السرطانية ، خاصة التي تصيب العمود الفقري ، والأمراض الأخرى ، يجب أن تخلى الحذر خاصة في الحالات التي قد تتلف أو تتأكل فيها العظام نتيجة عوامل مختلفة قد تحدث بعد الوفاة سواء من حموضة التربة أو غيرها .

وهناك مرض سرطاني واحد يصعب التفريق بينه وبين سل العظام ، وهذا المرض هو السرطان الانتقلالي Metastatic Carcinoma والذي غالباً ما


يصيب الهيكل العظمي . وهذا المرض يصيب غالباً كبار السن ممن تجاوزوا الخمسون عاماً . وتوجد إصابات السرطان الانتقالي في العمود الفقري خاصةً فقرات الصدر ويليها الفقرات القطنية ثم العجزية (Jaffe, 1958) . وقد يصيب أيضاً أجزاء عظمية أخرى كالضلوع والحوض والجزء العلوي من عظمة الفخذ .

ويوضح لنا الشكل (٥٦) طبيعة السرطان الانتقالي في فقرتين من العمود الفقري ويظهر في الجزء الأوسط منها آفة مرضية فيها تحلل العظم ، وكذلك إصابات صغيرة تحللية في نهاية القوس العصبي . هذه الإصابات تميز طبيعة السرطان الانتقالي وتفرقه عن مرض سل العظام . أما السرطان الانتقالي



صورة توضح طبيعة السرطان الانتقالي في فقرتين من العمود الفقري، ويظهر في الجزء الأوسط منها آفة مرضية فيها تحلل للعظم وكذلك إصابات صغيرة تحللية في نهاية القوس العصبي

الذي يحيط بجسم الفقرة فله نفس الصفات السالفة والتي تميزه عن سل العظام (شكل ٥٧).



(شكل ٥٧)

سرطان انتقالى في المحيط الدائري لفقرة عظمية، وهذا ما يميز هذا المرض عن أمراض السل في العمود الفقري

وبالنسبة لإصابات العمود الفقري فقد قسمها هولدسويرث (Holdsworth 1963, 1970) إلى خمس أقسام:

١ - الانثناء أو الانحصار الأسفيني .

٢ - اثناء ودوران .

٣ - امتداد.

٤ - انخماص عمودي.

٥ - إصابة مباشرة إهرازية.

ومن هذه الإصابات الخمسة إصابتان فقط يصعب التمييز بينهما وبين سل الفقرات. هاتان الإصابتان هما: إصابة الفقرات الالثنائية (الانخماص الإسفيني) وإصابة الفقرة العمودية (انخماص عمودي). الانخماص الإسفيني أكثر شيوعاً في مناطق العمود الفقري التي تصل بين الفقرات الظهرية والقطنية أو التي تصل بين الفقرات القطنية والعجزية (Rockwood and Green, 1965). ففي المجموعة العظمية قيد الدراسة وجدت جميع الكسور الانخماصية الإسفينية في الفقرة الظهرية الثانية عشر والقطنية الخامسة. وقد ظهر الجزء الأمامي من جسم الفقرة منخماً بحيث أدى ذلك إلى تقوس العمود الفقري. أما الفقرات المصابة بالانخماص العمودي فإن أكثرها يظهر على شكل تعرّق ثانوي أو تفتت في جسم الفقرة (شكل ٥٨).

أما الفقرة الثانية التعرّق فيمكن أن نجدها في إصابة الفقرات بمرض تخلخل العظام أو ترقّتها حيث يعمل الطبلة أو القرص العصبي على الضغط على جسم الفقرتين المتجاورتين في جزءهما الأوسط مما يؤدي إلى تقصر كلا الفقرتين (Cook, 1955; Hodgson et al, 1969). وفي رأي روکود وجرين (Rockwood and Green, 1975) فإن أكثر أماكن حصول الانخماص العمودي هو وسط مجموعة الفقرات القطنية وبالتالي فإن علامات التمييز بين الكسور وسل العظام هي:


١ - الكسور يمكن أن تتميز بوجود نمو نسيج عظمي طرفي.

٢ - لا يوجد آية آفات تحللية في الكسور.

٣ - الانخماص العمودي يؤدي إلى فقرات مقصرة.

٤ - إن الأفراص التي ما بين الفقرات لا تتأثر بإصابات الكسور.

التهاب العظم الصدبي يمكن أيضاً أن يقلد إلى حد ما مرض سل



(شكل ٥٨)

فقرة عظمية مصابة بما يعرف بالانخماص العمودي
الذى يظهر على شكل فقر ثانى أو تفتت
في جسم الفقرة وهذا يحدث نتيجة للكسور

العظام من حيث المظهر الخارجي للإصابة أو مكان الإصابة . وغالباً ما يصيب هذا المرض الأطفال ولكنه من الممكن أيضاً أن يصيب البالغين (Waldvogel et al, 1971) . ويكون انتقال العدوى إما عن طريق انتقال البكتيريا بواسطة الدم أو مباشرة من مكان مصاب بجانب العظام . ونسبة حدوثه في الذكور تعادل ضعف نسبة حدوثه في الإناث (Aegerter and Kirkpatrick, 1975) . وحسب ما جاء على لسان والدوهوجيل (Waldvogel, 1975) فإن أكثر الأماكن التي يمكن أن تصاب بالالتهاب هي الفقرات وحشاش عظم الفخذ وعظمة الشظية . والالتهاب الصديدي نادر الحصول في العمود الفقري ، وإذا ما وجد فإنه غالباً ما يصيب جسم الفقرة التي يؤدي إلى تقلصها مع مرور الوقت وتنتشر الإصابة بسرعة إلى الفقرات الأخرى

الجاورة . (Schmorl and Junghanns, 1959, Greenfield. 1969)


وفي بداية الإصابة بمرض الالتهاب الصديدي يصعب التمييز بين الفقرة المصابة بهذا المرض من الإصابة بمرض السل ولكن مع تقدم المرض يتكون نسيج عظمي جديد في الجزء الأمامي غالباً ما يمتد ليصل إلى أجسام الفقرات المجاورة .

ونجد في جسم الفقرة المصابة أحياناً خراج محااطاً بنسيج عظمي متليف بينما في الفقرة المصابة بالسل فإن الفقرة تصبح مضغوطة (أقل سمكاً من حجم الفقرة الطبيعي) في المراحل الأولى من المرض ، ولكن قد يحصل نمو نسيج عظمي جديد في المراحل المتقدمة من المرض لذا علينا تذكر ذلك . (Hodgson et al, 1969)

أما التهاب العظام الصديدي الذي يصيب عظام غير عظام العمود الفقري فإنه يتميز بتكوين الشظية العظمية والذي يميزها عن سل العظام في هذه الأماكن . وأكثر الأماكن إصابة هي حشائش العظام الطويلة والتي يصاحها نمو نسيج عظمي جديد تحت الغشاء المحيط بالعظم ، وكذلك وجود ممر جيبي تمر من خلاله المواد الصديدية (شكل ٥٩) .

وتميز صورة الأشعة بين خراج سل العظام ذو الجدار الرفيع من خراج التهاب العظام الصديدي ذو الجدار السميك . ولقد لمح كل من جيردلستون وسوميرفيل (Girdlestone and Somerville, 1952) إلى أن هناك بعض التغيير في ملامح إصابة السل المعروفة لدينا إذا ما صاحبها التهاب عظم زهري أو التهاب صديدي خفيف .

بالإضافة إلى الأمراض الآنفة الذكر فإن هناك أمراض أخرى يجب التمييز بينها وبين مرض السل وهي الالتهابات الفطرية في العظام وستتكلّم بإيجاز عن ثلات منها . فداء الفطر الشعاعي هو مرض التهابي مزمن يكثر تواجده في المناطق العليا من وادي المسيسي والولايات الشمالية الغربية ،



(شكل ٥٩)

صورة توضح مرض التهاب العظم الصديدي
الذى أصاب الشظية العظمية ويميزها عن السل

(Reeves and Federson, 1954) ويصيب الذكور أكثر من الإناث ونادراً ما يصيب الأطفال أقل من ١٠ سنوات وأكثر الإصابات تقع بين الأعمار ١٥ - ٣٥ . وإصابة بقية أجزاء الهيكل العظمي قليلة ، وأكثر الأماكن إصابة هي عظام الجمجمة والرقبة حيث تبين أن جسم الفقرة والقوس العصبي ليس لديهما القابلية للإصابة بهذا المرض .

وفي الداء الفطري الآخر المعروف باسم داء الفطور الكرويانية فإن نسبة الإصابة تعتمد على تعرض الأشخاص لترابة ملوثة بهذه الفطريات وهو غالباً ما يصيب الأشخاص البالغين . ويتشر المرض في جنوب غرب ووسط كاليفورنيا في الولايات المتحدة وتكثر إصابة العظام بهذا المرض في الضلوع والعمود الفقري والأقدام والجمجمة . وأي جزء من العمود الفقري يمكن أن يتعرض للإصابة مما قد يؤدي في النهاية إلى تقوس العمود الفقري . والتميز

بينهما وبين إصابة سل العظام يعتمد على أماكن تواجد الإصابة وطبيعتها.

أما أصعب الأمراض الفطرية للتميز بينها وبين سل العظام فهو مرض الفطر الجرثومي . وتعتمد درجة الإصابة بهذا المرض في كلا الجنسين على مدى تعرضهم للتربة الملوثة بفطريات هذا المرض . ففي الولايات المتحدة يقتصر تواجد هذا المرض على ولاية أوهايو وعلى حوض نهر المسيسيبي (Furcolow et al, 1966) . ويعتبر في حوالي ٢٣ - ٥٠٪ من حالات هذا المرض إصابات متعددة في الهيكل العظمي (Geh Weiler et al, 1970) . وأكثر الأماكن إصابة هي العمود الفقري والجمجمة والعظام الطويلة والعظام القصيرة (Colonna and Gucker, 1944) . وإصابة العمود الفقري تميز بإصابة كل من جسم الفقرة والقرص الفاصل بين الفقرات بالتلف الذي يشبه إلى حد كبير ما يحصل عند إصابة بالسل ويؤدي في النهاية إلى تقوس العمود الفقري . ولكنه يختلف عن السل بإمكانية إصابة القوس العصبي والأضلاع المجاورة . ويمثل هذا الداء حالة مرضية خاصة حيث يجب التركيز على إصابات الجهاز الهيكلي وعلى نسبة الإصابات ونسبة الوفيات ودراستها تفصيلياً حتى تقف على التشخيص الدقيق .

الخلاصة

Conclusions

يتبيّن من الدراسات السابقة أنّ معظم تركيز الباحثين الأوائل اعتمد على انضغاط الفقرات كعلامة أولية مميزة لتشخيص سل العظام. وكما ذكر في نتائج هذه الدراسة هناك حالة واحدة فقط من بين ٢٦ حالة أصيّبت بتقوس في العمود الفقري. ونحن بدورنا نشعر أنّ نتائج الدراسات السابقة يجب إعادة تقييمها آخذين بعين الاعتبار العوامل التالية:

١ - من ٤٠ - ٥٠٪ من حالات سل العظام تواجد في أماكن أخرى غير العمود الفقري (Sanchis - Olmis, 1948; Ganguli, 1963; Steinbock, 1976).

٢ - ليست جميع الفقرات المصابة تنتهي بانضغاط وتقلص، وحتى تلك التي تصاب بالتقلص قد تتوقف عن الاستمرار بذلك نتيجة الوفاة لسبب آخر. لذلك فإنه يتوجّب على دارسي علم الباثولوجيا أن يكونوا ملمين بالتغييرات المحتملة لكل الأمراض التي تحمل وجه شبه بينها وبين مرض انسيل والتي تصيب الهيكل العظمي.

أما الوسيلة الأخرى التي اعتمد عليها للتفريق بين تلك الأمراض فهي تعدد الإصابات في الحالة الواحدة. فالدراسة تشير إلى أن حوالي ٣٨٪ من الحالات جميعها تواجد فيها إصابات متعددة. بينما تبيّن الدراسات السابقة أنّ نسبة الحالات التي تتعدد بها الإصابات تصل إلى ما بين ٥ - ٢٠٪ فقط (Johansson, 1926; Sanchis - Olmes, 1948; La Fondi 1958).

ولكن كون عدد الحالات التي ثبت وجود داء السل في الهيكل العظمي في ٢٦ حالة في نفس الوقت الذي وصل عدد الوفيات بسبب مرض السل إلى ٥٠٠ حالة يدلل على أن عينة هذه الدراسة تشبه العينة التي أخذت من مجموعة من الناس في فترة ما قبل اكتشاف علاج لمرض السل.

ومع أن العينة التي كانت قيد الدراسة صغيرة في عددها إلا أنها تبرز اختلافاً واضحاً بين الجنس الأبيض والأسود. فمن بين ١٧ حالة سل في السود يوجد ٩ حالات تتعدد الإصابات فيها مقارنة بحالة واحدة من ٩ حالات من البيض. من هنا يتضح أن الباحثين الأوائل قللوا من أهمية العدد الحقيقي للحالات التي تتعدد بها الإصابات. إذا أخذنا في الاعتبار:

١ - إن حوالي ٣٠ - ٤٠٪ من نسبة الكالسيوم المتواجد في مكان الإصابة لا بد من إزالته لكي تظهر الإصابة بصورة الأشعة (Tuli, 1975).

٢ - يجب أن يزيد حجم الإصابة على $\frac{1}{2}$ سم حتى تظهر في صورة الأشعة (Schmorl and Junghanns, 1959).

٣ - عملية التشريح ربما كان ينقصها الدقة كما يذكر ليشتتنستайн (Lichtenstein, 1977 P. 373) «إنه ولسوء الحظ صحيحاً أن يعتبر الكثير من علماء الباثولوجيا أن الهيكل العظمي أشبه ببقرة نحرت من أجل أخذ شريحة من الجزء الأمامي من بعضه فقرات قطنية بالإضافة إلى ملاحظة عظمة القص أو ضلع أو اثنان».

BIBLIOGRAPHY

- Aegerter, E., and J. A. Kirkpatrick, Jr. (1975) Orthopedic Diseases, 4th ed. W. B. Saunders Co., Philadelphia.
- Buikstra, J. E. (1976). The Caribou Eskimo: General and specific disease. Am. J. Phys. Anthropol., 45: 35 - 368.
- Cheyne, W. W. (1891) Lectures on the Pathology of tuberculous disease of bones and joints. Brit. Med. J., pp. 896 - 901.
- Colonna, P. C., and T. Gucker (1944). Blastomycosis of the Skeletal system. J. Bone Jt. Surg., 26: 322 - 328.
- Cooke, A. M. (1955). Osteoporosis. Lancet, 1: 877 - 882.
- Furcolow, M. L., A. B. Ballows, R. W. Menges, D. Pickar, J. T. McCellan, and A. Saliba (1966). Blastomycosis. J. A. M. A., 198 (5): 529 - 532.
- Ganguli, P. K. (1963). Radiology of Bone and Joint Tuberculosis. Asia Publishing House, New-York.
- Gehweiler, J. A., M. P. Capp, and E. W. Chick (1970). Observations on the roentgen patterns in blastomycosis of bone. Am. J. Roentgenol., 108: 497 - 510.
- Girdlestone, C. R., and E. W. Somerville (1952). Tuberculosis of the Bone and Joint. Oxford Med. Pub., London.
- Greenfield, G. B. (1969). Radiology of Bone Diseases. J. B. Lippincott Co., Philadelphia.
- Hodgson, A. R., W. Wong, and A. Yau (1969). X - Ray Appearances of Tuberculosis of the Spine. C. C. Thomas, Springfield, IL.
- Holdsworth, F. W. (1963). Fractures, Dislocations, and fracture-dislocations of the Spine. J. Bone and Joint Surg., 45: B: 6 - 20.
- Holdsworth, F. W. (1970). Fractures, dislocations, and fracture-Dislocations of the Spine (review article). J. Bone and Joint

Surg., 52 - A: 1534 - 50.

- Jaffe, H. L. (1958). Tumors and Tumorous Conditions of the Bones and Joints. Lea and Febiger. Philadelphia.
- Johansson, J. (1926). Knochen und Gelenktuberkulose in Kindesalter. Fischer, Jena.
- La Fond, E. M. (1958). An analysis of adult Skeletal tuberculosis. J. Bone and Joint Surg., 40 A: 346 - 364.
- Lichtenstein, L. (1977). Bone Tumors, 5th ed. C. V. Mosby Co., St. Louis, Mo.
- Lurie, M. B. (1950). Native and acquired resistance to tuberculosis, Am. J. Med., 9: 591 - 597.
- Morse, D. (1961). Prehistoric Tuberculosis in America, Am. Rev. Resp. Dis., 83: 489 - 504.
- Morse, D. (1967). Tuberculosis. In: Diseases in Antiquity D. R. Brothwell and A. T. Sandison, eds. C. C. Thomas, Springfield, IL.
- Morse, D. (1969). Ancient Diseases in the Midwest. IL. State Mus. Publ. No. 15, Springfield, IL.
- Reeves, R. J., and R. Pederson (1954). Fungous infection of bone. Radiology 62: 55 - 60.
- Robbins, S. L. (1974). Pathologic Basis of Disease, W. B. Saunders Co., Philadelphia.
- Rockwood, C. A., and D. P. Green (1975). Fractures. J. B. Lippincott Co., Philadelphia.
- Sanchis-Olmos, V. (1948). Skeletal Tuberculosis. William and Wilkins, Baltimore.
- Schmorl, G., and H. Junghanns (1959). The Human Spine in Health and Disease. Grune, New-York.
- Steinbock, R. T. (1976). Paleopathological Diagnosis and Interpretation. C. C. Thomas. Springfield IL.
- Tuli, S. M. (1975). Tuberculosis of the Spine. National Library of Medicine. Prem Printing Press, Lucknow, India.
- Waldvogel, F. A., G. Medoff, and M. N. Swartz (1971). Osteomvelitis. C. C. Thomas Springfield, IL.
- Youmans, G. P. (1979). Tuberculosis, W. B. Saunders Co., Philadelphia.

الفصل الثالث عشر

داء الزهري والسل "الدّرن"- شواهد من العالم الجديد

Human Treponematosis and Tuberculosis: Evidence from the New-World

خلاصة :

يهدف هذا البحث أولاً إلى تقسيم الأدلة التي تبين وجود أو عدم وجود مرضي الزهري والسل في البقايا العظمية لسكان العالم الجديد في عصور ما قبل التاريخ، كما يهدف ثانياً إلى كتابة تقرير وافٍ مبني على تسع حالات جديدة تؤكد وجود هذين المرضين في فترة ما قبل الاكتشاف.

والواقع أن مراجعة السجلات التاريخية والمعطيات الصحية آنذاك بواسطة علماء الأمراض القديمة ترك قليلاً من الشك على أن مرضي الزهري والسل اكتشفاً أو وجدوا أصلاً في ما يسمى بالعالم القديم. وستقدم هذه الدراسة معلومات جديدة موثقة تعطي إسناداً ودعماً إضافياً للحقيقة القائلة بأن الزهري والسل البشري ، رغم ندرة وجودهما، استوطنا العالم الجديد قبل اكتشاف كولومبس للأمريكتين .

كما تبين نتائج هذه الدراسة أنه لا توجد هناك دلائل أو براهين تجيز لنا القول بأن هذين المرضين ظهرا كمرضين مستقلين ، وخاصة خلال الفترة القصيرة نسبياً منذ ظهور أو وصول الإنسان للعالم الجديد وفي الحالة التي يكون فيها المرض أو الداء مستوطناً كما في هذه الحالة ، فإن صوراً أو أشكالاً أخرى من المرض تظهر وتكون أقل حدة من سابقتها مع وجود رد فعل مضاد ومتحسن والحالات الأكثر شدة هي التي تبدو ملحوظة وواضحة في الهيكل العظمي فقط. وهذا يفسر لنا صعوبة وندرة وجود الآفات الهيكلية

(آثار المرض) التي تقترح أو تشرط وجود هذين المرضى في سكان ما قبل عصر الاكتشاف في العالم الجديد.

إن دراسة مركزة ولتاريخ هذين المرضى ، وظروف الإنسان الصحية والمرضية القديمة لا تقصر فائدتها على الأهمية العلمية لهذه الدراسة فقط، وإنما للأهمية العلمية لهذا النوع من الدراسات الأثر وbiology الميدانية . كما أن فهم واستيعاب طبيعة وخواص الأمراض في إنسان ما قبل التاريخ يزودنا بنوع هام من المعلومات الأساسية والمطلوبة لفهم ماضي تكيف الإنسان وسلوكه وممارساته الثقافية والبيئة المرضية وأوقات وطرق الارتحال والهجرة وأصل وتطور الأمراض البشرية وسبباتها . إن كل هذه العوامل والمعلومات تعطينا مفهوماً مهماً ليكون جزءاً أساسياً من تاريخ التطور الإنساني البيولوجي والثقافي .

والغرض من هذه الدراسة أولاً : الكشف والتحري عن الأدلة التي تتول بوجود داء السل والزهري في الجنس البشري من خلال معاينة ودراسة لمخلفات هيكلية وبقايا إنسانية لإنسان ما قبل عصر اكتشاف الأمريكتين ، وثانياً ، إعداد تقرير مبني أساساً على تسع حالات جديدة لهذين المرضى في الجماعات الإنسانية التي عاشت في فترة ما قبل عصر الاكتشاف تبين وجود هذان المرضان وظروف تواجدهما .

الزهري Syphilis

إن مسألة وجود أو عدم وجود هذا المرض في إنسان ما قبل عصر الاكتشاف أصبحت مادة خاصة للنقاش والجدل العلمي ، وكان لاكتشاف بقايا هيكلية بشرية تشير إلى وجود مرض الزهري في إنسان ما قبل التاريخ قد أفسح المجال أمام ظهور عدة نظريات وتخمينات حول نشأة وتطور هذا المرض . والكثير من الباحثين والمهتمين بنشأة الأمراض الإنسانية القديمة اعتبروا أمريكا هي المهد الجغرافي الأول لهذا المرض بينما يعتبره فريق آخر من الباحثين ، أوروبا الأصل ، وهناك أيضاً من يعتقد بأن المرض نشاً في إفريقيا أو في الشرق الأدنى .

وبالنسبة لوجود الزهري في العالم الجديد فقد ظهرت ثلاث فرضيات وهي أولاً : إن مرض الزهري كان مستوطناً أصلاً العالمين القديم والجديد قبل الاتصال الأوروبي مع مستوطني العالم الجديد وثانياً : أن المرض تطور تطوراً محلياً لدى الهنود الحمر ثم انتقل إلى أوروبا بواسطة طاقم البحارة على سفن كولومبوس لدى عودتهم لبلدانهم ، وثالثاً : إن موطن المرض الأصلي هو أوروبا وقد انتقل منها للعالم الجديد بواسطة الأوروبيين .

الباحث «هاريسون» (Harrison, 1959) مثلاً يرى أن مرض الزهري جاء نتيجة لعودة بحارة كولومبوس في ١٤٩٣ من العالم الجديد . وترتکز فرضية هاريسون على : ١ - غياب الأدلة والقرائن المكتوبة عن مرض الزهري في نهاية القرن الخامس عشر . ٢ - غياب الأدلة على ظهور مرض

جديد وداء عصري . ٣ - عدم وجود بقايا عظمية تحتوي على آثار هذا المرض في أوروبا قبل العصر الكولومبي كدليل على وجود المرض في أوروبا . ٤ - وجود مثل هذه البقايا الحافظة والحاصلة لأنثر المرض في البقايا العظمية للهنود الحمر من سكان العالم الجديد .

والنظيرية التي تقول بأن الإنسان قد وصل للعالم الجديد من خلال جسر بيرنج الذي يربط شرق الاتحاد السوفيتي بأمريكا الشمالية « خلال العشرين أو الثلاثين ألف سنة الأخيرة أصبحت الآن حقيقة علمية ثابتة . EL-Najjar, 1976) . وهناك موافقة عامة من بين مؤرخي الطب (Hudson, 1958) على أن مرض الزهري تأصل في العالم القديم ، ولهذا فإنه من المفترض أن يكون هذا المرض في العالم الجديد قد وصل بطريقة أو بأخرى من العالم القديم . ويقول هدسون (Hudson, 1963) أن كل الشواهد والدلائل تصب في بوتقة واحدة وهي أنه من المستحيل أن يكون المرض قد نشأ مستقلاً في الأمريكتين خاصة خلال الفترة القصيرة منذ أن وطأتها أقدام الإنسان . وإذا افترضنا صحة هذه النظيرية فإن المرض يكون قد شق لنفسه تاريخاً تطورياً منفصلاً في العالم الجديد . وكل حقبة من التاريخ والتعاقب البشري تكون مصاحبة لحقبة من انتشار المرض وعدواه سواء في العالم الجديد أو القديم .

الزهري في العالم الجديد : New World Treponemes

لقد قدم الكثير من الباحثين الأدلة وال Shawads على انتشار هذا المرض في البقايا العظمية المكتشفة ، فقد عثر الباحث الأنثروبولوجي هوتون (Hooton, 1930) على حالتين من موقع بيكوس لهنديين عاشا في فترة ما قبل التاريخ . (أي قبل عصر الاكتشاف وهو عام ١٤٩٢) . وقد فحصت العينتان من قبل أحد البارزين في علم الأمراض والإنسان في ذلك الوقت وهو الدكتور Herbert Williams ، وكما أجرى الدكتور « تونج » تصويراً بالأأشعة لإحدى عظام الفخذ ، واتفق مع الباحثين الآخرين على أن زيادة سمك العظم يحدث نتيجة للالتهاب السمحائي المزمن . وقد استنتاج ويليامز أن سمك العظم وتآكله من ناحية الأنف في أحد الجمامجم أظهر أيضاً تداخلات موضعية للعظم الأمامي

مع زيادة في سمك العظام الطويلة المختلفة في الحالات الأخرى له دليل قاطع على وجود مرض الزهري . وفي عام ١٨٣٨ نشر دننجر (Dinninger 1938) تقريراً حول إحدى الجماجم المكتشفة من موقع تزيجوت بولاية أريزونا الأمريكية والذي يعود تاريخه إلى ١٣٥٠ م . ويقول دننجر إن التدمير المكثف للعظام الأمامية والأنفية وثقب الفك الصلب عبارة عن أعراض لحالات الزهري . كما يفترض كول ومساعدوه في دراسة أخرى لبقايا هيكل عظمية من كنشابا وكهف فاندال في أريزونا (Cole et al. 1955) وجود أعراض الزهري في عظام الساق يعود تاريخهما إلى الفترة ١٢٣٣ - ١٢٣٦ م وما قبل ١٣٠٠ م على التوالي . وفي تكساس وضع جولدستين (Goldstein 1957) تقريراً حول أعراض مرض الزهري في جماجم ، اثنان فيما تعود لعصور ما قبل التاريخ . وفي عام ١٩٦٦ قدم روني (Roney 1966) تقريراً حول التهاب السمحاق المقترن للزهري في تسعة أفراد عاشوا سنة ٥٠٠ قبل الميلاد . وفي شمال ولاية ألاباما عشر رابكن (Rabkin. 1942) على هيكل عظمي تبدو عليه أعراض مرض الزهري ، وكذلك التقرير الذي نشره هالتون وشاندس (Halton and Shands. 1938) في عام ١٩٤٢ عن هيكل عظمية . فقد بين هذا التقرير التغيرات الكلاسيكية التي يتلقى عليها الباحثون على أنها الأعراض الناتجة عن مرض الزهري وخاصة في الجمجمة . وقد وصف مورس (Morse. 1967, 1973) هيكلين عظميين وججمة منفصلة من ولاية «اللينوي» على ضفاف المسيسيبي من الفترة ١٠٠٠ - ١٤٠٠ م تحمل صفات ومظاهر مرض الزهري . وفي الكتابات القديمة كتب أورتن (Orton 1905) تقريراً يحدد ويصف فيه مرض الزهري من مجموعة كبيرة من الهياكل تم جمعها من وادي أوهايو تعود لفترات ما قبل التاريخ . أما مينز (Means 1925) فقد كتب تقريراً يحدد فيه بالأشعة دليل التضخم في عظام الساق في ثلاثة هيكل عظمية متفرقة . وفي عام ١٩٣٧ نشر ويكفيلد ومساعدوه (Wakefield et al. 1937) مقالاً يتناول فيه وجود مرض الزهري في البقايا العظمية لستة أشخاص كما أن هناك دلائل أخرى تأتنا من موقع أثري هندي

في ولاية كنتكي الأمريكية يعود تاريخه إلى ٣٣٠٠ سنة قبل الميلاد وهناك شواهد أخرى تدل على وجود مرض الزهري في أمريكا الجنوبية وبالذات في بيرو (Maccurdy, 1923) و (Tello and Williams, 1933) و جميع هذه البقايا تعود إلى فترة ما قبل العصر الكولومبي . أما أهم العينات فقد كانت لجمجمة رجل بالغ من المكسيك يعود تاريخها إلى ٣٠٠ سنة قبل الميلاد حيث التأكيل الجمجمي الذي يميز مرض الزهري عن غيره من الأمراض (Goff, 1967) .

الزهري في العالم القديم : Old World Syphilis

يؤمن العديد من المؤلفين (Buret, 1891, Subhoff, 1925, Holcomb, 1940, Castiglioni, 1941, Hudson, 1961, 1964) بأن مرض الزهري كان موجوداً في أوروبا ولكن لم يكن بالاستطاعة تمييزه والتعرف عليه من بين مجموعة الأمراض المنتشرة آنذاك وخاصة مرض الجذام . وهذا القول مدعاوم بعدة مقالات علمية تصف ما كان في تلك الفترة من جذام الزهري (Venereal Leprosy) في القرن الثالث والرابع عشر وبعد فترة وجiza ما يسمى بالجزام الوراثي (Hereditary Leprosy) فاليسكوس (Valescus of Tarentum) كتب عام ١٤٠٠ م يقول : «إن القرود والببور المتقرحة قد تظهر على العضو التناسلي للذكور الذين يمارسون الجنس مع نساء لديهن تقرحات والتهابات مهبليّة (Buret, 1891) . لكن البرص أو الجذام ، مرض لا ينتقل أبداً عن طريق الممارسة الجنسية وهو مرض غير وراثي ، وهذه مظاهر وخصائص تظهر فقط في من يحملون مرض الزهري (Steinbock, 1976) ، ويقول هذا الباحث إن العرب والصينيين بدأوا بمعالجة الجذام باللزباق من قبل آلاف السنين لمعالجة الجذام . والسؤال هو لماذا استخدم الرئيق في علاج الجذام مع أنه كان العلاج الوحيد الذي يستخدم في معالجة من يصابون بمرض الزهري ؟ وليس للرزباق أي تأثير في معالجة مرض الجذام . والأهم من ذلك أن المعالجين ظلوا يستخدمون هذا العلاج حتى بعد انتشار مرض الزهري في أوروبا في بداية القرن السادس عشر . ويقول ستاينبوك أن ما ظهر في عام ١٥٠٠ كمرض جديد هو بعينه مرض الزهري ، حيث بين أنه يختلف في

تشخيصه وأعراضه عن جميع الأمراض السائدة آنذاك. أما هدسون (Hudson, 1963) فقال: إنه لعدة قرون مضت كانت كل من البرتغال وإسبانيا تستوردان العبيد عن طريق البر من السافانا والصحراء الإفريقية ، وهذا أعطى فرصة لانتشار مرض الزهري في إسبانيا قبل اكتشاف العالم الجديد. والاحتمال السائد هو أن بحارة كولومبوس قد جلبوا معهم نوعاً جديداً من أمراض الزهري أكثر حدة وأنهم بذلك قد ساعدوا فقط على انتشار المرض الذي كان موجوداً خلال العقد الأخير من القرن الخامس عشر.


تقارير الحالات المرضية Case Reports

الحالة الأولى :

عينة لطفل من الهند الحمر يعود تاريخ وفاته إلى ما قبل عام ١٤٠٠ م. (Ortner and Putschar, 1979). وتبدو أعراض المرض في الشطر الأيسر من العظمة الأمامية تمتد نوعاً ما إلى الشطر الأيمن (شكل ٨٦٠) وت تكون من التهاب السمحاق وتضخم العظام ومسامتها في عظام الأنف والمنطقة العليا من الفك السفلي (شكل ٦٠B). والأسنان القاطعة مفقودة مع ظاهرة توقف النمو في العاج (شكل ٦٠C)، كما يظهر التضخم والمشكل المسامي للعظام الطويلة (شكل ٦٠D, E) وهذه الأعراض تغير معظم - إن لم يكن كل - حالات الزهري الخلقي ، (McLean, 1931, Parmlee and Halpern, 1935, Steinbock, 1976).


الحالة الثانية :

بقايا هيكلية لسيدة من الهند الحمر من ولاية أركنساس الأمريكية . وتشير طريقة الدفن إلى أنها دفنت قبل العصر الكولومبي ، وتبدو أعراض مرض الزهري واضحة ، وتكثر في التمحور الجمجمي ، ويظهر تضخم وتكتيف العظام في الجمجمة وتجویر كامل من العظام والفقارات القطنية . ومن وجهة نظر «ستاينبوك» فإن هذا النوع من التكوين هو نتيجة لجلطة دموية نتج عنها تدفق الدم في مجراه الكامل ومنع وصوله إلى العظام ، وإلى النواتج الخانقة التي تصاحب مرض الزهري (Steinbock 1976) . وبالفحص الميكروسكوبى




(شكل ٦٠ A)

صورة لطفل من الهنود الحمر يعود تاريخ وفاته إلى ما قبل عام ١٤٠٠ م
أعراض المرض في الشطر الأيسر من العظم الأمامي
تمتد نوعاً إلى الشطر الأيمن




(شكل ٦٠ B)

التهاب السمحاق وتضخم العظام ومساميتها




(شكل ٦٠ ج)

الأسنان القاطعة مفقودة مع ظاهرة توقف النمو في العاج




(شكل ٦٠ D)
التضخم والشكل المسامي في كراديس العظام الطويلة



(شكل ٦٠ E)

منظر قريب يوضح الشكل المسامي في عظمة الساق

للعينة يظهر تضخم العظام، وازدياد كثافتها مع عدم انتظام التكوين السطحي بشكل واضح (شكل ٦١). وهذه كلها شواهد مضافة لثبت وجود المرض.



(شكل ٦١)

بقايا العظام الطويلة لسيدة هندية عاشت في فترة ما قبل عصر الاكتشاف والصورة توضح تضخم العظام وازيد من كثافتها مع عدم انتظام التكوين السطحي


الحالة الثالثة :

بقايا هيكلية لذكر وقد عثر على عظمة الساق فقط بواسطة السيد ريجي وايزمان «من أطلال سموكي بير» في ولاية نيومكسيكو الأمريكية عام 1969 . ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين ١٢٥٠ - ١٣٥٠ م. والمقطع يظهر تضخم العظمة ككل والقشرة سميكة ولكن بشكل غير منتظم (شكل A ٦٢) أما المقطع الطولي فيبين تشكيلًا جديداً (شكل B) والعظم كثيفة المسام ومميزة بتشكيل عظمي شبه مسامي كنتيجة لما يسمى بالالتهاب المسحافي (شكل C) . ولا يوجد في العظمة آية شظايا أو نتوءات تدل على أن وجود المرض أو الإصابة كان نتيجة للتفريح أو السل ، وتوضح هذه الأعراض مجتمعة الصفات التي تميز حالات الزهري الكلاسيكية (Hackett, 1963; Cole et al, 1955, Goff, 1967, Morse, 1969, Steinbock, 1976).




(شكل A ٦٢)

بقايا هيكلية لذكر هندي، عثر على عظمة الساق فقط ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين ١٢٥٠ - ١٣٥٠ م المقطع يظهر تضخماً في العظم ككل والقشرة سميكة الصورة إلى اليمين لعظمة ساق غادية



(شكل ٦٢ ب)
إعادة تشكيل الصفائح العظمية



(شكل ٦٢ ج)
العظمية كثيفة السهام ومميزة بتشكيل عظمي شبيه
مسامي كنتيجة لما يسمى بالالتهاب السمحاقى

الحالة الرابعة :


هذه بقايا هيكل عظمي بأكمله وهذا الهيكل موجود الآن في إحدى مختبرات الأنثروبولوجيا بجامعة أريزونا بولاية أريزونا الحكومية . والهيكل لسيدة في العشرينات من عمرها ويعود تاريخ هذه البقايا إلى الفترة ما بين ٩٠٠ - ١١٠٠ م (EL-Najjar et al, 1971) . وقد لوحظ تدميراً شبه جزئي للعظام الخلفية حدث بعد الوفاة مما جعل التشخيص أو الفحص صعباً نوعاً ما . وبقايا العظم الجداري سليمة تقريباً (حال من آية أعراض مرضية . أما العظام الجبهية فتبين بوضوح مدى تأكل النخاع والعظام بواسطة جرثومة الزهري (شكل ٦٣ A) وهذا التآكل يوضح أيضاً التشخيص الكلاسيكي



(شكل ٦٣ A)

بقايا عظمية (لجمجمة) لسيدة هندية في العشرين من عمرها وقد عاشت في الفترة ما بين ٩٠٠ - ١١٠٠ م

العظم الجبهية تبين بوضوح مدى تأكل النخاع والعظام بواسطة جرثومة الزهري . هذا التآكل يوضح التشخيص الكلاسيكي لعرض الزهري في الججمجة الإنسانية



(شكل ٦٣ B)
صورة مكبرة لشكل A ٦٣

لمرض الزهري في الجمجمة الإنسانية .
(Williams, 1932, Stokes et al., 1944, Goff, 1967, Steinbock, 1976

مناقشة :

قدم كل من ستیوارت (Stewart, 1940) وستیوارت وسبور (Stewart and Spoehr, 1952) أكثر الشروحات المنطقية لوجود مرض الزهري في العالمين القديم والجديد. ومن وجهة نظر ستیوارت فإن مرض الزهري انتشر انتشاراً سريعاً بعد اكتشاف العالم الجديد بين الهنود الحمر. ويلخص ستیوارت رأيه في أصل هذا المرض بقوله :

«مقارنة بالشاهد والدلائل على وجود المرض في بقايا الهنود الحمر قبل العصر الكولومبي فإن انتشار المرض في العصور التاريخية (بعد الاكتشاف) يبدو معه وكأنه وباءً جديداً» (Stewart, 1952: 307). وفي رأي

هذين الباحثين فإن كل من سكان العالم الجديد الأصليين والأوروبيين ربما كانوا قد تأقلموا مع نوع معين من عائلة هذا المرض ، وحين الاتصال انتقل المرض من مجموعة لأخرى ولم تكن تملك أي منهما المناعة الضرورية لمقاومة هذا المرض . ويفيد هذا القول الدليلان التاليان : أولاً ، وجود مرض الزهري على جنبي المحيط قبل الاكتشاف ، ثانياً ، إننا نتعامل مع نوع واحد من أمراض الزهري من الممكن أن يتفرع إلى أنواع أخرى حسب البيئة الجغرافية (Hudson, 1958, 1963) . ويؤكد هدسون أن جميع أنواع الزهري تعود إلى فصيلة واحدة *Treponema Pallidum* ومرض واحد يتحكم فيه المناخ ونمط الحياة الاجتماعية . ويؤيد هاكت (Hackett, 1963) ، الذي يعتبر حجة في هذا المجال من الدراسات ، قول هدسون بأن الزهري مرض واحد لكنه يستجيب للتغيرات البيئية والاجتماعية بطرق مختلفة . وتشير التقارير الحديثة لستاينبروك (Steinbock, 1976) إلى أن أنواع مرض الزهري المختلفة (Venereal and non-Venereal Syphilis, Yaws, Pinta) لا يمكن التفريق بينها بأي فحص أو كشف وهي من ناحية تركيبية متشابهة .

وفي عام ١٩٦١ استحدث كوبرن (Cockburn, 1961) طريقة جديدة شرح فيها نواحي التطور والاختلاف في عدوى مرض الزهري ، حيث يقول إن الإنسان بدأ تجواله من موطنه الأصلي ، إلى مناطق مختلفة من العالم واستوطنها حاملاً معه هذا المرض ، ومع مرور الوقت ، ولاختلاف المناخ والنبات والحيوان والبيئة الطبيعية بشكل عام فقد طور الإنسان ظروفاً بيولوجية خاصة للتكيف مع البيئات الجديدة وفي نفس الوقت بدأت أمراضه وجرائمها في التغير استجابة للبيئة الدائمة التغير . وبعد مرور آلاف السنين أصبح من المتوقع أن تظهر أنواع جديدة من المرض نتيجة للتطورات البيولوجية التي صاحبت تاريخ الإنسان والأمراض التطورى .

الدرن أو السل Tuberculosis

ليس هناك أدنى شك بأن مرض السل قد وجد أصلاً في العالم القديم كما تدل على ذلك البقايا العظمية والقطع الفنية والسجلات التاريخية (Morse et al 1964) . أما بالنسبة لوجود المرض في العالم الجديد فإن الأدلة تأتي من الرسومات الحائطية والتماثيل بأنواعها والبقايا العظمية الإنسانية (Whitney. 1936) . قبل هذا التاريخ بكثير اقترح ويتنسي Webb. (1886) وجود شواهد كثيرة في بعض العظام المكتشفة من مقابر عصور ما قبل التاريخ بولاية تينيسي الأمريكية حيث الفقرات العظمية المضغوطة من عظام الرقبة والصدر مع التحامها مكونة انحناءاً ظاهراً في العمود الفقري .

وفي عام ١٩٥٢ نشر ريتشي (Ritchie. 1952) تقريراً عن ثلاث حالات مختلفة من فترة ما قبل كولومبس مصابة بأعراض التحدب أو التقوس في العمود الفقري ، حيث ظهرت علامات الضغط والتدمير في الفقرات الصدرية والقطنية مع التحامها وتحديبها (تقوسها) وفي بعض الحالات كان هناك تحطم لمتصف جسم الفقرة العظمية ، ولكن التقوس العصبي لم يصب بأية أعراض مرضية في أي من الفقرات المصابة . وقد اجتمع سبعة عشر طبيباً وجراحـاً وعالمـاً أمراضـاً وبيـولوجـياً وفـحـصـوا العـيـنـاتـ الـثـلـاثـ وـاـتـفـقـواـ معـ رـيـتشـيـ بـأـنـ التـحـدـبـ وـتـقـوـسـ الـصـدـرـ وـأـعـوجـاجـ الـعـمـودـ الـفـقـرـيـ هـيـ الصـفـاتـ الـكـلاـسـيـكـيـةـ فيـ مـرـضـ السـلـ . وـمـنـ الـجـدـيـرـ بـالـذـكـرـ أـنـ مـاـ وـصـفـهـ رـيـتشـيـ يـنـطـبـقـ تـامـاـ عـلـىـ بـعـضـ التـمـاثـيلـ الصـغـيرـةـ الـتـيـ عـشـرـ عـلـيـهـاـ فـيـ نـفـسـ الـمـكـانـ لـأـنـاسـ يـعـانـونـ مـنـ نـفـسـ


الأعراض الموجودة في البقايا العظمية السالفة الذكر . ولكن الدراسة الأكثر أهمية والأكثر قيمة من الناحية العلمية بالنسبة لمرض السل جاءت على يد مورس (Morse, 1969) الذي وضع دلائله وشاهده مبنية على الرسومات المكتشفة وعلى بقايا إنسانية لأربع حالات تحمل مؤشرات ودلائل على وجود مرض السل (Morse, 1969) .

أما الدليل والبرهان الأقوى لوجود السل في فترة ما قبل العصر الكولومبي فهو عينة لطفل يتراوح عمره ما بين الثامنة والعاشرة عاش في الفترة الثقافية المعروفة باسم نازكا في جنوب دولة البيرو والتي يعود تاريخها إلى حوالي سنة ٧٠٠ م . وقد كتب أليسون (Allison, 1973) يقول عن هذه الحالة : «إن موضع المومياء في القبر والرباط الخشبي للطفل غير عادي ، ويدل على أن الطفل كان محظوظاً بالظهر ومصاباً بالكساح» وحين قام أليسون بتشريح جثة الطفل وجد أدلة على وجود خراج كشحي في الفقرات القطنية ، وتدرن في الرئة اليمنى للطفل ، ويعتقد أليسون أن وجود هذه الأعراض والدراسة النسيجية والأشعة ، كلها تبين بشكل قاطع أن الطفل مات متأثراً بمرض السل .

الحالة الخامسة :


هذه الحالة مشابهة للحالة رقم ١٠ التي أوردها مورس عام ١٩٦٩ ، الهيكل العظمي لطفل في العاشرة من عمره ، عاش في الفترة ما بين ٨٣٨ - ١١٣٠ م في موقع أثري هندي بولاية نيو مكسيكو الأمريكية ، ودليل الإصابة بالسل كان موجوداً في الفقرات القطنية حيث يبدو تدمير وانضغاط الفقرات الإحدى عشر والاثنتي عشر ، أما الجزء الداخلي من الفقرتين فهو مدمر بشكل كبير تاركاً تجويفاً إسفنجياً (شكل A.B.٦٤) .

الحالة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة اكتشفت خلال عمليات التنقيب في أحد المواقع الأثرية في ولاية أريزونا الأمريكية ويعود تاريخها للفترة ما بين ٩٠٠ - ١١٠٠ م.



(شكل ٦٤)

العمود الفقري لطفل هندي في العاشرة من عمره عاش في الفترة ما بين ٨٣٨ - ١١٣٠ م في موقع أثري هندي بولاية نيومكسيكو الأمريكية - دليل الإصابة بالسل في الفقرات القطنية حيث يبدو تدمير وانضباط الفقرات الصدرية الإحدى عشر والاثنتي عشر تاركاً تجويفاً إسفنجياً



(شكل ٦٤ B)

صورة للعمود الفقري بأكمله تبين التحدب (التوس) الذي
ينتاج عادة في حالات السل الشديدة


الحالة السادسة :

الهيكل العظمي لشاب في العشرين من عمره حيث وجد أن الفقرات الصدرية فقط هي المتأثرة بالمرض الذي انتشر في القواطع الرأسية والجانبية والعرضية من الفقرة متساوية في تقوس العمود الفقري كما يظهر في الشكل ٦٥ A. B). أما بالنسبة للصدر فإن الضلع السادس من اليمين واليسار والضلع السابع من اليمين تظهر عليهما آثار المرض بوضوح . ونستنتج من هذه العينة بأن كل الدلائل تشير إلى وجود الدرن في الجسم ، وقد لوحظ أيضاً آثار للشفاء تدل على أن جسم المصاب كان يقاوم المرض .



(شكل A ٦٥)

العمود الفقري لشاب في العشرين من العمر
الفقرات الصدرية وبيدو المرض منتشرًا في القواطع الرأسية
والجانبية والمرضية من الفقرات متسببة في تقوس العمود الفقري




(شكل ٦٥ ب)

صورة لأحدى الفقرات الصدرية توضح أعراض السل في منتصف الفقرة (الثامنة)

الحالة السابعة :

الهيكل العظمي في هذه الحالة لشاب يتراوح عمره ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين سنة، وقد وجد في هذا الهيكل فقرة قطنية واحدة (الفقرة الخامسة) تدل على وجود التدern أو السل، وهناك حفرة في المنطقة العليا المركزية طولها ١٠٨ سم وعرضها ١ سم وعمقها ٥ سم (شكل ٦٦) وتعتبر هذه الأعراض نموذجاً للتدern في الفقرات العظمية (انظر Kelley and El-Najjar, 1979). ومع أن التشخيص لا يمكن توثيقه إلا أن التغيرات الجسمية والتكتونية لهذه الفقرة تشير لهذا المرض.




(شكل ٦٦)

الهيكل العظمي لشاب يتراوح عمره ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين سنة -
وُجِدَ في هذا الهيكل فقرة قطنية واحدة تدل على وجود التدرن
أو السل وهناك حفرة في المنطقة العليا المركزية طولها
١٠٨ سم وعرضها ١ سم وعمقها ٥ سم

الحالة الثامنة :

لفتاة يتراوح عمرها بين ٢٥ - ٣٥ سنة ، وال الفقرة المتأثرة هي الفقرة
القطنية الثالثة حيث توجد آثار تأكل تبدو واضحة على السطح ولا توجد هناك
أية آثار لنمو عظام جديدة في هذه الفقرة مما يفترض وجود المرض كما هو
معروف في حالات السل الكلاسيكية (شكل ٦٧) .




(شكل ٦٧)

الفقرة القطنية الثالثة لفتاة يتراوح عمرها
ما بين ٢٥ - ٣٥ سنة وتنظر آثار التآكل واضحة
على سطح الفقرة

الحالة التاسعة :

الحالة الأخيرة ، لذكر يتراوح ما بين ٤٠ - ٤٥ سنة وتتوضح الفقرة الرابعة
وجود آثار التهاب المفاصل ومن الواضح أن المرض نتج بعد حالة تسمى
انشطار المفاصل كانت قد بدأت في جسم الفقرة (شكل ٦٨) .



(شكل ٦٨)

الفقرة القطنية الرابعة لذكر يتراوح عمره
ما بين ٤٠ - ٤٥ سنة توضح آثار التهاب
المفاصل في محيط الفقرة

مناقشة : Discussion

إن معظم الأطروحات التي وضعت عن البل في الهيكل العظمي من قبل ريتتش ومورس (Ritchie, 1952, Morse, 1969) كان قد انحصر معظمها في العمود الفقري وبالنسبة لمورس فإنه في حالة وجود العظام الجافة فقط في الهيكل العظمي ، فإن المجال الوحيد للتتخمين هو وجود أعراض المرض حتى لو كانت بسيطة في العمود الفقري . ولأن حالات مرض السل في العظام نادرة فقد بات مورس يعتقد بأن مرض السل لم يكن موجوداً في العالم الجديد قبل الاتصال الأوروبي .

وصحيف أن عظام العمود الفقري هي العظام الأكثر علاقة بمرض السل

ولكن العظام الأخرى هي أيضاً عرضة لهذا المرض ويجب استخدامها في عمليات التشخيص.

وقد قدم كل من كيلي والنجار (Kelley and El-Najjar, 1980) إطاراً معيناً للتفريق بين مرض التدرن في الهيكل العظمي وغيره من الحالات المرضية المتشابهة مثل الأورام الخبيثة والكسور في الفقرات القطنية وأمراض العظام الفطرية والالتهابات. وبالنسبة لمرض السل فقد بين هذان الباحثان النسب التالية: في العمود الفقري (١٥/٢٦ حالة، في الأضلاع ٩/٢٦ حالة، في الركبة ٦/٢٦ حالة، في القص ٤/٢٦ حالة). ومع أن ستاینبوک (Steinbock, 1976) يبدو مقتضاً بوجود التدرن في فترة ما قبل كولومبس فهو يؤمن أيضاً بأن ندرة الآفات التدரنية في العينات المكتشفة يعود إلى ظروف الطقس الباردة التي عملت ك حاجز يمنع انتقال عدوى مرض السل إلى المهاجرين في العالم الجديد. ويضيف ستاینبوک قائلاً: إن الأصحاء والأقوياء فقط تمكنوا من الخلاص من الأمراض الفتاك كالسل وغيرها في رحلتهم من سيبيريا إلى الأمريكتين. ويتافق رأي ستاینبوک مع رأي ستیوارت القائل بأن التنقل بين الأماكن الأكثر برودة منع عن الكثيرين انتشار تلك الأوبئة بينهم. وهذا صحيح خاصة في حالات الملاريا كما أشار إلى ذلك كوبرن وإنجل (Cockburn, 1963; Angel, 1966) حيث يقول كوبرن أنه حتى لو حمل بعض المهاجرين مرض الملاريا فإنهم حتماً كانوا سيغدوونه قبل وصولهم إلى مناطق دائفة تسمح بانتقال العدوى عن طريق البعوض وإن رحلة الهجرة إلى الأمريكتين ربما استغرقت مئات بلآلاف السنين.

أما كولينفاكس (Colinvaux, 1964) فيشير إلى أن الظروف البيئية في نهاية العصر الجليدي في فيرجينيا تشبه تلك التي كانت في الشمال الشرقي لسibirيا، وتنقلات الناس في تلك الفترة كانت بطيئة وغير منتظمة. ولهذا فإن ملاحظات ستاینبوک ، لا يمكن اعتبارها ملاحظات صحيحة وخاصة فيما يتعلق بمرض السل. أما مورس (Morse, 1969) فهو يؤمن في جهة أخرى بأن ندرة السل

في البقايا الهيكيلية في العصر ما قبل الكولومبي يشير إلى عدم وجود المرض كما يعتقد مورس بأن السل لو كان مرضًا متقطعاً في فترة ما قبل التاريخ فإنه من الضروري ملاحظته الآن أكثر مما كان عليه في السابق . وهذه ملاحظة غير واقعية لسبعين ، الأول أن معظم الهندوين قبل وجود الزراعة عاشوا في تجمعات صغيرة اعتمدت على الصيد والجمع مما يجعل انتقال مرض السل في هذه المجتمعات صعب أو حتى مستحيل . ويفيد هذا القول أن كل حالات التدبر الواردة في هذا التقرير جاءت من الجماعات التي اعتمدت على الزراعة وليس العكس ، والثاني ، أن هناك تغيرات دراماتيكية كبيرة وقعت مباشرة بعد الاتصال مثل وجود الازدحام وتغير أنواع وموارد الطعام وسوء التغذية وقد أثرت كلها مباشرة في حياة الهندوين وظروفهم الصحية ، كما أنها أثرت في أنهم أصبحوا عرضة للكثير من الأمراض المعدية التي كانت تنقصهم المناعة ضدها .

ونظراً لقلة المعطيات الحضارية والتاريخية أو عدم وجودها أصلاً ، ونظراً لقلة المؤشرات والمعطيات البيئية آنذاك والتي تعتبر مهمة وحيوية للتشخيص ، فإن مرض السل يعتبر مرضًا مستقلًا أو قائمًا بحد ذاته . وقد نوه كوبرن إلى أن عدم وجود السل في العالم الجديد يرجع في الأصل إلى عدم وجود المجتمعات البشرية الكبيرة ، ولكن هذا الرأي وجد من يعارضه من أمثال نيومان (New-Man. 1976) الذي يقول بأن الكثافة السكانية كانت أكبر وأضخم مما هو معروف ، وإن كانت هناك تجمعات بشريّة كبيرة قبل العصر الكولومبي في شمال أمريكا كما حدد الكثير من المؤلفين (Jndd. 1954، Gregg. 1985) . وإنه لمن المدهش أن أغلب حالات الإصابة بالسل كانت من الواقع بشريّة « حيث التجمعات السكانية الكبيرة والتي كانت تهيأ ظروفاً اجتماعية وبيئية خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض نظرًا لظروفها الصحية السيئة مثل سوء التهوية وسوء أو عدم وجود مسالك ومجاري لتسرّب المياه التالفة » كما أن الحالتين المذكورة في لكتور Allison (Allison - Garcia - Frias - 1940) ظهرتا في مناطق أكثر تطوراً من ناحية زراعة (1973) قبل العصر الكولومبي وأكثر تقدماً وحضاراً كذلك .

خلاصة المبحث

Conclusions

- ١ - بمراجعة التاريخ الطبي لمرض الزهري فإن كل الشواهد والأدلة تشير إلى أن كل ما نسب إلى كونه مرض الجذام الوراثي في أوروبا قبل اكتشاف الأميركيين كان في معظمها مرض زهري .
- ٢ - إن تصنيف الزهري كمرض جديد والزيادة المفاجئة في نسبة الإصابة فيه كان نتيجة لظهور نوع جديد أكثر حدة بالإضافة إلى نقص المناعة عند سكان العالم الجديد والعالم القديم لحظة الاتصال .
- ٣ - الحالات الأربع المذكورة في هذه الدراسة تشير بوضوح إلى الزهري . مع أن التقارير السابقة التي تؤكد وجود إصابات بهذا المرض لا تترك شكًا ولو بسيطًا على أن هذا المرض كان موجوداً في أمريكا الشمالية قبل اكتشاف القارة الجديدة .
- ٤ - بالنسبة للسل أو الدرن فإن الشاهد والدلائل تدعم مقوله للمؤلفين تؤكد بأن السل كان مرضًا مستوطناً قبل العصر الكولومبي في العالم الجديد .
- ٥ - ليس هناك أي دليل على أن الظروف البيئية الباردة قد حالت دون استفحال هذين المرضين وارتفاع نسبة الإصابة فيهما ، وأنه لمن الجائز القول بأن هذين المرضين وظروفيهما وملابساتهما قد أدت إلى تطورهما وتلاحقهما التاريخي وأن كل تجمع بشري قد نال نصبية من العدوى التي تناسب وضعه البيئي والصحي .
- ٦ - إن نقص البقايا الهيكلية التي تبرهن وتدلل على وجود هذين المرضين قد

يكون سببه أن العظام التي قد تظهرهما هي تلك العظام التي تكون متأثرة بشكل كبير وشديد بالمرض وأثاره ، وفي أكثر الحالات التي لدينا فإن المريض وحامل الوباء قد مات قبل استفحال المرض فيه وقبل أن يتمنى للمرض أن ينخر ويترك بصماته وأثاره في العظام .

BIBLIOGRAPHY

- Allison, M. J., J. Mendoza and A. Pezzie 1973 Documentation of a case of Tuberculosis in Pre-Columbian America. Amer. Rev. Resp. Dis., 107: 985 - 991.
- Angel, J. L. 1966. Porotic Hyperostosis, anemias, malarias, and marshes in the Prehistoric Eastern Mediterranean. Science, 153: 760 - 763.
- Brues, A. M. 1958. Skeletal material from the Horton site. Bull. Oklah. Anth. Soc., 6: 27 - 32.
- -----: 1959. Skeletal remains from the Morris site. Bull. Oklah. Anth. Soc., 7: 63 - 70.
- Buret, F. 1891 Syphilis Today and Among the Ancient. F. A. Davis, Philadelphia.
- Bushnell, G. H.S. 1966 Peru. F. A. Praeger, New-York.
- Cannefax, G. T., L. C. Norins and E. J. Gillespie 1967 Immunology of Syphilis. Ann. Rev. Med., 18: 471 - 482.
- Castiglioni, A. 1941. A History of Medicine. A. A. Knopf, New-York.
- Cockburn, A. 1963. The Evolution and Eradication of Infectious Disease. The Johns Hopkins Press, Baltimore.
- -----: 1967. The Evolution and Eradication of Infectious Disease. Second ed. The Johns Hopkins Press, Baltimore.
- Cockburn, T. A. 1961. The Origin of Treponematosis. Bull. W. H. O., 24: 221 - 228.
- Cole, H. N., J. C. Harkin, B. S. Kraus and A. R. Moritz 1955.

- Pre-Columbian osseus Syphilis. A. M. A. Arch. Dermat., 71: 231 - 238.
- Colinvaux, P. A. 1964. The environment of the Bering Land Bridge. Ecological Monographs, 34: 297 - 329.
- Colton, H. S. 1936. The rise and fall of the Prehistoric population of Northern Arizona. Science, 84: 337 - 343.
- Crosby, W. A. 1969. The early history of Syphilis: A reappraisal. Amer. Anth., 71: 218 - 227.
- Denninger, H. S. 1938. Syphilis of Pueblo Skull Before 1350. Arch. Pathol., 26: 724 - 727.
- EL-Najjar, M. Y. 1976. The first Americans: a Study of the origin, evolution and variation of the American Indians. Kirtlandia, The Cleveland Museum of Nat. Hist., 22: 1 - 22.
- EL-Najjar, M. Y., C. G. Turner and E. F. Harris 1971 Physical Anthropological Characteristics of the People of Canyon de Chelly. National Park Service, Arizona Archaeological Center, Tucson, Arizona.
- Fracastoro, G. 1530. Syphilis or the French Disease. Translated by H. Wynne-Finch, 1935. Heinemann, London.
- Garcia-Frias, J. E. 1940. La Tuberculosis en los antiguos Peruanos actualid. Med. Peru. 6: 1.
- Gejvall, N. G., and F. Henschen 1971. Anatomical evidence of Pre-Columbian Syphilis in the West Indians Islands. Beitr. Path. Bd., 144: 138 - 157.
- Goff, C. W. 1967. Syphilis. In: Diseases of Antiquity. D. R. Brothwell and A. T. Sandision, eds. of Thema. Springfield, Illinois, pp. 279 - 294.
- Goldstein, M. S. 1957. Skeletal Pathology of Early Indians in Texas. Am. J. Phys. Anthrop., 15: 299 - 312.
- Gregg, M. L. 1975. A Population estimate for Cahokia. In: Perspectives in Cahokia Archaeology. III. Arch. Survey, Bull., 10: 126 - 136.
- Hackett, C. J. 1963. On the Origin of human treponematosis. Bull. W. H. O. 29: 7 - 11.
- Haltom, W. L., and A. R. Shands 1938. Evidence of Syphilis in

- mound builder's bones. Arch. Path., 25: 225 - 242.
- Harrison, L. W. 1959. The Origin of Syphilis. Brit. J. Ven. Dis., 35: 1-7.
- Holcomb, R. C. 1934. Christopher Columbus and the American origin of Syphilis. U. S. Naval Med. Bull., 32: 401 - 430.
- -----: 1940. Syphilis of the Skull among aleuts and the Asian and North American Eskimo about the Bering and Arctic Seas. U. S. Navy Med. Bull., 38: 177 - 192.
- Hooton, E. A. 1930. The Indians of Pecos Pueblo. Yale Univ. Press, New Haven.
- Hrdlicka, A. 1909. Tuberculosis among certain Indian tribes. Bur. Amer. Ethnol. Bull., 42: 1 - 48.
- Hudson, E. H. 1958. The treponematoses - or treponematosis. Brit. J. Vent. Dis., 34: 22 - 23.
- -----: 1961. Historical approach to the terminology of Syphilis. Arch. Derm., 84: 545 - 562.
- -----: 1963. Treponematosis and pilgrimage. Amer. J. Med. Sci., 246: 645 - 656.
- -----: 1964. Treponematosis and African slavery. Brit. J. Ven. Dis., 40: 43 - 52.
- Hutchinson, J. 1863. A Clinical Memoir on Certain Diseases of the Eye and Ear Consequent on Inherited Syphilis. J. Churchill, London,
- Irving, W. 1953. Evidence of early Tundra cultures in Northern Alaska. Univ. Of Alaska Anth. Pap., 1 (2): 55 - 85.
- Judd, N. M. 1954. The Material culture of Pueblo Bontio. Smith Misc. Coll., Vol. 124.
- Kampneier, R. H. 1964. The late manifestation of syphilis: Skeletal, Visceral, and cardiovascular. Med. Clin. N. Amer., 48: 667 - 697.
- Kelley, M. A., and M. Y. El-Najar 1980. Natural variation and differential diagnosis of Skeletal changes in tuberculosis. Am J. Phys. Anthropol., 52: 153 - 167.
- Kidder, A. 1956. Settlement Patterns - Peru. In: Prehistoric Settlement Patterns in the New-World. G. Willey, ed. Wernner - Gren Foundation, New-York.

- Krumbhaar, E. B. 1936. A Pre-Columbian Peruvian tibia exhibiting syphilitic (?) periostitis. *Ann. Med. Hist.*, 8: 232 - 235.
- MacCurdy, G. G. 1923. Human Skeletal remains from the highlands of Peru. *Am. J. Phys. Anthropol.*, 6 (1): 218 - 329.
- McLean, S. 1931. Osseus Lesions of congenital syphilis: Summary and conclusions of 102 cases. *Am. J. Dis. Child.*, 41: 130 - 152, 363 - 395, 607 - 675, 887 - 922, 1411 - 1418.
- Means, H. J. 1925. A roentgenological study of the skeletal remains of the prehistoric mound builder Indians of Ohio. *Amer. J. Roentg. and Rad. Ther.*, 13: 359 - 367.
- Poore, C. 1913. Some Aboriginal Sites in Louisiana and in Arkansas. *J. Acad. Nat. Sci.*, 16: 13.
- Morse, D. 1967. Two cases of possible treponemal infection in Pre-Historic America. In: *Miscellaneous Papers in Paleopathology*. W. D. Wade, ed. Mus. North Ariz. Tech. Serv., 7: 48 - 61.
- Morse, D. 1969: Ancient Disease in the Midwest. III. State Museum Reports of Investigation, No. 15.
- -----: 1973. Pathology and abnormalities of the Hampson Skeletal Collection. In: *Nodena Arkansas Arch. Survey Pybl.* In Archaeology Res., Series No. 4. D. F. Morse, ed.
- Morse, F., D. R. Brothwell and P. J. Uko 1964. Tuberculosis in ancient Egypt. *Amer. Rev. Resp. Dis.*, 90: 524 - 541.
- Newman, M. T. 1976. Aboriginal New-World epidemiology and medical care and the impact of Old World disease imports. *Am. J. Phys. Anthropol.*, 45: 667 - 672.
- Ortner, D. J., and W. G. Putschar (1979, Manuscript in preparation) Identification of Pathological conditions in human Skeletal remains.
- Orton, S. T. 1905. A Study of the pathological changes in some mound-Builder's bones from the Ohio Valley, with Special reference to syphilis. *Univ. of Penn. Med. Bull.*, 18: 36 - 44.
- Parmlee, A. H., and L. J. Halpern 1935. The diagnosis of congenital syphilis. *J. Amer. Med. Assoc.*, 105: 563 - 566.
- Parsons, E. C. 1938. The Humpbacked flute player of the Southwest. *Amer. Anth.*, 40: 337.
- Putkonen, T. 1962. Dental changes in congenital syphilis. *Acta*

- Derm. Vem. 42: 44 - 62.
- Rabkin, S. 1942. Dental Conditions among prehistoric Indians of Northern Alabama. J. Dent. Res., 21: 211 - 222.
 - Ritchie, W. A. 1952. Pathological evidence suggesting pre-Columbian tuberculosis in New-York State. Am. J. Phys. Anthropol., 10: 305 - 317.
 - Roberts, F. H. H. 1932. The Village of the Great Kivas. Bur. Amer. Ethnol. Bull., 111: 150
 - Roney, J. G. 1966. Paleoepidemiology: an example from California. In: Human Paleopathology. S. Järcho, ed. Yale University Press. New-Haven.
 - Rubenstein, A. J. Boyle, C. L. Odoroff and S. J. Kunitz 1969. Improved Sanitary facilities on infant diarrhea in a Hopi village. Public Health Reports, 84: 1093 - 1097.
 - Sievers, M. L. 1966. Disease patterns among South-Western Indians. Public Health Reports, 81: 1075 - 1083.
 - Snow, C. E. 1948. Indian Knoll Skeletons of Site Oh 2, Ohio County, Kentucky, Univ. Kentucky Rep. Anth. Arch., 4: 371 - 554.
 - Steinbock, R. T. 1976. Paleopathological Diagnosis and Interpretation. C. C Thomas, Springfield, Illinois.
 - Stewart, T. D. 1940. Skeletal remains from the White-Water district, Eastern Arizona. Bur. Amer. Ethnol. Bull., 126: 153 - 176.
 - ———, ———: 1960. A Physical anthropologist's view of the Peopling of the New-World. Southwest J. Anth., 16: 259 - 273.
 - Stewart, T. D., and A. Spoehr 1952. Evidence of the Paleopathology of Yaws. Bull. His. of Med., 26: 538 - 553.
 - Stokes, J. H., H. Beerman and N. R. Ingraham 1944. Modern Clinical Syphiology. Third ed. Saunders, Phila.
 - Sudhoff, K. F. J. 1925. The Earliest Printed Literature on Syphilis. Being Ten Tractates from the Years 1495 - 1498. R. Lier & Co., Florence.
 - Tello, J. C., and H. U. Williams 1930. An ancient syphilitic skull from Paracas in Peru. Ann. Med. Hist., 2: 515 - 529.
 - Thomas, A. B. 1932. Forgotten Frontiers. University of Oklahoma Press, Norman.

- Virchow, R. 1896. Beitrag Zur Geschichte der Lues. *Dermat. Ztschr.*, 3: 1 - 9.
- Wagner, C. J., and E. S. Rabeau 1964. Indian Poverty and Indian Health. *H. E. W. Indicators*. XXIV - XIII.
- Wakefield, E. G., S. C. Dellinger and J. D. Camp 1937. A Study of the Osseus remains of the mound builders of Eastern Arkansas. *Am. J. Med. Sci.*, 193: 488 - 495.
- Webb, G. B. 1936. Tuberculosis. In: *Clio Medica*. Paul B. Hoeber, New-York.
- Wiseman, R. N., M. Y. EL-Najjar, J. S. Bruder, M. Heller and R. I. Ford 1976. *The Smokey Bear Ruin - COAS Monograph No. 4*. COAS Publishing, Las Cruces, New-Mexico.
- Whitney, W. F. 1886. Notes on the anomalies, injuries and diseases of the bones of the native races of North America. *Ann. Resp. Of Peab. Mus. Amer. Arch & Ethol.*, 3: 433 - 448.
- Wilcox, R. R. 1972. A Worldwide view of venereal disease. *Brit. J. Ven. Dis.*, 48 (3): 163 - 176.
- Williams, H. U. 1932. The Origin and antiquity of Syphilis. The evidence from diseased bones. *Arch. Pathol.*, 13: 779 - 814, 931 - 983.

مسُرد بالصطَلحَات

A

Abscess	خراب أو تفقيح
Acetabulum	التجويف الحقبي ، الحق الحرقفي
Acromian	قمة الكتف ، أخرم
Acromial Process	النتوء الأخرمي
Alveolar	سنخي
Alveolar Process	النحوة أو الزائدة السنخية
Alveolus	النفة أو التجويف العظمي
Anencephaly	عديم الدماغ
Angle	الزاوية
Ankle	الكاحل ، رسخ القدم
Anomalies	شواذ
Anterior	داخلي
Antemortem	قبل الوفاة
Anthropometry	القياسات المترية
Anthroposcopy	علم دراسة الصفات
Apex	القمة أو الذروة
Apical Foramen	الفتحة الجذرية
Arch	قطار

Articular	مفصلي
Asterion	النجم
Atlas	الفقرة العنقية الأولى
Attrition	تآكل
Auditory	سمعي
Auxilliary border	الجدار المساعد

B

Base	القاعدة
Basilar	قاعدي
Beveling	سطح مائل
Bicusped	ثنائي التنوء
Bone	العظام
Bregma	ياقوخ
Buccal Surface	السطح الشدفي
Buccolingual	الشدفي اللساني

C

Calcaneus	العقب
Calva	قلنسوة
Calvarium	التحف
Canines	الأنياب
Capitate	هافي
Capitulum	عقدة في طرف
Caries	تسوس
Caucasions	القوqaزيون
Cementum	السمنت ، ملاط أسنان

Cervical	عنقي
Chin	الذقن
Cingulum	البروز أو الطوق اللسانى
Clavicle	الترقوة
Coccyx	العصعص
Coccygeal	عصعصية
Condyle	اللقمة ، نتوء مفصلي في طرف عظمة
Congenital	خليقي
Cortex	اللحاء أو الطبقة الخارجية للعظام
Coronal Suture	الندرز الأكليلي
Coronoid	تاجي ، إكليلي
Coronoid Process	النتوء الإكليلي
Crown	التاج
Cuboid	المكعباني ، عظم شبيه بالمكعب
Cuneiform	مسماري
Cuspid	أحادي النتوء
Cusp	ントء فوق تاج السن
Cutting edge	الحافة القاطعة

D

Dacryon	الملاقى الدمعي ، النقطة الدمعية
Deciduous	لبني ، غير دائم
Deciduous dentition	الأسنان اللبنية الغير دائمة
Deltoid	مثلث الشكل ذاتي
Dentition	الأسنان
Dentin	عاج السن
Diaphysis	العامود ، ساق العظم
Diploe	الطبقة بين اللوحتين (في القحف)

Dolicocephaly إستطالة الرأس أو الجمجمة
Distal بعيداً عن خط الوسط، تجاه السطح السفلي

Dorsal ظهري
Dwarfism القزامة

Distal

E

Eminence حدبة

Enamel مينا الأسنان

Epicondyle فوق اللقمة

Epiphysis القبة العظمية ، الكردوس

Epiphyseal Union الاتحاد الكردوسى

External Occipital Protuberance الحدبة المؤخرة الظاهرية

F

Femur الفخذ

Fibula الشظية

Fissure أخدود

Fontanel يافوخ

Foranin ثقب

Foramen Magnum الثقب الكبير

Fore - arm الساعد

Forensic جنائي

Fossa حفرة ، نقرة

Frontal جبهوي

Fusion إندماج أو التحام

G

Gingiva اللثة

Glabella	البلجة ، مفرق الحاجة
Gladiolus	قطعة القص الوسطى
Glenoid	أروج التجويف
Gnathion	نقطة الذقن
Gonion	رأس زاوية الفك السفلي
Groove	الأخدود الرئيسي

H

Hip	عظم الحوض
Humerus	العضد
Hydrocephaly	الاستسقاء الدماغي
Hyoid Bone	العظم اللامي
Hyperodontia	ازدياد في عدد الأسنان
Hypoplasia	توقف أو نقص النمو

I

Ilium	الحرفة ، العظم الحرقفي
Incisor	السن القاطع
Incus	عظم السنдан
Inferior	أسفل سفلي
Infra - orbital margin	الحافة المحجاجية السفلى
Ischium	الورك

J

Jugular	ودجي ، وداعي ، عنقي
----------------	---------------------

K

Kyphosis	الحدب ، تحدب
-----------------	--------------

L

Labial	شففي
Labial Surface	السطح الشفي
Labiolingual	شففي لساني
Lacrimal	دمعي
Lacrimal bones	العظم الدمعية
Lamina	رقيقة ، صفيحة
Lambdoid bone	لامي ، العظم اللامي
Lambdoid Suture	الدرز اللامي
Lateral	جانبي ، وحشى
Lower Limbs	الأطراف السفلية
Lunate	العظم الهلالي
Lumbar	قطني

M

Malleus	المطرقة ، كبرى عظاميات السمع
Malleolus	الكعب الوحشي ، ناتئ الشظية السفلي
Mamillary Process	التنوء الحلمي
Mandible	الفك السفلي
Mandibular Notch	الحفرة المفصلية للفك السفلي
Mandibular Angle	زاوية الفك السفلي
Manubrium	القطعة العليا للقص
Mastoid Process	التنوء الحلمي
Maxilla	الفك العلوي
Median Line	خط المنتصف
Medial	تجاه خط الوسط
Mental	ذقني ، عقلني

Mesial	متوسط
Mesial Angle	زاوية الوسط
Metacarpal	عظم مشط اليد
Metatarsal	عظم مشط القدم
Metaphysis	جسم العظم البعيد ، طرف قصبة العظم
Metopic	جبهي
Metopic Suture	الدرز الجبهي
Molars	الضروس
Mongoloid	مغولي
Mylohyoid	فكجي لامي

N

Nasal	أنفي
Nasal Bridge	قطرة الأنف
Nasal Bones	العظمان الأنفيان
Nasion	نقطة التقاء الدرز الأنفي والجهبي
Navicular	العظم القاربي
Neck	الرقبة
Neonate	وليد ، حدث الولادة
Notch	فرخة ، ثلمة
Nutrient	معدني

O

Oblique	مائل ، منحرف
Obturator Formin	الثقب المسندود
Occipital	قذالي ، مؤخرى
Occlusal Surface	السطح الطاحن
Olecranon	السطح المرفقي

Opisthion	النقطة المتوسطة على حافة الثقب الكبير السفلية
Orbit	محجر العين ، الحجاج
Osseus	عظمي
Ossicles	عظمية
Osteoporosis	مسامية العظام أو ترققها

P

Palatine	عظم حنكي
Parietal	جداري
Patella	الرصفة
Pathology	علم الأمراض
Pedicle	عنق ، سويفة أو عنيق
Pelvis	الخوض
Periodontal	سمحاق السنخ ، جيب السن
Permanent dentition	الأسنان الدائمة
Phalanges	السلاميات
Pisiform	الحمصة ، أحد عظام رسمع اليد
Pit	نقرة غائرة
Popliteal	ماضي
Porotic Hyperostosis	العظم الإسفنجي (المثقب)
Posterior	ظاهري
Postmortem	بعد الوفاة
Preauricular	أمام الأذن
Premolars	الطواحين
Process	نتوء
Proximal	الأقرب ، تجاه السطح العلوي

Pterygoid	جانحي الشكل
Pubis	العظم العاني
Pubic	عاني ، متعلق بالعانية
Pulp	اللب

R

Race	سلالة
Radius	الكعبرة
Ramus	الفرع الصاعد
Ribs	الأضلاع
Ridge	حافة
Rim	حافة أو إطار

S

Sacrum	الجز
Sagittal	التدرز السهمي
Scapula	لوح الكتف ، عظم الكتف
Scoliosis	الزور
Sesamoid	العظم السمسي ، سمسي الشكل
Septum	حاجز ، فاصل
Shovel	مفتر
Sickle - Cell Anemia	أنها الخلية المنجلية
Sinus	الجيوب الهوائية
Sphenoid	العظم الإسفنجي
Spinal Cord	النخاع الشوكي
Spine	سلسلة الظهر ، العمود الفقري أو الشوكي
Squamous	حرشفي ، قشرى
Stapes	العظم الركابي

Sternum	القص
Styloid	ناشيء أبيري
Sulcus	ثلم ، أخدود
Superior	علوي
Supra	فوق ، أعلى
Supra - Orbital Ridge	فوق الحاج
Surgical	جراحي
Suture	درز
Symmetrical	متناقض
Symphysis	إرتفاق ، وصل

T

Talus	العرقوب ، الكاحل
Tarsals	رسغي
Temporal	صدغي
Temporal Fossa	الحفرة الصدغية
Thalassemia	أنيميا كولي ، أنيميا البحر المتوسط
Thoracic	صدرى
Thorax	الصدر
Tibia	عظم القصبة
Transverse	مستعرض ، معرض
Trapezoid	عظم في الرسغ عند قاعدة السباية شبه المنحرف
Triangular	مثلث الشكل
Trochlea	المفصل البكري ، بكرة
Trochanter	مدور ، مدورة
Trunk	الجزع ، الجسم بدون الرأس أو الأطراف
Tuberclle	درنة ، درنية

Tuberosity حدبة

U

Ulna الزند

Upper Limbs الأطراف العليا

Ventral بطني ، أمامي

Ventral Rampart الجدار البطني

Vertebrae الفقرات العظمية

Vertebral Column العمود الفقري

Vertex القمة ، القبة

Vomer عظم الميكة ، الميكة

W

Wrist رسغ

Wrist Bones عظام الرسغ

X

Xyphoid الرهابة ، شبه السيف

Z

Zygomatic وجني

Zygomatic arch القوس الوجني

Zygomatic bone العظم الوجني

Zygomatic process نتوء النمية أو الناشزة الوجنية

Zygomatic suture الدرز الوجني